

Multisoortenmonitoring Hobokense Polder

1 Broedvogels :

1.1 Soorten

Dodaars: 10 april - 10 juli, type waarn., \geq territoriaal gedrag, aantal waarnemingen: 1.
1 mei – 10 juli, type waarn. \geq volwassen in geschikt broedbiotoop, aantal: 2.

Bijna voldoende informatie verzameld:

1-2 koppels Rallegat-zuid

4 koppels Rallegat-noord

1 koppel Barberven

1 koppel Reigershoek

? koppels Broekskot.

Fuut

Grote Canadese gans: 1 april – 30 juni, type waarn., \geq koppel in broedbiotoop, aantal waarnemingen: 2.

Alle waargenomen koppels noteren op waarnemingen.be, juist gelokaliseerd.

Nestlocatie noteren. Koppels met jongen noteren (aantal jongen + inschatting leeftijd).

Grauwe gans

Kuifeend: 15 mei – 30 juni, type waarn., \geq man in broedbiotoop, aantal waarnemingen: 2.

Tafeleend: 15 mei - 10 juli, type waarn., \geq man in broedbiotoop, aantal waarnemingen: 1.

Voor beide soorten het aanwezig aantal mannetjes tellen per plas (Broekskot, Rallegat, Groot Rietveld (?))

In juli vrouwtjes met jongen tellen, ouderdom van de jongen inschatten (in weken).

Slobeend

Zit eigenaardig genoeg niet in lijst (wordt waarschijnlijk beschouwd als weidevogel).

Zeker wel noteren.

Wintertaling

Krakeend

Bergeend

Torenvalk

Boomvalk

Sperwer

Bruine kiekendief:

Alle waarnemingen noteren op waarnemingen.be met exacte locatie en vliegrichting (in opmerking) en geslacht.

Waterral: 15 apr. – 10 jul., type waarnemingen: alle waarnemingen, aantal waarnemingen : 1 , fusieafstand: 200m

Eén of twee nachtexcursies (half mei en half juni) met geluid op geschikte locaties (alle moeras centraal deel, Groot rietveld, Leigracht Naftaweg, Rietveld Polderbos, Nieuwe zandweel).

Bert is al eens rond geweest met geluid (24/4).

Porseleinhoen: 1 mei – 15 jul., type waarnemingen: \geq zang, aantal waarnemingen : 1 , fusieafstand: 300m.

Kievit: 10 april - 10 mei, type waarnemingen, \geq koppel in broedbiotoop, aantal waarnemingen: 2

In polder zijn broedgevallen meestal later op drooggevallen plassen (mei – juni). Alle waarnemingen noteren op waarnemingen.be met exacte locatie en aantallen (vooral letten op alarm gedrag).

Zomertortel: 1 mei – 20 juli, type waarn., \geq koppel in broedbiotoop, aantal waarnemingen: 1.
Alle waarnemingen noteren op waarnemingen.be, juist gelokaliseerd, type waarneming (zichtwaarneming, koppel, zang) noteren. Specifieke aandacht voor Graspolder.

Kleine bonte specht : periode : 1 feb. – 20 jun., type waarnemingen: alle, aantal waarnemingen : 1 , fusieafstand: 300m
Alle waarnemingen noteren op waarnemingen.be, juist gelokaliseerd, type waarneming (zichtwaarneming, koppel, zang, nest, voederend...) noteren. Eventueel 1 keer met geluid op geschikte locaties (Populierenbos) in april. Waarschijnlijk niet als broedvogel aanwezig.

Grote bonte specht

Groene specht

Boomkruiper

Gekraagde roodstaart

Wielewaal

Tuinfluits

Grasmus

Fitis

Braamsluiper

Cetti's zanger

Nachtegaal: 10 mei – 20 juni, \geq zang, aantal waarnemingen : 1
Eén of twee avondexcursies na in mei en juni.

Blauwborst: 1 april – 15 juli, type waarnemingen, \geq zang, aantal waarnemingen : 1
Twee vroegochtendexcursies (april – mei) speciaal gericht op rietvegetaties.
Alle bijkomende waarnemingen.
Reeds voldoende informatie verzameld: 10 territoria!

Sprinkhaanzanger: 1 mei – 20 juli, type waarnemingen, \geq zang, aantal waarnemingen : 1
Twee vroegochtendexcursies (mei-juni) speciaal gericht op rietvegetaties.
Alle bijkomende waarnemingen.

Rietzanger: 1 mei – 20 juli, type waarnemingen, \geq zang, aantal waarnemingen : 1
Twee vroegochtendexcursies (mei-juni) speciaal gericht op rietvegetaties.
Alle bijkomende waarnemingen.

Bosrietzanger: 15 mei – 20 juli, type waarnemingen, \geq zang, aantal waarnemingen : 1
Twee vroegochtendexcursies (mei-juni) in volledige polder. Alle bijkomende waarnemingen.

Kleine karekiet

Spotvogel

Matkop: 1 feb. – 30 jun., type waarnemingen: \geq koppel in broedbiotoop, aantal waarnemingen : 1 , fusieafstand: 500m
Alle waarnemingen noteren op waarnemingen.be, juist gelokaliseerd, type waarneming (zichtwaarneming, koppel, zang, nest, voederend...) noteren.
Waarschijnlijk niet meer aanwezig als broedvogel!

Rietgors: 1 mei – 1 juli, type waarnemingen, \geq koppel in broedbiotoop, aantal waarnemingen : 1
Twee vroegochtendexcursies (mei-juni) speciaal gericht op rietvegetaties.
Alle bijkomende waarnemingen.

Waarschijnlijk 3 territoria.

Kwartel, patrijs, veldleeuwerik, kokmeeuw, watersnip, baardmannetje, snor, woudaapje, graspieper, kwartelkoning : niet aanwezig, eventuele waarnemingen noteren.