



Povecanje broja pcelinjih drustava pravljenjem odvojaka

Najcesci nacin vjestackog razmnozavanja pcelinjih drustava je pravljenje odvojaka.



Drustvo Koje se razdvaja



Odvojak koji se formira

Osnovna ideja je da se iz jednog dobro razvijenog drustva odvoji nekoliko ramova sa leglom i hranom u jedan novi sanduk pazeci da matica ostane u drustvu iz kojega se vade ramovi.

U praksi funkcione vise nacina pravljenja odvojaka:

- 1.- Odvojak koji sam pravi maticnjake i izvodi maticu.
- 2.- Odvojak kojem se dodaje zreo maticnjak.
- 3.- Odvojak kojem se dodaje neolodjena matica .
- 4.- Odvojak kojem se dodaje oplodjena matica.

1.- Odvojak koji sam pravi maticnjake i izvodi maticu:

U poseban sanduk na novoj podnici odvoji se 3-4 rama legla pazeci da se ne prenese matica ,2-3 rama sa hranom (med i polen), ostali prostor se popuni satnim osnovama i ramovima sa izgradjenim sacem. Ako ce se odvojak prenijeti na drugo mjesto treba natresti mladih pcela iz plodista sa 2-3 rama i dodati ram hranilicu sa secernim tjestom. Odvojak se moze ostaviti na mjestu gdje se nalazilo drustvo iz koga je formiran odvojak. U ovom slucaju nije potrebno natresanje pcela niti dodavanje ram hranilice sa secernim tjestom. Sesti dan poslije formiranja treba ponistiti maticnjake ostavit 2 koji jos nisu zatvoreni jer su oni sagradjeni na najmladjim larvana i garantuju dobar kvalitet matice. Odvojak koji je odnesen na drugo mjesto netreba vise uz nemiravati . Nakon 5 sedmica treba da se pojavi zatvoreno leglo, ako se zatvoreno leglo ne pojavi u sestoj sedmici projekat treba prekinuti i odvojak spojiti sa nekim drustvom na pcelnjaku. Odvojak koji je ostao na mjesu gdje se nalazilo drustvo iz koga je formiran treba nako 2 sedmice prosirit dodavanjem jednog nastavka. Ovaj odvojak treba da dostigne pun razvoj i da dadne izvjesnu kolicinu meda.

2.- Odvojak kojem se dodaje zreo maticnjak:

Odvajanje se vrsti na isti nacin kao i u prvom slucaju. Maticnjak se dodaje 4-6 sati poslije formiranja odvojka. Maticnjak treba da bude zreo, iz njega se treba izleci matica u naredna 24 sata. Treci dan

nakon odvajanja treba provjeriti da li se matica izlegla. Ako matica nije izlezena to znači da maticnjak nije bio ispravan treba dodati novi maticnjak ili prekinuti projekt. Zatvoreno leglo treba da se pojavi u četvrtoj sedmici poslije odvajanja. Ako se u četvrtoj sedmici ne pojavi zatvoreno leglo projekat treba prekinuti i odvojak spojiti sa nekim drustvom na pcelnjaku. Ako se ovaj odvojak ostavi na mjestu gdje se nalazilo drustvo iz kojega je formiran ima velike sanse da ostvari prinos meda.

3.- Odvojak kojem se dodaje neoplodjena matica:

Odvajanje se vrši na taj nacin da se prvo pripreme ramovi sa leglom koji će se odvajati. Ramove sa leglom koji će se odvajati treba podići iznad maticne resetke i nakon sedam dan ove ramove odvojiti u poseban sanduk. Popunu ostalog prostora izvršiti na isti nacin kao u prethodnim slučajevima. Dizanje ramova iznad maticne resetke se vrši da bi se dobilo zatvoreno leglo. Matica se dodaje u kavezu 4-6 sati nakon odvajanja. Ako se neoplodjena matica doda u odvojak u kome ima otvorenog legla pcele će ubiti dodatu maticu u velikom broju slučajeva i sagraditi maticnjake na larvama koje se nalaze na odvojenim ramovima. Ovaj nacin je uspjesan u velikom procentu ako se provede pravilno. Nakon cetiri sedmice treba da se pojavi zatvoreno leglo, ako se zatvoreno leglo ne pojavi u petoj sedmici projekat treba prekinuti i pcele spojiti sa nekim drustvom na pcelnjaku. Ako je ovaj odvojak formiran prije Midsomara ima velike sanse da dadne prinos meda.

4.- Odvojak kojem se dodaje oplodjena matica:

Formiranje odvojka sa oplodjenom maticom vrši se na isti nacin kao i odvojaka 1 i 2 stižući sto se dodaje oplodjena matica. Matica se dodaje u kavezu 4-6 sati nakon formiranja odvojka. Nakon sedmice dana treba provjeriti da li je matica primljena. Ako je matica primljena naciće se leglo (jaja i larve). Ako matica nije primljena pojave se zapoceti maticnjaci na ramovima. U ovom slučaju projekat treba prekinuti, maticnjake porusiti a pcele spojiti sa nekim drustvom na pcelnjaku. Ako je odvojak formiran prije midsomara ima velike sanse da ostvari prinos meda.

Odvojke treba formirati u vremenu pocetka cvatnje maslacka do zavrsetka cvatnje lipe to je period od 15 maja do 20 jula. Odvojci koji se formiraju nakon zavrsetka cvatnje lipe, nakon 20. jula nemaju velike sanse da se razviju do te mjeri da se mogu zazimati kao posebna pcelinja drustva. Formirane odvojke treba njegovati prihranjivanjem i prosirenjem prostora.

Veoma je vazno voditi racuna o zdravstvenom stanju, **narocito o varoi**. Moguci su tretmani u toku razvoja i njegove odvojake. Tretmani se mogu vršiti oksalnom kiselinom, mravljom kiselinom, timolom ili nekim drugim sredstvom koji me tretira protiv varoe.