

INCEPT-Tromboprofilaksi – Hasta Bilgisi

Ek acıklama

Yoğun bakım hastalarının onda birinde kan pıhtısı (tromboz) oluşur, öncelikle bacaklarda, ve bu ciddi bir durumdur. Kan pıhtısı kopup akciğerlere gidebilir ve hayatı tehdit edebilir. Bu nedenle yoğun bakım hastalarına, kan pıhtısı riskini azaltmak için önleyici (profilaktik) kan sulandırıcı ilaç verilmesi önerilir.

Öte yandan, bu kan sulandırıcı alan hastaların her 10-20 hastadan birinde kanama meydana gelir. Kan sulandırıcı ilaç kullanımı dengeli yapılmalıdır; ilaç pıhtıyı önlemeli ama kanamayı artırmamalıdır. Yoğun bakım hastaları için en uygun doz henüz kesin olarak bilinmemektedir ve kullanılan dozlar farklılık göstermektedir.

INCEPT-Tromboprofilaksi Alt Deneyinin Amacı

Amaç, yoğun bakım hastalarına verilen önleyici kan sulandırıcı ilacın (düşük moleküler ağırlıklı heparin) üç farklı dozunun etkilerini karşılaştırmaktır.

Hangi Tedaviler Uygulanacak

Sen aşağıdaki şekillerden birinde kan sulandırıcı ilaç alacaksın:

1. Sabit düşük doz
2. Sabit orta-yüksek doz
3. Kilonuza göre ayarlanmış doz

Tedavi, yoğun bakımda kalırken uygulanacaktır. Deney sırasında etkiler ve güvenlik takip edilecek; özellikle kan pıhtısı ve kanama açısından. Ekstra test veya işlem yapılmayacaktır.

Olası Yan Etkiler, Riskler ve Komplikasyonlar

Kan sulandırıcı ilaç, yoğun bakımda sık kullanılan ve personel tarafından iyi bilinen bir ilaçtır. Yaygın yan etkiler kanama ve enjeksiyon bölgesinde reaksiyonlardır. Çok nadir olarak ciddi alerji veya kan pulcuklarının (trombositler) azalması görülebilir. Beklenmeyen diğer yan etkiler veya komplikasyonlar ortaya çıkabilir, ancak bu çok olası değildir. Eğer yan etkiler olursa, gerekli tedavi sağlanacaktır.

Zaman Çizelgesi ve Finansman

Alt deney, güvenilir sonuçlar elde edilene kadar devam edecektir. Bu nedenle kesin bitiş tarihi bilinmemektedir; en olası tarih 2028'dir. Ekonomi INCEPT grupe tarafından sağlanmaktadır.