



**JOKs resa till  
Namibia - Botswana - Sydafrika  
31/10 - 21/11 2003**

*Så stävar vi äntligen ut från Simon's Town, ut över False Bay och med kursen mot Cape Point. I fem dagar har denna havsfågeltur skjutits upp p g a för hårda vindar och it's now or never – detta är vår sista dag efter tre veckors kringresande i södra Afrika ! När vi rundar Cape Point och Cape of Good Hope möter oss den grova havssjön och båten, m/s Zest, börjar att kränga kraftigt. Men vi stävar oförtrutet söderut, mot the Canyon, 30 sjömil utanför land, där kallt näringsrikt vatten väller upp och skapar rika förutsättningar för både fiske och havsfåglar. Kapsulor har synts hela tiden, liksom skarvar av flera arter, afrikanska pingviner och pälssälar. Nu dyker det också upp white-chinned petrels samt sooty och cory's shearwaters, många alldeles intill båten. Efter ett tag kommer även flera great shearwaters glidande och nu höjs pulsen lite. Den arten har många av oss – hittills förgäves – spanat efter under stormdagar på Västkusten. Så upptäckts den första albatrossen – en shy albatross – och fullt jubel utbryter.*

*Skepparen har nu fått syn på en trälare och dit ställer vi kursen trots att det verkar vara rätt få fåglar omkring den. Men vänta ett tag – när vi börjar följa båten, som heter Boronia och har sin hemmahamn i Cape Town, står det alltmer klart att detta inte kommer att bli en vanlig havsfågeldag, inte ens här nere på det oändliga sydhavet. Albatrosserna blir fler och fler och snart är fyra arter identifierade – shy , black-browed samt både atlantic och indian yellow-nosed. Här finns också giant petrels – fula parodier på de eleganta albatrossarna – av både den sydliga och den nordliga arten, liksom förutom massor av white-chinned petrels, sooty och great shearwaters också några svart-vitbrokiga pintado petrels ( sjömannens "kapduva" ), grova southern polar skuas , nätt trippande wilson's och european stormpetrels samt eleganta sabbine's gulls, de två sistnämnda gäster från vår egen hemisfär. Vår superguide Alvin Cope pekar och vrålar som den värste idrottsreporter men lyckas ändå nätt och jämnt ligga steget jämnt med alla arter som sveper förbi på nästintill armslängds avstånd. När trälaren vindar in den sprängfyllda trålen utbryter närmast panik i fågelskarorna, som slåss med ivriga pälssälar om de fiskar som lossnat ur nätet.*

*Så upptäcker jag plötsligt en jättelik albatross med vit rygg och svarta vingöversidor, gör Alvin uppmärksam på den och får en omedelbar reaktion: "Northern royal albatross, adult bird " – skriker han ut för allt vad lungorna håller. En imponerande jättefågel som vi egentligen bara drömt om – den är sällsynt året om och allra mest denna årstid när den bör vara på häckplats på Nya Zeeland ! Och det roliga är ännu inte slut – det ligger en stor albatross på vattnet där den nyss sedda fågeln försvann och det är inte samma individ utan en wandering albatross, den art som har den största vingbredden av alla fåglar överhuvudtaget och som sägs vara hemvist för döda sjömän själar! Inte heller denna, tyvärr starkt minskande fågel borde vara kvar i dessa vatten i november. Vår förundran ökas ytterligare när vi strax därefter hittar ännu ett exemplar av samma art och när Alvin en stund senare gapvrålar: "Spectacled petrel just behind the boat." Och visst är det en glasögonpetrell – vi har väl allihop tittat på den i boken och undrat om vi kanske, eventuellt, möjligen skulle kunna få en skynt av denna märkligt tecknade, sällsynta och starkt hotade art, som bara häckar med ungefär 5 000 par på Inaccessible Island i Tristan da Cunhas ögrupp.*

*På vägen in består euforin – vilken avslutning på resan.*

## **Deltagare**

Hans Andersson

Torbjörn Andersson

Ulf Aronsson

Axel Bigelius

Mikael Frost

Berndt Godin

Stig Holmstedt ( Repr för JOK )

Kurt Johansson

Ola Jörnstedt

Jan Olsson

Anders Pettersson

Kjell Sahlberg

Johan Wallin

Teet Sirotkin ( ledare )

**Resberättelsen är författad av Stig Holmstedt och artlistan sammanställd av Teet Sirotkin och Stig Holmstedt.**

Kontaktperson : [stig.holmstedt@sbk.stockholm.se](mailto:stig.holmstedt@sbk.stockholm.se)

## Dagsprogram

- Dag 1. Fredag 31/10 Avresa från Stockholm-Arlanda kl 14.00.
- Dag 2. Lördag 1/11 Ankomst Johannesburg kl 07.20 LT. Viss skådning från terminalen. Ankomst Windhoek kl 12.55 LT. Skådning vid Avis dam i Dan Viljoen Game park. Övernattning Dan Viljoen.
- Dag 3. Söndag 2/11 Skådning på förmiddagen i Dan Viljoen Game Park. Därefter transport till Swakopmund. Skådning längs vägen, främst vid Karibib Airstrip och Trekkopie. Övernattning i Swakopmund.
- Dag 4. Måndag 3/11 Skådning hela dagen kring Walvis bay/Swakopmund – Rooibank, strandlaguner och tidvattenstränder s Walvis Bay, ”Bird paradise”, guanoplattformen samt Welwitshia Drive. Övernattning i Swakopmund.
- Dag 5. Tisdag 4/11 Transport via skådning vid främst Spitzkoppe till övernattning i Uis.
- Dag 6. Onsdag 5/11 Transport från Uis till Hobatere lodge. Kvällskådning och efter middagen mörkertur. Övernattning på Hobatere lodge.
- Dag 7. torsdag 6/11 Morgontur i Hobatere-reservatet. Därefter förflyttning till Okakuejocamp, Etosha NP. Spaning vid det elbelysta vattenhålet på kvällen. Övernattning Okakuejo camp.
- Dag 8. Fredag 7/11 Morgontur kring Okakuejo. Därefter förflyttning med många skådarstopp till Halali camp,. Etosha NP. Spaning vid elbelyst vattenhål på kvällen. Övernattning Halali camp.
- Dag 9. Lördag 8/11 Förflyttning med många skådarstopp inkl avstickare upp till Andoni plains till Namutoni camp. Övernattning här.
- Dag 10. Söndag 9/11 Morgontur till Dikdik Drive samt skådning i Namutoni camp. Därefter via sjukhuset i Tsumeb och skådning vid TV-masten s Rundu till övernattningsstället Sarasungu River Lodge vid Kavango-floden i Rundu.
- Dag 11. Måndag 10/11 Morgonskådning kring Sarasungo River Lodge. Därefter förslyttning vis Rundu Sewage Works till Popa Falls. Skådning sen eftermiddag och kväll vid Popa falls. Övernattning i Popa falls.
- Dag 12. Tisdag 11/11 Morgonskådning i Mahango Game Reserve. Därefter förflyttning till Shakawe lodge vid Okavango-floden i Botswana. Båttur på floden , både på em och natten. Övernattning i Shakawe Lodge.
- Dag 13. Onsdag 12/11 Hela dagen i och kring Shakawe lodge, med bla en ytterligare båttur på Okavango-floden. Övernattning i Shakawe lodge.

- Dag 14. Torsdag 13/11 Lång bilförflyttning ( över 100 mil ) vis Tsumeb till Windhoek. Övernattning här.
- Dag 15. Fredag 14/11 På morgonen kort tur till Avis Dam. Därefter flyg Windhoek – Cape Town. På eftermiddagen besök vid Røi Els och Stoney Point längs kusten 5-6 mil öster om Cape Town. Övernattning på Flora Bay Resort i Hout Bay utanför Cape Town.
- Dag 16. Lördag 15/11 Skådning hela dagen kring Cape Town – Klaassenberg Trail, Kirstenbosch Botanical Garden, Blouvillei, Cape Peninsula. Övernattning På Flora Bay Resort.
- Dag 17. Söndag 16/11 Start på en fyra dagar lång rundtur i västra Cap med skådning vid främst Sir Lowry´s Pass samt de Hoop Nature reserve. Övernattning i Swellendam.
- Dag 18. Måndag 17/11 Skådning i skog- Grootvadersbosch samt Bontebok National Park. Därefter förflyttning till staden Ceres för övernattning.
- Dag 19. Tisdag 18/11 Skådning främst i Karoo-områdena norr om Karooport, Därefter förflyttning till Lambert´s Bay för övernattning.
- Dag 20. Onsdag 19/11 Morgonskådning kring Lambert´s Bay, Därefter förflyttning tillbaka till Cape Town med skådning främst vid Kransvlei Port, Berg River och West Coast National Park. Övernattning i Flora Bay Resort i Hout Bay.
- Dag 21. Torsdag 20/11 Pelagisk båttur på havet utanför Cape Town. Kort besök vid Strandfontein Sewage Works. Därefter flygning hem från Cape Town kl 20.40.
- Dag 22. Fredag 21/11 Ankomst Stockholm –Arlanda kl 14.10.

## Dagbok

1/11. Efter en lång flygresa från Stockholm via Paris anlände vi tidigt på lördagsmorgonen den 1/11 till Johannesburg. Här hade vi några timmar i väntan på planet till Windhoek i Namibia och dessa nyttjade vi självfallet till spaning efter fågel från terminalbyggnaden. Det måste finnas någon fågelrik våtmark nära flygplatsen, ty i luften syntes flera flockar av *sacred ibis* och *cattle egret* liksom en flock om 35 *grey-headed gulls* och en *african darter*. På fältet uppletades en *hadeda ibis*, en *black-headed heron* och vid några små byggnader ett par häckande *common mynahs*, för de enda vi såg på hela resan. Åtskilliga svalor och tornsvalor svepte runt och vi identifierade *barn*, *white-throated* och *greater striped swallow* samt *rock martin* och *little swift*.

Mitt på dagen ankom vi till ett hett Windhoek, där vi möttes av den fyra man starka förtruppen, inklusive vår reseledare Teet Sirotkin, som varit ute i en vecka, främst uppe kring Ruacana vid gränsen mot Angola. Dessvärre hade de smittats av ett eländigt förkylningsvirus på flygresan ned och detta virus skulle senare komma att drabba de flesta i gruppen och för några bli ett smolk i glädjebägaren på en i övrigt enormt lyckad resa.

Medan vi väntade på det minst sagt omständliga uttaget av WV-bussar skådade vi kring terminalen. Här häckade resans enda *south african cliff swallows* och noterades bl a också *white-backed vulture*, *black-chested snake-eagle*, *lilac-breasted roller* och *burchell's starling*.

Så kom vi i all fall iväg till slut, körde några mil och stannade sedan vid en smärre väg längs vilken vi till fots tog oss ned mot Avis dam, en vattenreservoar. Här fick vi en mycket artrik introduktion till vårt fortsatta skådande med bland annat två *white pelicans*, en *brown snake-eagle*, en *african fish-eagle*, resans enda *osprey*, en *lesser kestrel*, *kittlitz's* och *three-banded plovers*, en *marsh sandpiper*, en *white-winged tern*, *bradfield's*, *alpine* och *little swifts*, *swallow-tailed bee-eater*, *grey* och *monteiro's hornbills*, *fan-tailed* och *rattling cisticolas*, *brown-crowned tchagra*, *pin-tailed* och *shaft-tailed whydahs* samt den viktiga målarten *rockrunner* – tre ex på mycket fint närhåll !

Sent på eftermiddagen anlände vi till Daan Viljoen Game Park strax väster om Windhoek där vi hann med att kryssa en rad arter, bl a *groundscraper thrush*, *short-toed rock-thrush* och *mountain wheatear* samt av däggdjur *bergszebra*, *större kudu*, och *röd koantilop* före middagen. Utanför restaurangen spelade minst en *freckled nightjar* ute i det sammetsmjuka mörkret.

2/11. Morgonen och förmiddagen ägnade vi åt Daan Viljoen - först de torra markerna norr om turist-campen, sedan den fina Augeigas dam vid campen och till sist en sju kilometer lång game drive. Massor av fågel syntes, bl a *night heron*, *hamerkop*, *common scimitar-bill*, *golden-tailed*, *cardinal* och *bearded woodpecker*, *rufous-naped lark*, *ashy tit*, *burnt-necked eremomela*, *rockrunner*, *marico flycatcher*, *pririt batis*, *crimson-breasted shrike*, *scarlet-chested sunbird*, *violet-eared* och *black-faced waxbill* och *lark-like bunting*. Det var också gott om däggdjur – som överallt i centrala Namibia åtskilliga *chacma-babianer* vidare en *svartryggad schakal*, tio *bergszebror*, två *vårtsvin*, tjugo *större kudus*, fyra *gemsbockar*, tjugo *gnuer*, tio *röda koantiloper* och en *springbock*.



Sent på förmiddagen drog vi iväg, först norrut och sedan västerut på vår ca 40 mil långa färd ned mot Atlantkusten. Som nästan överallt i Namibia var vägarna utmärkta och därtill ganska tomma, vilket medgav en hög marsch-fart. Ungeför halvvägs tog vi in på en sidoväg för att besöka Karibib air strip, känd som en bra lokal för bl a burchell's courser. Här var det hett som i en bakugn och de första fåglar vi upptäckte var ett antal lärkor som stod och flämtade i skuggan av en husvagn. Efter noggranna studier och livliga diskussioner kom vi fram till att det var fråga

om två arter – *stark's* respektive *spike-heeled larks*. Tyvärr hittade vi inga courser, men fick i gengäld se en *small button-quail* (= springhöna) mycket fint.

Någon timme senare och längs vägen mot kusten upptäckte vi dock en flock flygande courser's som vållade en snabb evakuering av bussarna. Som tur var kom fåglarna så nära att vi kunde se de vita bakkanterna på vingarna och således kunde bestämma dem till *burchell's courser's*. En stund senare visade sig ännu en fin vägart i form av tre *rüppel's korhaans*. I övrigt syntes bl a ett tjugotal *southern pale chanting goshawks* och åtskilliga *lilac-breasted* och *purple rollers* samt *grey go-away-birds* längs vägen.

Dagens sista skådarstopp gjordes vid Trekkopie. Här var vi inne i nästan ren öken och målarten var *gray's lark*. Vi spred ut oss över en stor yta. *Tractac chat* var något av en karaktärsart i området och så småningom upptäcktes också tre exemplar av de spökliskt bleka lärkorna.

Det var redan helt mörkt när vi checkade in i de mycket enkla, men helt acceptabla småstugorna i en stugby i utkanten av Swakopmund, en liten stad som i delar såg ut som ett stycke av Bayern vid den ökenartade Atlantkusten. Vi åt på det tysk-språkiga fyrstjärniga Hansa hotell med kristallkronor och fiolmusik som på 20-talet. Trots restaurangens lyxiga karaktär och vår fältklädsel blev vi utomordentligt väl bemötta och åt en mycket god treättare för knappt en hundring – mat och inkvartering är nästan oförskämt billig i Namibia – alltmedan violinisten filade på "Wien, nur du allein" och "The rain in Spain".....

**3/11.** Morgonens målart var dune lark och vi gjorde först ett försök att nå en lokal för arten genom sandöknen från saltfabriken söder om Walvis Bay. Här insåg vi dock snart att riskerna att köra fast i sanden var överhängande så vi tog det säkra före det osäkra och körde istället den fyra mil långa sträckan till Rooibank invid den uttorkade Kuiseb River. Söder om flodbädden börjar de gigantiska dyner som sträcker sig 70 mil söderut i Namib-Naukluft National Park. På vår sida om flodbädden fanns det också dyner, men dessa var små och delvis buskklädda. Efter en stunds letande hittade vi ett exemplar av den blekt rödbruna och tämligen ostreckade *dune lark* och det var antagligen samma exemplar som vi såg vid ytterligare några tillfällen senare. I området noterades även bl a *diderick cuckoo*, *namaqua dove*, *white-backed* och *red-faced mousebird*, *common scimitarbill*,  *dusky sunbird* och *common waxbill*.

Vi begav oss sedan ned till de leriga tidvattenstränderna och grunda strandlagunerna söder om Walvis bay. Här rådde ett enormt myller av fåglar – i den tunga klassen dominerade tusentals *greater* och *lesser flamingos* samt mängder av *white-breasted* och *cape cormorants*. Tärnor av fem arter satt på bankarna – *caspian*, *swift*, *sandwich*, *common* och *damara* – den sistnämnda en endemisk art, nära släkt med småtärnan, men med grå översida och helt svart hjässa. Vadarna dominerades av *curlew sandpipers* och *little stints*, men här fanns också många andra arter, bland vilka kanske hundratalet *chestnut-banded* och tjugotalet *white-fronted sandplovers* var de mest intressanta för oss. Ett antal *bottlenosed dolphins* sam inte så långt från stranden.

Efter lunch på Kentucky Fried Chicken tillbringade vi några tidiga eftermiddagstimmar i Bird Paradise, ett reservat med vassomgärdade sötvattensdammar i östra utkanten av Walvis bay. Även här var det ett rikt fågelliv med bl a *black-necked* och *little grebes*, *purple herons*, *south african shelducks*, *cape* och *hottentot teals*, *cape shovelers*, *southern pochards*, *maccoa ducks* och *african purple swamphens*.


Vi förflyttade oss sedan till stranden innanför den berömda guano-plattformen norr om Walvis bay, men tyvärr var avståndet ut till denna alldeles för långt för att vi skulle kunna artbestämma andra skarvar än *cape* och *whitebreasted*. Här fanns också ca 50 *white pelicans*, en *african black oystercatcher* samt gott om *turnstones* och *sanderlings*.

Som avslutning på dagen körde vi en lång slinga in i öknen för att främst titta på de märkliga *welwitschiarna*, stora och uppemot 2000 år gamla ökenväxter som närmast såg ut som växtvärldens svar på bläckfisken. Fågellivet var inte så överdrivet rikt, men vi såg bl a ett tiotal *ostriches* och två *rüppell's korhaans*. Som vanligt blev det sen återkomst till förläggningen – de som orkade gick dock och åt på en utmärkt och som alltid prisbillig kinesisk restaurang.



4/11. Denna dag körde vi norrut genom ökenlandskapet. Huvudmålet var Spitzkoppe, ett märkligt solitär och vasst bergsmassiv, några timmars resa från Swakopmund. Här gällde det först och främst att få se *Herero chat*, en av hel-endemerna i Namibia. Jodå, efter ca en timmes letande kom vi på ett par som vi fick se oerhört bra under en lång stund. Andra fina fåglar här var två *verreaux's eagles*, en *booted eagle* av ljus fas, tre *augur buzzards*, tre *rosy-faced lovebirds*, två *bokmakieries* och tre *white-tailed shrikes*.





Längs vägen under dagen noterades bl a ca 15 *rüpell's koorhans*, flera flockar med *namaqua sandgrouses*, fyra *southern yellow-billed* och två *monteiro's hornbills*, över 200 *grey-backed sparrowlarks*, två *karoo long-billed larks* samt tio *scaly-feathered finches*. Vid ett stopp i en uttorkad floddal med mycket stora träd hittade vi också två *rüpell's parrots* och tre våldsamt hänskrattande *violet wood-hoopoes*.

Vi övernattade i den lilla f d gruvstaden Uis och det visade sig att det i det redan låga priset för övernattningen också ingick helstekt lamm till middag. Lammet var så mörkt så det smälte i munnen – det bästa jag har ätit !



**5/11.** Dagen innan hade vi sett karoo long-billed lark, d v s en av de många arter som long-billed lark nu splittats i. Nu hade Teet också en bra lokal för *benguela long-billed lark*, en uttorkad floddal med en del träd och buskar några mil norr om Uis. Just när vi anlände till platsen korsades vår väg av en åsnekärra med två äldre män. De följde en väg, snarast två spår i sanden, in i benguela-lokalen och ropade att de skulle till stan. Stan måste ha varit Uis och dit var det säkert över tre mil – de hade en lång färd framför sig. Vår vandring blev avsevärt kortare, men

det tog ändå en god stund innan vi fick korn på ett exemplar av eftersökt art. På vägen tillbaka mot bilen fick någon se en smärre orm slinka in i en liten låg buske. Det var en slags snok, men då vi kikade närmare visade det sig att det här fanns ännu en orm , tillika en inte helt ofarlig sådan. Det var en vackert tegelröd *hornorm*, visserligen ett mycket litet exemplar, men ändå synnerligen alert och aggressiv. Om det nu i en sådan liten buske fanns hela två ormar, hur många fanns det då inte i alla hundratalet andra buskar i området ?

Vår färd norrut gick på hyfsade grusvägar i mycket obebyggda områden och med ett tilltagande inslag av mopane- skog. Enstaka spring- och stenbockar syntes, liksom 5-6 *rüpell's* och en *red-crested korhaan*, den senare ny art för resan. Ny var också *southern white-crowned shrike*. Rovfåglarna var mer talrika än tidigare – vi antecknade bl a tre *black-chested* och lika många *brown snake-eagles*, liksom två par av *african hawk eagle*. När vi stod och tittade på det andra paret av sistnämnda art upptäckte vi ett antal stora flockar av flyghöns flyga fram och tillbaka ett stycke framåt längs vägen. Snart blev vi varse varför – alldeles invid vägen fanns ett rejält vattenhål och här pågick en ändlös trafik med *namaqua sandgrouses* som flockvis landade, drack vatten och blötte bröstfjädrarna för att sedan mycket snabbt flyga iväg och ge plats åt nya flockar i en till synes aldrig sinande ström. Det rörde sig säkert om tiotusentals fåglar och de erbjöd ett helt otroligt skådespel och en av resan riktiga höjdare, enligt de flestas mening. I och vid dammen fanns också en del andra fåglar – ett tiotal *little grebes*, ett par + sju ungfåglar av *south african shelduck*, tre *ruffs*, en *black-winged stilt*,

över 300 *grey-backed sparrow-larks* samt ett antal *red-headed finches*. Hökörnarna hade landat i ett träd alldeles nära dammen, men visade inget som helst intresse av att söka knipa sig en flyghöna.

En stund efter vattenhållet fick den ena bilen punktering, men hjulet kunde snabbt bytas på plats och som tur var så var vi bara några mil från den lilla orten Kamanjab där det fanns en bensinstation. Här konstaterades att däckets reva var så stor så det var bara att köpa ett nytt för 1500 kr. Medan vi väntade fotograferades några kvinnor av den mycket primitivt levande Himba-stammen - nästan nakna och med kropparna insmorda i en blandning av fett och ockra som gav dem en vackert brun färg.

Vi fortsatte sedan norrut, men hade inte kört långt förrän den andra bilen också fick punktering. Medan vi bytte däck såg vi på lite halvhåll en hona av *pygmy falcon* – det skulle visa sig bli resans enda exemplar av den arten. Strax därefter kryssades en annan fin rovfågel – en *bateleur*.



Vårt mål var Hobatere Lodge som ligger i ett stort privat reservat om ca 35 000 hektar, väster om och i direkt anslutning till den jättelika Etosha national park. Lodgen är mycket trivsamt och ligger i en fin trädgård med mycket fågel intill ett större öppet område med flera vattenhål. Här inledde vi med en timme i ett gömsle invid ett av vattenhålerna och därefter följde vi med ut på en game-drive i ett av parkens fyrhjulsdrivna fordon. Från gömslet såg vi en hel del *springbockar*, *gemsbockar*, *större kudus*, *bergszebror* och *vårtsvin* samt av fågel bl a en *lanner falcon* och två *ostriches*. Game-driven gav fler däggdjur av samma arter samt dessutom några *giraffer* och ett antal *springharar*, kaninliknande varelser som hoppade på bakbenen som kängurur. Av fågel såg vi bl a två *rüppell's parrots*, sju *rosy-faced lovebirds*, två *african cuckoos*, en *verraux's eagle owl* mycket nära och fint, *african grey*, *damara*

och *monteiro's hornbills*, två *carp's tits*, två *anteating chats* och flera *white-tailed shrikes*. Som avslutning hittade vi ett par av den erkänt mycket svårfunna *hartlaub's francolin*, som vi kunde beskåda på närhåll under en lång stund.

Efter middagen gav vi oss ut på en kort natur, också nu med lodgens fordon, under ledning av ägaren, Steve Braine, själv ivrig ornitolog, och en av hans svarta guider som skötte den starka strålkastaren. Utbytet blev bl a fyra *småfläckiga genetter*, en *afrikansk vildkatt*, *färiska spår av leopard*, två *african scops owls* ( en såg vi mycket fint ) samt en *pearl-spotted owlet*.

**6/11.** Vi inledde med en morgontur under ledning av Steve Braine. Den gav bl a *rüppell's parrot*, *violet wood-hoopoe*, *carp's tit*, *bare-cheeked babbler*, *rockrunner* ( två ex hörda ) samt *white-tailed* och *southern white-crowned shrike*. Spår av *brun hyena* demonstrerades.

Efterföljande spaning kring lodgen bjöd på en hel del rovfågel – ca tio *white-backed vultures*, en *lappet-faced vulture*, tre *booted eagles*, en *augur buzzard* samt en *gabar goshawk*. Vidare antecknades bl a också ett tiotal *rosy-faced lovebirds*, några *olive bee-eaters* ( endast hörda ) samt två *golden-breasted* och över tio *cinnamon-breasted buntings*.

Efter lunch gav vi oss iväg mot Etosha. I Hobatere-reservatets västra del såg vi resans första *klippspringare* – 2 ex - och en stund därefter ett par av *african hawk eagle* och en *augur buzzard*. Vid vår kära bensinstation i Kamanjab lät vi nu laga ett däck på vardera bilen – det tog lite tid, men i gengäld kostade det bara ca 35 kr per däck, en våldsam skillnad således mot att köpa ett nytt. Efter Kamanjab tog vi väg C 40 rakt österut. Både den och vägen in i Etosha-parken ( C 38 ) var asfalterade och vi kunde följaktligen köra mycket snabbt, vilket innebar att det inte blev så värst mycket fågelobsar längs vägen. Vi såg egentligen bara ett antal *southern pale chanting goshawks* och två *ostriches*.

Vägen från Anderson Gate till Okaukuejo Camp i Etosha såg alldeles oerhört karg ut – torra grå buskar och ingen markvegetation att tala om. Inte desto mindre visade det sig redan här och framför allt senare att parken hyste massor av större däggdjur som såg ut att klara sig alldeles utmärkt. Av fåglar kryssades *northern black korhaan* och *spotted thick-knee*.

Efter en mycket omfattande och god buffémiddag med bl a ett antal grillade viltfiléer av olika slag drog vi till det elbelysta vattenhålet. Knappt var vi på plats förrän en massiv skepnad sakta materialiserade sig ur dunklet – det var en *spetsnoshörning* som kom lunkande mycket målmedvetet med kurs mot vattnet. Senare på kvällen kom ytterligare tre exemplar – en vuxen och en hona med unge – samt 2+2+3+2 *elefanter* och en flock om femton *lejon*. Lejonflocken innehöll en kraftig hanne som ideligen parade sig med en av honorna. I bakgrunden, ett stycke ute i dunklet på den öppna stäppen, stod *giraffer*, *zebror*, *större kudus*, *gemsbockar*, *gnuer* och *springbockar* i mindre grupper och inväntade ett lämpligt tillfälle att komma fram och dricka. I luften rörde sig massor – säkert över tjugo – *rufous-cheeked nightjars* och vi hörde dem också spinna, ganska likt vår egen nattskärva.



7/11. Så fort Okaukuejo-campens grindar öppnats drog vi ut mot nordväst med våra bussar. Ganska snart kom vi ut på en mycket karg stäpp och här fick vi tämligen omgående se resans första *kori bustard* – det skulle bli 7-8 ex av denna världens största trapp under dagen. En annan stor trapp kom flygande över vägen för att landa några hundra meter bort – det syntes direkt att det här var frågan om den sedan flera dagar efterspanade *ludwig's bustard* ! Efter bl a en del mindre trappar i form av både *northern black* och *red-crested korhaans*

samt en *wahlberg's eagle*, flera *greater kestrels* och några *double-banded coursers* kom vi så till Okondeka waterhole alldeles i kanten av den oändliga, vita Etosha Pan – en uttorkad sjöbotten, stor som Vänern hemma ( hela Etosha-parken är ungefär så stor som Dalarna ! ). På vägen framför oss hade en jeep stannat och snart såg vi orsaken – två *lejonungar* hade sökt skugga under den ! *Lejonhonan* kom sakta lunkande längs vägen med halvöppen käft och blodig hals efter en nyss avslutad måltid, men efter inspektion av läget föreföll hon tycka att ungarna var säkra för hon vände åter mot skuggan under ett stort träd där det låg ytterligare ett tiotal *lejon*. Nere vid vattenhålet fanns det massor av djur som föreföll helt obesvärade av de stora katternas närvaro. Det var *giraffer*, *zebror*, *större kudus*, *gemsbockar*, *gnuer*, *springbockar* och *strutsar*, sammanlagt flera hundra individer. Flockar kom och gick hela

tiden och en del djur rörde sig faktiskt ute på den totalt sterila sjöbotten – antagligen för att inte riskera att bli utsatta för bakhåll från rovdjur.

En *peregrine falcon* hann dra förbi innan vi ställde kosan tillbaka mot Okaukuejo. Efter ett kort tag upptäckte vi en samling gamar på marken ca 500 meter från vägen. Det var naturligtvis mest *white-backed* men också säkert ett dussin *lappet-faced vultures*. På vägen spanade vi alldeles särskilt efter rara lärkor, men såg mest sådana vi redan sett med en kraftig dominans av *red-capped larks*. Plötsligt ropades det ”cheetah”, men det var bara en *afrikansk vildkatt*, förfadern till vår huskatt, som satt så fint ett stycke från vägen och tittade intresserat på oss med de stora skära öronen genomlysta av solen. Strax innan vi kom tillbaka till Okaukuejo såg vi fyra kretsande stora fåglar. Det var resans – som det skulle visa sig – enda *secretary birds*.

I Okaukuejo checkade vi ut från stugorna, tittade på en del fågel inne på campen samt gjorde ett kort besök vid vattenhållet. I avsaknad av större rovdjur – de dricker tydligen bara på natten – vågade sig nu betydande mängder av framför allt *större kudu* och *springbockar* ned för att dricka. Här fanns också en hel del *double-banded sandgrouses*.

På eftermiddagen begav vi oss österut mot Halali. Vid ett vägskäl letade vi i mycket låg buskvegetation fram två individer ur den lilla isolerade population av *rufous-eared warblers* som fortfarande häckar i Etosha, säkert hundra mil från det huvudsakliga utbredningsområdet längre söderut. Vi tog sedan en vägslinga som tog oss till vattenhållet Gemsbokvlakte, Olifantsbad och Aus. Stora gamskruvar började att dyka upp, men tyvärr hittade vi inga nya vägnära samlingar på marken. Vi kunde dock, liksom tidigare på dagen, konstatera ett rejält inslag av *lappet-faced vultures*. I övrigt var det inte så vidare gott om fågel men vi fick mycket fina observationer på ett eller två par av *african hawk eagle*. Av däggdjur såg vi allt fler *svartmaskade impalas* ( en sällsynt ras ) samt en hjord om minst 20 *elefanter* alldeles invid vägen nära Aus.

Vi ankom till vår nästa övernattningsplats, Halali Camp, ca en timme före skymningen. Här gjorde vi nu ett av resans få taktiska misstag. Eftersom de ”tung” däggdjursarterna vid vattenhållet i Okaukuejo hade kommit in en god stund efter solnedgången, beslöt vi att först äta och sedan ta oss ned till campens vattenhål när det blivit mörkt. Då det var en stund kvar till skymningen gjorde jag en snabb rekognosceringstur bort till vattenhållet, varvid jag kunde konstatera att det här fanns betydligt fler åskådare än djur. Det enda som syntes var en flock pärlhöns, så jag tog ned tuben igen efter bara någon minut och begav mig till restaurangen för att avnjuta ännu en superb buffémiddag. Innan middagen var över drog Axel iväg till vattenhållet och när vi en halvtimme senare kom dit kunde han berätta att vi just missat en noshörning och 27 elefanter. Vi satt dock inte länge förrän det dök upp en ny *noshörning* som så småningom avlöstes av ytterligare några individer samt några *elefanter*. Nu började de som uppenbarligen suttit här hela kvällen att lämna platsen och då passade jag på att fråga en av dem om det var en spets- eller trubbnoshörning som setts innan vi anlände. ”Trubb” blev svaret och då han sedan också berättade att det kommit fram en leopard före skymningen och attackerat en fågel insåg jag att vi hade missat de två tyngsta däggdjursarterna i Etosha. Sedan hjälpte det inte att jag som sista spanare satt kvar till klockan ett – det blev inga fler leoparder eller trubbnoshörningar den kvällen. Däremot kom det ständigt nya *spetsnoshörningar* fram ur dunklet – sammanlagt kunde jag räkna in hela nio individer. Var någonstans kan man idag få se så många på en plats under en kväll ? Vid 23-tiden kom ett vaggande hus ut ur den dunkla mopaneskogen i söder – en stor *elefant*, tätt följd av en till och en till och så till slut sammanlagt tjugo djur varav ungefär hälften ungar. *Elefanterna* hade nu stor show nere i

vattenhålet – drack, sprutade vatten, badade och småbråkade. Mellan besöken av de stora djuren smög sig flera *hyenor*, sammanlagt fem, fram för att dricka.

Medan jag vaktade vid vattenhålet hittade Teet och Ulf den *honungsgrävling* som regelbundet brukade slå omkull och rota i lägrets tunnor i mörkret. De hörde också en spelande *southern white-faced scops-owl*.

**8/11.** Kvällen innan hade vi av en amerikansk grupp (Rockjumper under ledning av Adam Riley), som hade kört parallellt med oss ända sedan Windhoek, fått reda på ett dagträd för en *southern white-faced scops-owl* i Halali. På plats kunde vi konstatera att det faktiskt rörde sig om två individer. Vi hann också se 5-6 *violet wood hoopoes* innan vi lämnade Halali för nya äventyr. Färden gick vidare österut och vi kunde bl a konstatera att det här sannolikt var som tätast med större djur – *zebror*, *giraffer*, *gnuer* m fl. Vid ett tidigt stopp såg vi ett stort antal gamar, bl a ca 10 *lappet-faced* och resans första och enda *white-headed vultures*. Vi körde ett stycke ut på Etosha pan vid en plats som hette Etosha lookout. I detta sterila landskap saknades fåglar, men utsikten över det oändliga flata området var minst sagt imponerande.

Den 25 kilometer långa slingan ut mot Okerfontein gav bl a två fina *lanner falcons*, men sedan sågs ingenting av större ornitologiskt värde förrän vi kom upp till Andoni plains i parkens nordostligaste hörn. Den stora grässtämpan här påminde inte så lite om Serengeti i Tanzania, inte minst p g a mängderna större däggdjur. Här hittade vi också bl a 18 *blue cranes*, flera *kori bustards*, en grann hane av *pallid harrier* – mycket ovanlig i södra Afrika – flera *magpie* och *lesser grey shrikes* samt ett stort antal lärkor av minst fyra arter, bl a äntligen tre ex av den i flera dagar eftersökta *pink-billed lark*.

Vid vattenhålet i Namutoni camp sågs en jätteflock om minst 5000 *red-billed queleas* samt hördes en *barn owl*.

**9/11.** På morgonen körde vi två varv runt en liten slinga, Dik-dik drive, söder om Namutoni och såg mycket riktigt ett antal *damara dik-dikar*, en synnerligen näpen liten antilop, ungefär så stor som en hare. Här noterade vi också en *red-crested korhaan* samt två nya arter av *babblers* – *black-faced* och *southern pied*.

Tillbaka i campen strövade vi en stund kring denna. Här var det mycket fågelrikt och vi kryssade en rad arter – *red-necked falcon*, *meyer's parrot*, *red-breasted swallow* ( en verklig jätte ! ), *house martin*, *yellow-breasted apalis* och *blue waxbill*.



Vid frukosten kunde vi konstatera att Micke fått ett kraftigt återfall i den influensaliknande sjukdom som härjat i gruppen, liksom att Kjell som varit sjuk i över en vecka inte blivit bättre. Vi beslutade därför att köra dessa två till ett privat sjukhus i den relativt närbelägna staden Tsumeb, som låg längs vår fortsatta färd norrut. På sjukhuset konstaterades att båda hade ca 39 graders feber och höll på att få lunginflammation samt att de var kraftigt

uttorkade. De fick därför ligga kvar för att antingen ta sig norrut efter oss på något sätt eller bli hämtade på vår väg söderut fyra dagar senare. Medan vi väntade på besked från sjukhuset strövade vi i det parkliknande exklusiva villaområdet kring sjukhuset och kryssade *violet-backed starling*.

Färden mellan Tsumeb och Rundu var tämligen händelsefattig – ett starkt intryck gjorde dock de stora mängderna *common swifts* och *barn swallows* längs vägen. Vilka hade häckat under tegelpannorna eller bryggan hemma ?

Halvvägs mot Rundu passerade vi den sk veterinärlinjen (veterinary cordon fence), ett staket uppsatt tvärs över Namibia med syftet att hindra spridning av mul- och klövsjuka söderut. Norr om linjen fanns det betydligt mer av både människor och boskap och här hade vi kommit in i det ursprungliga och primitiva Afrika. Det var tätt mellan de små byarna som normalt bestod av ett mindre antal runda lerhyddor med vasstak inom en hägnad av taggiga buskar.

Ett stycke söder om Rundu stannade vi vid den i skådarkretsar välkända TV-masten. Miombo-skogen runt om hade både huggits och brandhärjats, men det visade sig ändå finnas en hel del fågel här. Målarten *rufous-bellied tit* hittades lätt i minst två exemplar och vidare visade sig *klaas's cuckoo*, *african yellow white-eye*, *white-browed scrub-robin* och *chin-spot batis*. I skymningen ankom vi till staden Rundu, där vi hade ett styvt jobb att hitta till vårt natthärbärge Sarasungu River Lodge nere vid gränsfloden mot Angola. Strax innan lodgen låg en lång orm, ca 150 cm, tvärs över vägen. Den var ljus gråbrun med en del mörka fläckar under och rörde huvudet blixtnabbt när den blev irriterad på någonting sedan den ringlat ned i det grunda diket. Detta kunde inte var något annat än en *svart mamba*, världens kanske mest fruktade orm och med gift tillräckligt att döda dussintals människor !

**10/11.** Sarasungu River Lodge hade både ett utomordentligt fint läge invid Kavango-floden och en mycket vacker och fågelrik trädgård. Eftersom vi nu dessutom befann oss i en helt ny klimat- och vegetationszon var det inte så konstigt att nya arter duggade tätt under vår morgonexcursion kring lodgen. Vi började nere vid floden som kantades av ett smalt vassbälte. På andra sidan låg Angola och kvinnor och barn från den närmaste byn kom successivt ned till floden för att tvätta eller bada – en alltigenom idyllisk och rofylld stämning rådde. Nya fågelarter här blev *little bittern*, *spur-winged goose*, *black crane*, *african jacana*, *lesser jacana*, *rock pratincole*, *coppery-tailed coucal*, *ped kingfisher*, *little bee-eater*, *wire-tailed swallow*, *wattled starling* och *southern brown-throated weaver*. Särskilt *lesser jacana* och *rock pratincole* – två respektive ett exemplar – var ganska oväntade här. I trädgården kryssades *red-eyed dove*, *emerald-spotted wood-dove*, *green wood-hoopoe*, *Hartlaub's babbler*, *kurrichane thrush*, *white-browed robin-chat*, *swamp boubou*, *white-bellied* och *amethyst sunbird* samt *golden* och *red-headed weaver*.

Efter frukosten drog vi till Rundu sewage works där vi tillbringade några mycket varma förmiddagstimmar. I själva dammarna var det gott om fågel även om riktiga topp-arter saknades. Här såg vi bl a en ensam *abdim's stork*, tio *hottentot teals*, ett par *southern pochards* samt ett antal *purple gallinules* och *african jacanas*. Norr om dammarna utbreddes sig en torr ängsmark växlande med en del våtare områden med vass. Här noterade vi tre *squacco herons*, två *rufous-bellied herons*, en *comb duck* hanne, två *booted eagles*, en *bateleur*, en honfärgad *european marsh harrier* ( lite sensationellt så här längs söderut ), en *lanner*, en *african rail*, en *lesser jacana*, tre *african snipes*, en *senegal coucal* samt ett femtontal *blue-cheeked bee-eaters*.

På vägen mot Popa falls gjorde vi ett lamt försök att skåda i ett stycke Miombo-skog, men det var nu alldeles för hett för både oss och fåglarna.

Framme vid Popa falls tvärbromsade vi för en misstänkt roller – det var nu bara en *lilac-breasted*, men i samband med det stoppet upptäckte vi 8-10 *red-billed oxpeckers* på några kossor. De blev faktiskt de enda på hela resan. Ett nytt försök att skåda Miombo-arter strax utanför grindarna till Mahango-reservatet gav inte heller något så vi drog till Popa falls där vi checkade in i de tämligen enkla stugorna i turistcampen. Nere vid fallen – eller snarare forsarna - hittade vi bara en enda *rock pratincole*, men den nöjde vi oss med eftersom vi ju dessutom sett arten tidigare vid Sarasungu. En *martial eagle*, en *bateleur* och en *peregrine falcon* drog förbi. *Terrestrial brownbul* samt *black cuckoo* noterades i övrigt och några såg också *giant kingfisher* och *mosque swallow*. En *halsfläckig utter* lekte i vattnet. På kvällen såg och hörde vi två *african wood-owls* kring stugorna.

**11/11.** På morgonen hängde vi på låset till Mahango Game Reserve – grindarna öppnade inte förrän kl 7. Detta lilla, men oerhört fina reservat utgörs av dels flodängar och papyrusfält kring Okavangofloden, dels mer torra Miombo-marker längre åt väster. Trots sin litenhet är det oerhört viltrikt och på den alltför korta tid – ca 4 timmar – som stod oss till buds räknade vi in åtskilliga *chacmababianer*, 2-3 *markattor*, tio *zebror*, 15 *vårtsvin*, två *flodhästar*, 20 *giraffer*, 30 *afrikanska bufflar*, fem *större kudus*, 11 *roan-antiloper*, 50 *sydliga rörbockar*, 20 *lechwe-antiloper*, 20 *röda koantiloper* och 30 *impalas*. Här finns också elefanter, lejon, sabelantiloper och sitatungas, men dessa missade vi tyvärr.

Fågelfaunan var likaledes synnerligen imponerande med många nya arter/resarter : *goliath heron*, *great white egret*, *wooly-necked*, *saddle-billed*, *marabou* och *yellow-billed stork*, *white-faced duck*, *afrikan harrier hawk*, *eurasian hobby*, *wattled crane*, *long-toed plover*, *water thick-knee*, *red-winged pratincole*, *afrikan skimmer* och *southern carmine bee-eater*. Nästan alla fina djur och fåglar syntes på flodängarna eller nere över floden.

Vägen in in Botswana går rätt igenom Mahango-reservatet och efter en, som i alla u-länder, löjligt omständlig passprocedur fortsatte vi mot Shakawe Lodge vid Okavango-floden. En bit efter gränstationen tog dock bensinen i vår bil slut och Teet fick därför följa med den andra bilen till lodgen för att där förhoppningsvis uppbringa en reservdunk. Medan vi väntade vid vägkanten kom en ung kvinna med ett litet barn på armen fram till vår bil och vi fick nu en liten, men tillräckligt skakande inblick i vardagen för många människor i denna del av världen. Hon hade två barn och hennes man hade "passed away" för någon månad sedan. Vi tänkte osökt på AIDS – 38 % av Botswanas befolkning lär vara HIV-infekterade. Även hennes föräldrar var döda och hon hade bara gamla 80-åriga farmor kvar. De kvarlevande hankade sig uppenbarligen fram på svältgränsen och det kändes plötsligt väldigt konstigt att dra omkring och skåda fåglar samt bo och äta furstligt i denna omgivning. Men det enda vi kunde göra var att samla ihop vad vi hade av matvaror i bilen och ge henne dessa. Sedan dök Teet upp med en dunk av någon mystisk soppa han fått på lodgen – den dög i alla fall som bränsle fram till bensinstationen i det lilla samhället Shakawe som till vår stora lycka faktiskt hade bensen, därtill t o m blyfri.

Några timmar efter den andra bilen nådde vi så till sist Shakawe lodge, där vi hälsades välkomna av Elaine Price, ehuru född i Afrika hur coolt urengelsk som helst. Tillsammans med sin man hade hon drivit denna lodge ute i ödemarken i över 30 år – mannen var nu i England på besök och hon var ensam på plats med sin son och sin svarta personal. Vi fick

snabbt en försenad lunch med utsikt över en liten lotustäckt damm med egen *krokodil* och ett rikt fågelliv. Här fanns bl a *green-backed heron*, *african jacana*, *giant* och *woodland kingfisher* samt *black-collared* och *crested barbet*.



Lodgen låg precis vid stranden av Okavango-floden i en fin galleriskog. På programmet stod först en flodtur, sedan länge emotsedd med stor spänning. Eftersom lodgen bara hade en båt fick vi åka ut i två skift med Elaine som förare och guide ( hon kunde sina fåglar ! ). Vattnet var exceptionellt lågt vilket dels – positivt – blottade åtskilliga sandbankar där fåglar kunde stå, dels – negativt – gjorde att vi inte riktigt kunde fara överallt. Artlistan kom att bl a omfatta *goliath*, *squacoo* och *green-backed heron*, *little bittern*, *hamerkop*,

*white-faced duck*, *african fish eagle*, *wattled plover*, *water thick-knee*, *red-winged pratincole*, *white-winged black tern*, *african skimmer*, *pied* och *malachite kingfisher* samt *southern carmine*, *white-fronted*, *blue-cheeked* och *little bee-eater*, de flesta arter i goda antal och på fantastiskt fint observationshåll. Både *krokodiler* och *flodhästar* var allmänna. Från campen sågs även *openbilled stork*, ytterligare en *rock pratincole*, ett dussin *meyer's parrots* samt en *broad-billed roller*.

På kvällen for vi ut igen för att söka efter *pel's fishing-owl*, den kanske viktigaste målarten vid Shakawe. Grupp nummer två hittade en direkt, medan grupp nummer ett fick den först vid det andra försöket efter middagen. Ugglan är mycket stor, fjäderyvig och närmast apelsinfärgad med stora svarta fuktglänsande ögon.



**12/11.** Hela denna dag tillbringades i och vid Shakawe lodge. På morgonen inledde vi med några båt-turer som bl a gav 120 *open-billed* och 13 *yellow-billed storks* samt 100 *white-faced ducks*. Vi passerade också en stor koloni av *southern carmine bee-eaters* och det var ett otroligt skådespel när hundratals av dessa fåglar nästan samtidigt lyfte ur papyrusen på andra sidan floden och strömmade över till häckningsbrinken för att mata. I ett fikonträd frossade mängder av fågel på frukterna, bland dessa bl a ett antal *african green pigeons*, några *bradfield's*

*hornbills* samt *violet-backed* och *wattled starlings*. Från båten syntes också *lesser striped* och *grey-rumped swallows* samt *luapula cisticolas*.

Under dagen blev det inte färre än sex nya rovfågelarter – *honey buzzard*, *steppe eagle*, *african goshawk*, *african hobby*, *dickinson's kestrel* och – finast av allt och därtill synnerligen oväntat – en *bat hawk* som mitt på ljusa morgonen kom flygande förbi båten på närhåll. Kring lodgen noterades bl a *levaillant's cuckoo*, *lesser honey-guide*, *garden warbler*, *ashy flycatcher* och *red-billed firefinch*.



Lodgens lilla runda swimmingpool hade ett mycket grumligt vatten och när det på eftermiddagen började flyta upp löv misstänkte Elaine att det kunde ligga en krokodil (!) på botten. Ingen, inte ens badfantomen Anders, tordes dock testa hypotesen, trots att lufttemperaturen på eftermiddagen överskred 40 grader i skuggan. ....Och apropå olika faromoment i att leva på lodgen berättade Elaine bl a att dottern hade haft malaria åtta gånger under sina åtta första levnadsår och att man årligen sköt 15-20 svarta mambor kring husen. Elaine tyckte dock att puffadders och kobror – också de mycket vanliga – var betydligt lömskare.

På kvällen hördes en spelande *fiery-necked nightjar* i söder.

**13/11.** Detta blev en nästan ren transportdag – vi hade över hundra mil att köra till Windhoek och vi skulle dessutom plocka upp våra sjuklingar från deras hotell i Tsumeb. I miombon nära norra entrén till Mahango game reserve noterades bl a *striped kingfisher*, *fiery-necked nightjar* ( stöttes och spelade vingskadad ), *fawn-coloured lark*, *black-headed oriole* och *pale flycatcher* och längs vägen mellan Popa falls och Rundu stannade vi för resans enda *dark chanting goshawk*.



Noterbart i övrigt var otrevligt många *vårtsvin* i väggkanten i skymningen på en sträcka ca 20 mil norr om Windhoek, dit vi ankom vid 21-tiden. Den utmärkta lodgen här ställde upp med såväl sen middag denna kväll som tidig frukost nästa morgon.

**14/11.** Vi steg upp tidigt och var vid Avis dam strax efter soluppgången. Vårt syfte var att söka få se eller höra orange river francolin, men av detta blev det intet. Däremot kunde de som inte sett *shaft-tailed whydah* här förra gången nu kryssa denna art.

Efter en timme fortsatte vi mot flygplatsen, där vi trots en kaotisk situation – utomordentligt dålig ordning – kunde lämna Windhoek och Namibia med kurs mot Cape Town. Här var det som vanligt trassel med bilarna – de var bokade till en senare tidpunkt på dagen och de var dessutom inte WV-bussar utan i och för sig nya, men något för små Kia-bussar.

Medan vi väntade på bilarna kryssade vi *house crow* samt *common* och *red-winged starling* på parkeringsplatsen. Så småningom kom vi också iväg till Rondevlei, ett litet naturreservat där vi mötte Callan Cohen, namnkunnig lokal skådare, som skulle bli vår guide under resten av dagen. Callan trodde inte att Rondevlei skulle kunna ge oss något nytt, så han tog istället med oss på en lång bilfärd till den lilla orten Rooi Els, 5-6 mil öster om Cape town. Här gjorde vi en vandring längs en grusväg genom kust-fynbosen, en vegetationstyp närmast att jämföra med maccian i Sydeuropa. Nya arter duggade in tätt – först och främst den eftertraktade endemen och synnerligen märkliga *cape sugarbird* men också *jackal buzzard*, *african black swift*, *white-necked raven*, *cape bulbul*, *cape rock thrush*, *grassbird*, *karoo prinia*, *fiscal flycatcher*, *orange-breasted sunbird*, *yellow bishop*, *cape bunting* och den svårobserverade *cape siskin*. Två mäktiga *verreaux's eagles* kom glidande längs bergssidan.

Vi fortsatte sedan till Stoney point, en udde som mest är känd för att hysa en av de två fastlandskolonierna av *african penguin*. Från en utkiksplattform kunde vi på närhåll titta på de flera hundra fåglarna där de häckade tillsammans med *fyra arter cormorants* – förutom de talrika och tidigare sedda *white-breasted* och *cape* även de för oss nya *bank* och *crowned*. I närheten noterades också en flock om nio *african black oystercatchers* och tre *yellow-billed ducks* samt *cape francolin*, *speckled mousebird*, *cape weaver* och *cape canary*. Ute över havet syntes att antal *cape gannets* och *parasitic jaegers*.

Rätt sent, som vanligt, tog vi in på vårt hotell, Flora Bay Resort med fantastisk sjöutsikt i byn Hout Bay på utsidan av Cape Peninsula. Middagen intogs på en stor sea-food-restaurant, inredd som en rad fartygssalonger. Här frossades på främst skaldjur – väldigt gott !

**15/11.** Denna dag skulle vi skåda kring Cape Town och plocka in resten av kap-endemerna m m. Som inhyrd guide hade vi nu David Winter, liksom Callan från Birding Africa. Vi inledde med en kort vandring längs Klaassenberg trail, som gick genom högväxt skog med tät markvegetation på sluttningen av Table mountain. Här spelade vi fram två olika *knysna warblers*. De sjöng högljutt, men var stört omöjliga att få syn på i den täta markvegetationen av främst stora ormbunkar. *Knysna warbler* lär vara en fågelvärldens värsta skulkare – jämfört med den är en videsångare på Öland rena exhibitionisten ! När vi stod och sökte få syn på knysnan hördes ett märkligt läte, som en mistlur på avstånd. Det var en *buff-spotted flufftail*, en annan fruktad superskulkare. Trots att vi lockade den alldeles intill oss lyckades vi inte få syn på den heller – vår guide hade f ö bara sett arten två gånger ! Vi fick trösta oss med att titta på *cape batis* och *cape white-eye*, som också fanns på plats i skogen.

Nästa lokal blev Kirstenbosch botanical garden, en av världens finaste botaniska trädgårdar. Här vandrade vi runt bland proteor och andra vackra blommor och kryssade *african olive pigeon*, *sombre greenbul*, *olive thrush*, *cape robin*, *southern boubou*, *lesser double-collared sunbird*, *chaffinch* ( ja, just det – vanlig bofink, inplanterad här för länge sedan ! ) och *forest canary*. Här återsåg vi också flera fina *cape sugarbirds* och *orange-bellied sunbirds*. Ett stycke från parken gjorde vi ett besök vid ett bo av *spotted eagle owl* – honan satt och vaktade två gråduniga ungar i en stor trädklyka.

Efter en lång färd genom stadsbygden kom vi till Blouvillei, ett litet privat våtmarksreservat, inklämt mellan motorvägar, shopping-centrum och allmän ruderatmark. Detta till trots fanns här massor av våtmarksfåglar. Vi letade främst efter painted snipe, som setts här senast föregående dag, men fick nöja oss med bl a en *purple heron*, tre *little bitterns* på mycket nära håll, två *glossy ibis*, ett par *white-backed ducks* med ungar, en *african snipe*, *Levaillant's cisticolas*, en *malachite sunbird* samt ett antal *southern red bishops*, strålande vackra i rött och svart.

Vi drog sedan tillbaka genom staden och ut på the Cape Peninsula där vi började med en misslyckad skallgång efter hottentot buttonquail. Sedan besökte vi ett mycket vackert strandavsnitt med insprängda vita sandstränder – här fanns bl a 20 *glossy ibises*, 16 *african black oystercatchers*, fyra *white-fronted plovers* samt en massa *swift*, *sandwich* och *common terns*.



Dagen avslutades med ett besök på Cape of Good Hope där ett av de mest frekventa språken denna dag var svenska. Här befann sig nämligen två av de skära bussarna (med svenska flaggor på sidorna) och deras passagerare som stod i begrepp att resa norrut genom Afrika. Udden är såväl vacker som magisk, men Cape Point två kilometer åt öster är både sydligare och mer dramatisk (men sydligast av alla är förstås Cape Agulhas, ca tjugo mil längre österut.) Havet utanför var fullt av fågel – mest *swift terns* och *cape gannets* och en hel del *parasitic*

*jaegers*, men en *giant petrel* kom också dragande förbi på hyfsat håll.

Vid middagen drog Teet iväg för att ringa till Trevor Hardaker från Zest for Birds, som nästa dag skulle ordna så att vi kom ut på oceanen. Han kom dock tillbaka med ”skitdåliga” nyheter – båtturen var inställd på grund av för hård blåst. Detta förstod vi inte alls – vinden var högst måttlig vid stränderna och följande våra guider sagt att turerna inte brukade ställas in förrän vid ca 20 sekundmeter. Men enligt Teet skulle det råda helt andra vädersystem ute dit vi skulle och det var bara att acceptera faktum och hoppas på bättre tur någon av de följande dagarna, då vi dock skulle bli tvungna att rätt så rejält ändra i programmet om båtfärden skulle bli av.

**16/11.** Nu begav vi oss ut på en fyra dagars rundtur i sydvästra Cap-provinsen. Vi startade mot öster för att börja med att leta efter *cape rock-jumper* – ett måste eftersom arten inte bara är endemisk utan också mycket vacker och särpräglad. Klippterrängen runt Sir Lowry’s Pass, några mil öster om Cape Town, är en säker lokal och här hittade vi först en subadult och sedan en adult hanne efter en stunds letande. Här upptäcktes också bl a några *grey-winged francolins*, en *common quail* samt två *long-billed pipits*.

Vägen vidare österut gick genom ett böljande och storslaget jordbrukslandskap där vetet just hade bärgats. Karaktärsarter var *pied starlings* samt *steppe buzzards* på stolparna och *blue cranes* ute på stubbåkrarna eller vid vattenhålen – det förvånade oss storligen hur allmänna de sistnämnda var. Vid Swellendam svängde vi söderut för att på långa och dammiga grusvägar ta oss ned mot de Hoop nature reserve. Vid det första stoppet hittade vi två nya lärkor – *large-billed lark* respektive *Agulhas long-billed lark* och en bit längre bort också en tredje ny lärka – *Agulhas clapper lark*. Sedan kryssades också *pearl-breasted* och *black saw-wing swallow* samt *horus swift* innan vi på en manuellt dragen linfärja korsade Breede river. Vi började nu spana efter dagens målart nummer ett – den jättelika *cape vulture*, men de första stora rovfåglarna vi hittade var faktiskt två *Verreaux’s eagles*. Strax därefter såg vi dock flera *cape vultures*, i närheten av sin sista häckplats i Kap, samt kryssade en annan efterlängtd art – en *black harrier*, utsökt elegant i svart och vitt. Båda dessa arter såg vi mycket fint. En tur i och kring en eucalyptusskog gav bl a *african hoopoe*, *lesser honey-guide*, *bar-throated apalis* och *sweet waxbill*.

På tillbakavägen spanade vi av de stora norra slätterna i de Hoop-reservatet som var fyllda av stora däggdjur, främst *bonteboks* och *eland-antiloper*. Bland dessa uppletades också resans första och enda *Stanley’s bustards*. Innan det blev mörkt hann vi också med ännu en ny trappart – några *karoo korhaans*.

På kvällen åt vi på en restaurang i Swellendam resans kanske allra bästa middag – åtminstone för dem som tog en rätt bestående av tre väl tillagade filéer av springbok, större kudu och struts. Maten kostade visst hela 90 kr.....

**17/11.** Till frukosten blev det bl a champagne till följd av att Kurt fyllde 65 år. Sedan drog vi till Grootvadersbosch – Farfars-skogen – några mil öster om Swellendam. Skogen ligger i en dal invid ett höglänt vildmarksområde och är en rest av en tidigare mycket mer omfattande lövskog. Här fick vi en del nya arter – *red-chested cuckoo*, *olive woodpecker*, *grey cuckoo-shrike*, *Victorin's warbler*, *yellow-throated woodland warbler*, *blue-mantled crested flycatcher* och *greater double-collared sunbird*. Några fina rovfåglar seglade också upp över skogen frampå förmiddagen – tre *forest buzzards* samt ett exemplar av vardera *african harrier hawk* och *martial eagle*.

På eftermiddagen besökte vi Bontebok National Park som ligger i en grund gryta omgiven av jordbruksmark. Parken instiftades framför allt för att bevara den utrotningshotade antilopen *bontebok* och sådana, liksom även *röd koantilop* och *bergszebra*, fanns här i rejäla antal. Tre nya fågelarter noterades – *cloud cisticola*, *brimstone canary* och *streaky-headed seed-eater*. En juv *african fish eagle*, tre *black harriers*, två *common quails* samt två *agulhas clapper larks* sågs också.

Resten av dagen ägnades åt transport till nästa övernattningsställe, staden Ceres, ca 20 mil åt nordväst. I reningsdammarna utanför Swellendam sågs ett tiotal av vardera *hottentot teal* och *cape shoveler* samt ett halvdussin *black-winged stilts*.

**18/11.** Dagens huvudmål var karoo-landskapet som börjar några mil norr om Ceres. Vid passet Karooport tittade vi på *namaqua warbler* samt *verreaux's* och *booted eagle*. Berndt såg också några *black-headed canarys* här. Uppe i karoon blev vi, liksom tydligast hittills i Grootvadersbosch, påmind om att säsongen var ganska långt framskriden – det kändes ungefär som i början av juli hemma. Få fåglar sjöng och de eftersökta endemerna satt hårt inne. Efter mycket jobb letade vi dock fram såväl *lark*, som *chat* och *eremomela* med prefixet ”*karoo*”. ( *Karoo lark* var föresans sjuttonde lärkart... ). Vid kopjen ( litet runt berg ) Eierkop flög åtskilliga eleganta gnistrande gröna *malachite sunbirds* omkring och bråkade med varandra – de var något av en karaktärsart i sluttningar med lite buskar i området. Vid Katbakkies letades det förgäves efter cinnamon-breasted warbler – trots att halva gruppen var uppe och klättrade i branterna i flera timmar stod denna art bara inte att finna. Bland träden nere i dalsänkan kryssades däremot *fairly flycatcher* och *layard's tit babbler*.

Efter Katbakkies fortsatte vi på grusvägen mot väster. Vid en damm fanns en hel del vattenfågel – *great crested grebes*, *reed cormorants*, *black-headed heron*, *yellow-billed ducks* och *spur-winged geese* – men i övrigt var resan skäligen fågeltom. Tyvärr körde vi sedan också fel väg mot norr, en usel kostig på säkert tio mil genom Cederberg. En del ansåg att utsikten var värd felkörningen, men personligen tyckte jag inte att bergslandskapet var särskilt märkligt på något sätt – har sett mycket vackrare och mer dramatiska sådana i t ex Nordamerika, Turkiet och på Korsika. Sent omsider, i svart mörker, kom vi så småningom fram till Lambert's Bay där en utsökt och som vanligt prisbillig middag på en fiskrestaurang utgjorde plåster på såren.



19/11. På morgonen besökte vi Bird Island, alldeles utanför hamnen i Lambert's Bay. Det gick en pir ut till ön, men den fick vi inte ta "eftersom en grävskopa skulle arbeta där". Vi fick istället vänta en dryg timme på att färjas över ca 100 meter med båt ! Den lilla platta ön är mest känd för sin stora koloni av *cape gannets* som vi nu fick vårt lystmäte av på nära håll. Här häckade också ett stort antal *cape cormorants* och någon räknade till 66 *african penguins* i en koloni. *Pälssälar* fanns också i massor. I hamnen syntes en *crowned cormorant* samt tre *grey-headed*

*gulls* bland alla *Hartlaub's*. Och inte hade grävskoporna börjat jobba när vi åter kom iland.....



På återvägen mot Cape Town började vi med att besöka Kransvlei Poort, den lokal för *protea seed-eater* – en ganska fåtalig superendem – som vi missat på g a felkörningen kvällen innan. Fåglarna fanns i en trång dal där det redan på morgonen var olidligt hett. De hittades lätt i flera exemplar. Här fanns också bl a den snarlika *streaky-headed seed-eater*, ett par *southern boubous* samt gott om *malachite sunbirds* och *yellow bishops*. Några *klippspringare* klättrade upp för en vådlig brant och två *verreaux's eagles* drog längs en bergssida.

Längs vägen söderut sågs två *booted eagles* samt en hel del *steppe buzzards*. Vi handlade och åt lunch samt skådade en stund vid Berg River. Här fanns tusentals *greater flamingos*, vidare bl a också både *lanner* och *peregrine falcon* samt *little* och *caspian tern*.

Dagens skådande avslutades i West Coast National Park som domineras av en djup havsvik – Langebaan lagoon – kantad av leriga tidvattenstränder. I omgivningarna kryssade vi äntligen *southern black koorhan* som blev resans åttonde och sista trapp-art. Här såg vi också *ostrich* och minst tre *black harriers*. Huvudmålet var dock gömslet vid Geelbek varifrån vi kunde genomsöka ett fullkomligt myller av vadare på den blottlagda ebbstranden. Två rariteter här var *terek sandpiper* och *redshank* och ny för resan var också *curlew* som sågs i flera exemplar. Dominerande arter var *curlew sandpiper* och *little stint*, men det fanns också åtskilliga *greater ringed*, *white-fronted* och *grey plovers*, *ruddy turnstones*, *marsh sandpipers*, *common knots*, *sanderlings*, *bar-tailed godwits* och *whimbrels* samt en ensam *chestnut-banded plover*. Det allra roligaste som hände på platsen var emellertid att Teet efter ett telefonsamtal kunde meddela att den pelagiska båtferden från Simon's Town skulle bli av nästa dag. Jublet visste inga gränser och vi firade detta och resans avslutning lite i förväg med en ny brakmiddag på den häftiga seafood-restaurangen i Hout Bay på kvällen.

**20/11.** Idag kom vi som sagt äntligen ut på böljan varom det mer utförligt redan har berättats i ingressen till denna reseberättelse. Tilläggas kan att resans artlista på några timmar utökades med 21 arter och att 13 av dessa var livs-kryss för mig.....

På invägen kikade vi på bl a *bank cormorants* och *pälssälar* samt från sjösidan på den stora kolonien av *african penguins* som ligger alldeles intill den strandnära bebyggelsen i Boulders Beach strax söder om Simon's Town.

Sedan vi kommit iland hade vi några timmar kvar innan vi skulle vara på flygplatsen. Vi valde då att köra runt i Strandfontein sewage works, d v s det mycket stora och fågelrika systemet av avloppsdammar strax norr om sanddynerna mot False Bay. Avloppsdammar låter lite otrevligt, men området är faktiskt rätt fint och innehåller massor av vattenfågel. Hade vi besökt det första dagen hade vi rentav tyckt att det var fantastiskt. Här fanns tusentals *greater flamingos*, massor av *doppingar av alla tre aktuella arterna*, likaledes massor av *änder/gäss* av totalt sju arter, ett tiotal *white pelicans*, femton *glossy ibises*, hundratals *avocets* och *black-winged stilts* och mycket mer. Ny art blev *african sedge warbler* och den totala listan kom då slutligen att omfatta 482 arter – ett mycket gott antal om man jämför med andra resor som kört samma rutt. Det goda resultatet kan i mångt och mycket tillskrivas vår reseledare Teet samt ett antal av resenärerna som antingen var väl pålästa eller starkt på alerten eller – oftast – både och. Ett särskilt tack också till Eric Renman som var oerhört hjälpsam vid uppläggningsen av resan.

# Fåglar

## Endemer för södra Afrika står i fetstil

Listan följer ordningen enligt referensverket ”Roberts Birds of Southern Africa VII”. Fågelnamnen följer däremot boken ”Birds of Southern Africa”, 3<sup>rd</sup> edition av Sinclair/Hockey/Tarboton

Sammanlagt observerades 482 arter.

varav 156 arter enbart i Namibia

39 arter enbart i Botswana

110 arter enbart i Kap-provinsen

1. Common Ostrich *Struthio camelus*  
N: 7 Welwitschia drive, 3 Hobatere, 80 Etosha NP,  
K: Många de Hoop NR, 5 West Coast NP. Dessutom  
introducerade fåglar på flera håll.
2. **African Penguin** *Spheniscus demersus*  
K: 500 Stoney Point, 66 Lamberts Bay, 300 Pelagic trip
3. Great Crested Grebe *Podiceps cristatus*  
K:1 Blouvillei, fl. v. Katbakkies, 20 Strandfontein
4. Blacknecked Grebe *Podiceps nigricollis*  
N: 20 Bird Paradise, Walvis Bay, K: Allmän Strandfontein
5. Little Grebe *Tachybaptus ruficollis*  
N: 20 Daan Viljoen GP, 5 Bird Paradise, Walvis Bay,  
10 damm s. Kamanjab, 20 Rundu Sewage Works,  
K: 25 Blouvillei, allmän Strandfontein
6. Wandering Albatross *Diomedea exulans*  
K: 2 ex (en 4-5k, en 5-6k) Pelagic trip
7. Northern Royal Albatross *Diomedea sanfordi*  
K: 1 ad Pelagic trip
8. Shy Albatross *Thalassarche cauta*  
K: 50+ Pelagic trip
9. Blackbrowed Albatross *Thalassarche melanophris*  
K: 30+ Pelagic trip
10. Indian Yellownosed Albatross *Thalassarche carteri*  
K: 3 Pelagic trip
11. Atl Yellown. Albatross *Thalassarche chlororhynchos*  
K: 20 Pelagic trip
12. Southern Giant Petrel *Macronectes giganteus*  
K: 20 Pelagic trip
13. Northern Giant Petrel *Macronectes halli*  
K: 5 Pelagic trip
14. Pintado Petrel *Daption capense*  
K: 1-3 Pelagic trip
15. Whitechinned Petrel *Procellaria aequinoctialis*  
K: Allmän Pelagic trip
16. Spectacled petrel *Procellaria conspicillata*  
K: 1 Pelagic trip
17. Cory's Shearwater *Calonectris diomedea*  
K: 100+ Pelagic trip
18. Great Shearwater *Puffinus gravis*  
K: 100+ Pelagic trip
19. Sooty Shearwater *Puffinus griseus*  
K: 50+ Pelagic trip
20. Greatwinged Petrel *Pterodroma macroptera*  
K: 1 Pelagic trip ( JO )
21. European Storm Petrel *Hydrobates pelagicus*  
K: 10 Pelagic trip
22. Wilson's Storm Petrel *Oceanites oceanicus*  
K: 30 Pelagic trip
23. Great White Pelican *Pelicanus onocrotalus*  
N: 2 Avis Dam, 50 Walvis Bay, K: 20 Strandfontein
24. **Cape Gannet** *Morus capensis*  
K: Allmän vid kusten
25. Whitebreasted Cormorant *Phalacrocorax lucidus*  
N: 2 Avis dam, 2 Dan Viljoen GP, 25 Walvis Bay,  
K: Tämligen allmän
26. **Cape Cormorant** *Phalacrocorax capensis*  
N: Allmän Walvis Bay, K: Allmän vid kusten
27. **Bank Cormorant** *Phalacrocorax neglectus*  
K: 10 Stoney Point, 25 Pelagic trip
28. Reed Cormorant *Phalacrocorax africanus*  
N: 3 Daan Viljoen GP, 10-15 Sarasungu, 1 Rundu Sewage  
Works, B: Tämligen allmän Shakawe,  
K: Tämligen allmän Blouvillei, 5 Strandfontein
29. **Crowned Cormorant** *Phalacrocorax coronatus*  
K: 5 Stoney Point, 1 Lamberts Bay
30. African Darter *Anhinga rufa*  
N: 1 Avis Dam, 1 Dan Viljoen GP,  
B: Tämligen allmän Shakawe, K: 10 Blouvillei.
31. Grey Heron *Ardea cinerea*  
N: Enstaka, B: Tämligen allmän Shakawe, K: Enstaka
32. Blackheaded Heron *Ardea melanocephala*  
SA: 1 Jo-burg fpl, K: Enstaka
33. Goliath Heron *Ardea goliath*  
N: 1 Mahango NR, B: Ca 10 Shakawe
34. Purple Heron *Ardea purpurea*  
K: 1 Blouvillei
35. Great White Egret *Egretta alba*  
N: 1 Mahango GR
36. Little Egret *Egretta garzetta*  
N: Tämligen allmän Walvis bay, B: 7 Shakawe,  
K: enstaka
37. Black Heron E. ardesiaca/ Slaty Egret E. vinaceigula  
N: 1 Mahango GR
38. Cattle Egret *Bubulcus ibis*  
SA: 20 Jo-burg fpl, N: 20-tal Rundu Sewage Works,  
i övrigt enstaka, B: 20-tal Shakawe, K: Tämligen allmän
39. Squacco Heron *Ardeola ralloides*  
N: 3 Rundu Sewage Works, 2 Mahango GR,  
B: 25 Shakawe

40. Rufousbellied Heron *Ardeola rufiventris* N: 2 Rundu, 1 Mahango GR  
 41. Greenbacked Heron *Butorides striatus* B: 10-15 Shakawe  
 42. Blackcrowned Night Heron *Nycticorax nycticorax* N: 5 Daan Viljoen GP, 3 Mahango GR, B: 1 Shakawe, K: enstaka  
 43. Little Bittern *Ixobrychys minutus* N: 1 Sarasungu, B: 5 Shakawe, K: 3 Blouvillei  
 44. Hamerkop *Scopus umbretta* N: 2 Daan Viljoen GP, 2 Mahango GR, B: 20-25 Shakawe  
 45. Abdim's Stork *Ciconia abdimii* N: 1 Rundu Sewage Works  
 46. Woollynecked Stork *Ciconia episcopus* N: 1 Mahango GR, B: 15 Shakawe  
 47. African Openbill *Anastomus lamelligerus* B: 120 Shakawe  
 48. Saddlebilled Stork *Ephippiorhynchus senegalensis* N: 1 Mahango GR  
 49. Marabou Stork *Leptoptilos crumeniferus* N: 20 Mahango GR, B: 1 Shakawe  
 50. Yellowbilled Stork *Mycteria ibis* N: 10 Mahango GR, B: 13 Shakawe  
 51. Sacred Ibis *Threskiornis aethiopicus* SA: 20 Jo-burg fpl, N: 1 Mahango GR, K: Allmän  
 52. Glossy Ibis *Plegadis falcinellus* K: 2 Blouvillei, 20 Cape Peninsula, 15 Strandfontein  
 53. Hadedda Ibis *Bostrychia hagedash* SA: 1 Jo-burg fpl, B: 2 Shakawe, K: Allmän  
 54. Greater Flamingo *Phoenicopterus ruber* N: Allmän Walvis Bay, K: Allmän Strandfontein  
 55. Lesser Flamingo *Phoenicopterus minor* N: Allmän Walvis bay  
 56. Whitefaced Duck *Dendrocygna viduata* N: 10 Mahango GR, B: 100 Shakawe  
 57. Whitebacked Duck *Thalassornis leucotis* K: 4 + pull Blouvillei  
 58. Egyptian Goose *Alopochen aegyptiacus* N, K: Tämligen allmän  
 59. **South African Shelduck *Tadorna cana*** N: 1 Bird Paradise, Walvis Bay, 2ad +7 juv damm s. Kamanjab, 3 Etosha NP, K: 10-15 Strandfontein  
 60. Yellowbilled Duck *Anas undulata* K: Totalt 15-20  
 61. Cape Teal *Anas capensis* N: 100 Bird Paradise, Walvis Bay, K: allmän Strandfontein  
 62. Hottentot Teal *Anas hottentota* N: 9 Bird Paradise, Walvis Bay, K: 10 Swellendam  
 63. Redbilled Teal *Anas erythrorhyncha* N: 15 Daan Viljoen GP, 10 Etosha NP, K: 10 Strandfontein  
 64. **Cape Shoveler *Anas smithii*** N: 20 Bird Paradise, Walvis Bay, K: 5 Blouvillei, 10 Swellendam, 100 Strandfontein  
 65. Southern Pochard *Netta erythrophthalma* N: 3 Bird Paradise, Walvis Bay, 2 Rundu Sewage Works, K: 2 Strandfontein  
 66. Comb Duck *Sarkidiornis melanotos* N: 1 hane Rundu Sewage Works  
 67. Spurwinged Goose *Plectropterus gambensis* N: 1 Sarasungu, 20 Mahango GR, B: 5 Shakawe, K: totalt 85  
 68. Maccoa Duck *Oxyura maccoa* N: 10 Bird Paradise, Walvis Bay, K: 50 Strandfontein  
 69. Secretarybird *Sagittarius serpentarius* N: 4 n Okakuejo, Etosha NP  
 70. **Cape Vulture *Gyps coprotheres*** K: 5-6 Potberg, nära de Hoop NR  
 71. Whitebacked Vulture *Gyps africanus* N: 2 Windhoek fpl, allmän Hobatere, Etosha NP och Mahango GR, B: 10 Shakawe  
 72. Lappetfaced Vulture *Torgos tracheliotus* N: 1 Hobatere, 30 Etosha NP, 5 Mahango GR, B: 2 Shakawe  
 73. Whiteheaded Vulture *Trionocephus occipitalis* N: 1-2 Etosha NP  
 74. Black Kite *Milvus migrans* N: Enstaka  
 75. Yellowbilled Kite *Milvus aegypticus* N: Allmän, K: Allmän  
 76. Blackshouldered Kite *Elanus caeruleus* N: 1 Walvis Bay, B: 5 Shakawe, K: totalt 10-15  
 77. Bat Hawk *Macheiramphus alcinus* B: 1 Shakawe  
 78. European Honey Buzzard *Pernis apivorus* B: 1 Shakawe  
 79. Verreaux's Eagle *Aquila verreauxii* N: 2 Spitzkoppe, K: 2 Rooi Els, 2 n. de Hoop NR, 1 n. Ceres, 2 Kransvlei Poort B: 1 Shakawe  
 80. Steppe Eagle *Aquila nipalensis* N: 1 Etosha NP, 1 Mahango GR  
 81. Wahlberg's Eagle *Aquila wahlbergi* N: 1 Spitzkoppe, 3 Hobatere, 2 Rundu Sewage Works, K: några n Cape Town  
 82. Booted Eagle *Hieraaetus pennatus* N: 2 par mellan Uis och Kamanjab, 1 par s. Hobetere, 1-2 par Etosha NP  
 83. African Hawk Eagle *Hieraaetus fasciatus* N: 1 Popa Falls, B: 1 Shakawe, K: 1 Grootvadersbosch  
 84. Martial Eagle *Polemaetus bellicosus* N: Totalt ca 10  
 85. Blackchested Snake Eagle *Circaetus pectoralis* N: Totalt 7  
 86. Brown Snake Eagle *Circaetus cinereus* N: Totalt ca 15, varv ca 10 i Mahango GR, B: 3 Shakawe  
 87. Bateleur *Terathopius ecaudatus* N: 1 Avis Dam, tämligen allmän Mahango GR, B: tämligen allmän Shakawe  
 88. African Fish Eagle *Haliaeetus vocifer* N: 3 kring Rundu, K: allmän  
 89. Steppe Buzzard *Buteo vulpinus* K: 3 Grootvadersbosch  
 90. Forest Buzzard *Buteo trizonatus* K: 1+1 ö. Cape Town  
 91. **Jackal Buzzard *Buteo rufofuscus*** N: Spitzkoppe 3, 1 Hobatere, 1 s. Hobatere  
 92. Augur Buzzard *Buteo augur* B: 2 Shakawe  
 93. Shikra *Accipiter badius*



94. African Goshawk *Accipiter tachiro* **B:** 1 juv Shakawe, **K:** 1 Kirstenbosch  
95. Gabar Goshawk *Melierax gabar* **N:** 1 Hobatere, 1 Etosha NP, 1 Shakawe  
96. **Southern Pale Chanting Goshawk** *Melierax canorus* **N:** Allmän i de torrare delarna av landet - över 80 sedda, **K:** 4 n. Karooport  
97. Dark Chanting Goshawk *Melierax metabates* **N:** 1 ö. Rundu  
98. Eurasian Marsh Harrier *Circus aeruginosus* **N:** 1 Rundu Sewage Works  
99. African Marsh Harrier *Circus rani vorus* **N:** 5 Mahango GR , **B:** 3 Shakawe, **K:** 2 West Coast NP, 1 Strandfontein  
100. Pallid Harrier *Circus macrourus* **N:** 1 hanne, Andoni Plains, Etosha NP  
101. **Black Harrier** *Circus maurus* **K:** 1 de Hoop NR, 3 Bontebok NP, 3 West Coast NP  
102. African Harrierhawk *Polyboroides typus* **N:** 1 Mahango GR, **B:** 1 Shakawe, **K:** 1 Grootvadersbosch  
103. Osprey *Pandion haliaetus* **N:** 1 Avis Dam  
104. Peregrine Falcon *Falco peregrinus minor* **N:** 1 Etosha NP, 1 Popa Falls, **K:** 1 Berg River  
105. Lanner Falcon *Falco biarmicus* **N:** 1 Hobatere, 1+1 Etosha NP, 1 Rundu Sewage Works, **K:** 1 Berg River  
106. Eurasian Hobby *Falco subbuteo* **N:** 1 Mahango GR  
107. African Hobby Falcon *Falco cuvierii* **B:** 1 Shakawe  
108. Rednecked Falcon *Falco chicquera* **N:** 1 Namutoni, Etosha NP  
109. Rock Kestrel *Falco rupicolis* **N:** Tämligen allmän söder om Etosha NP.  
110. Greater Kestrel *Falco rupicoloides* **N:** ca 10 Etosha NP  
111. Lesser Kestrel *Falco naumanni* **N:** 1 Avis Dam  
112. Dickinson's Kestrel *Falco dickinsoni* **N:** 1 Shakawe  
113. Pygmy Falcon *Polihierax semitorquatus* **N:** 1 s. Hobatere  
114. Crested Francolin *Peliperdix sephaena* **N:** hörd s. Rundu  
115. **Redbilled Francolin** *Pternistes adspersus* **N:** Tämligen allmän  
116. **Cape Francolin** *Pternistes capensis* **K:** Tämligen allmän  
117. **Hartlaub's Francolin** *Pternistes hartlaubi* **N:** 2 Hobatere  
118. Greywing Francolin *Scleroptina africanus* **K:** 2 Sir Lowry's Pass  
119. Common Quail *Coturnix coturnix* **K:** 1 Sir Lowry's Pass, 1 Bontebok NP  
120. Helmeted Guineafowl *Numida meleagris* **N:** Allmän, **K:** Allmän  
121. Small Buttonquail *Turnix sylvatica* **N:** 1 Karibib Airstrip  
122. Wattled Crane *Grus carunculata* **N:** 3 Mahango GR  
123. **Blue Crane** *Anthropoides paradisea* **N:** 18 Andoni Plains, Etosha NP, **K:** Allmän ö. Cape Town  
124. African Rail *Rallus caerulescens* **N:** 1 hörd Rundu Sewage Works  
125. Black Crake *Amaurornis flavirostris* **N:** 2 Etosha NP, 2 Sarasungu, **B:** 6 Shakawe  
126. Buffspotted Flufftail *Sarothrura elegans* **K:** 1 hörd Klaasenberg trail, Cape Town  
127. African Purple Swamphen *Porphyrio madagacariensis* **N:** 5 Rundu Sewage Works , **B:** 1 Shakawe  
128. Common Moorhen *Gallinula chloropus* **N:** Tämligen allmän, **K:** 2 Blouvillei, 10 Strandfontein  
129. Redknobbed Coot *Fulica cristata* **N:** 3 Daan Viljoen GP, 5 Bird Paradise, Walvis Bay, 10 Rundu Sewage Works, **K:** allmän Blouvillei  
130. Kori Bustard *Ardeotis kori* **N:** 12 Etosha NP, i huvudsak n. Okakuejo  
131. Stanley's Bustard *Neotis denhami* **K:** 1 de Hoop NR  
132. **Ludwig's Bustard** *Neotis ludwigii* **N:** 1 n. Okakuejo, Etosha NP  
133. **Karoo Korhaan** *Eupodotis vigorsii* **K:** 3+2 s. Swellendam  
134. **Rueppell's Korhaan** *Eupodotis rueppellii* **N:** Totalt ca 25 i centrala Namibia  
135. **Redcrested Korhaan** *Eupodotis ruficrista* **N:** 2 Hobatere, 3+1 Etosha NP  
136. **Southern Black Korhaan** *Eupodotis afra* **K:** 5 West Coast NP  
137. **Northern Black Korhaan** *Eupodotis afraoides* **N:** Ca 40 Etosha NP  
138. African Jacana *Actophilornis africanus* **N:** 2 Sarasungu, ca 40 Rundu Sewage Works, ca 10 Mahango GR, **B:** Ca 10 Shakawe  
139. Lesser Jacana *Microparra capensis* **N:** 1 Sarasungu , 2 Rundu Sewage Works  
140. **African Black Oystercatcher** *Haematopus moquini* **N:** 1 Guano-plattformen, Walvis bay, **K:** 9 Stoney Point, 18 Cape Peninsula, 2 Simon's Town  
141. Common Ringed Plover *Charadrius hiaticula* **N:** 25 Walvis Bay, **K:** 10 West Coast NP  
142. Whitefronted Plover *Charadrius marginatus* **N:** 20 Walvis bay, **K:** 4 Cape Peninsula, 10 West Coast NP  
143. Chestnutbanded Plover *Charadrius pallidus* **N:** 100+ Walvis bay, **K:** 1 West Coast NP  
144. Kittlitz's Plover *Charadrius pecuarius* **N:** 2-3 Avis dam, 1+ 1pull Walvis bay, 2 Etosha NP, 1 Rundu Sewage Works, **B:** 2+1 Shakawe, **K:** 1 Blouvillei, 2 Lambert's Bay, några Berg River  
145. Threebanded Plover *Charadrius tricollaris* **N:** Tämligen allmän, **B:** 2 Shakawe  
146. Grey Plover *Pluvialis squatarola* **N:** 50+ Walvis Bay, **K:** 25 West Coast NP  
147. Crowned Plover *Vanellus coronatus* **N:** 2 Daan Viloen GP, tämligen allmän Hobatere och Etosha NP, **K:** allmän de Hoop NR, i övrigt enstaka  
148. Blacksmith Plover *Vanellus armatus* **N:** 12 Daan Viljoen GP, allmän från Etosha och nordostut, **B:** allmän Shakawe, **K:** tämligen allmän

149. African Wattled Plover *Vanellus senegallus*  
150. Longtoed Plover *Vanellus crassirostris*  
151. Turnstone *Arenaria interpres*  
152. Terek Sandpiper *Xenus cinereus*  
153. Common Sandpiper *Tringa hypoleucos*  
154. Wood Sandpiper *Tringa glareola*  
155. Redshank *Tringa totanus*  
156. Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis*  
157. Greenshank *Tringa nebularia*  
158. Knot *Calidris canatus*  
159. Curlew Sandpiper *Calidris ferruginea*  
160. Little Stint *Calidris minuta*  
161. Sanderling *Calidris alba*  
162. Ruff *Philomachus pugnax*  
163. African Snipe *Gallinago nigripennis*  
164. Bartailed Godwit *Limosa lapponica*  
165. Eurasian Curlew *Numenius arquata*  
166. Common Whimbrel *Numenius phaeopus*  
167. Pied Avocet *Recurvirostra avosetta*  
168. Blackwinged Stilt *Himantopus himantopus*  
169. Spotted Thickknee *Burhinus capensis*  
170. Water Thickknee *Burhinus vermiculatus*  
171. **Burchell's Courser** *Cursorius rufus*  
172. Doublebanded Courser *Rhinoptilus africanus*  
173. Redwinged Pratincole *Glareola pratincola*  
174. Rock Pratincole *Glareola nuchalis*  
175. Parasitic Jaeger *Stercorarius parasiticus*  
176. Pomarine Jaeger *Stercorarius pomarinus*  
177. Subantarctic Skua *Catharacta antarctica*  
178. Cape Gull *Larus dominicanus*  
179. Greyheaded Gull *Larus cirrocephalus*  
180. **Hartlaub's Gull** *Larus hartlaubi*  
181. Sabine's Gull *Larus sabini*  
182. Caspian Tern *Sterna caspia*  
183. Swift Tern *Sterna bergii*  
184. Sandwich Tern *Sterna sandvicensis*  
185. Common Tern *Sterna hirundo*  
186. Arctic Tern *Sterna paradisaea*  
187. Little Tern *Sterna albifrons*  
188. **Damara Tern** *Sterna balaenarum*  
189. Whiskered Tern *Chlidonias hybridus*  
190. Whitewinged Tern *Chlidonias leucopterus*  
191. African Skimmer *Rynchops flavirostris*  
192. **Namaqua Sandgrouse** *Pterocles namaqua*  
193. **Doublebanded Sandgrouse** *Pterocles bicinctus*  
194. Rock Dove *Columba livia*  
195. Speckled Pigeon *Columba guinea*  
196. African Olive Pigeon *Columba arquatrix*  
197. Redeyed Dove *Streptopelia semitorquata*  
198. African Mourning Dove *Streptopelia decipiens*  
199. Cape Turtle Dove *Streptopelia capicola*  
200. Laughing Dove *Streptopelia senegalensis*
- B:** 2-3 Shakawe  
**N:** 2 Mahango GR  
**N:** 50+ Guano-plattformen, Walvis Bay,  
**K:** 15 West Coast NP  
**K:** 1 West Coast NP  
**N, B:** Tämligen allmän  
**N:** 5-6 Avis dam, ca 10 Etosha NP, ca 20 Rundu Sewage Works  
**K:** 1 West Coast NP  
**N:** 1 Avis dam, 10 Walvis bay, 1 Etosha NP, 1 Rundu Sewage Works, **K:** 10 West Coast NP  
**N:** 1 Daan Viljoen GR, 5 Walvis Bay, 2 Etosha NP, 5 Rundu Sewage Works, **B:** 10-15 Shakawe,  
**K:** Flera Berg River  
**N:** 1 Guano platform, Walvis Bay, **K:** 20 West Coast NP  
**N:** Allmän Walvis Bay, **K:** Allmän West Coast NP  
**N:** 10-15 Avis Dam, allmän Walvis Bay, 4 Etosha NP, 5 Rundu Sewage Works, **K:** Tämligen allmän West Coast NP  
**N:** Allmän Walvis bay, **K:** 30 West Coast NP  
**N:** Tämligen allmän, **B:** Tämligen allmän Shakawe,  
**K:** 20 West Coast NP  
**N:** 3 Rundu Sewage Works, **K:** 1 Blouvillei  
**N:** 5 Walvis Bay, **K:** 10 West Coast NP  
**K:** 5 West Coast NP  
**N:** 10 Walvis bay, **K:** 15 West Coast NP  
**N:** 50+ Walvis Bay, **K:** 20 Cape Peninsula, 100+ Strandfontein  
**N, B:** Enstaka, **K:** fl 100 Strandfontein, i övrigt tämligen allmän på lämpliga lokaler  
**N:** Ca 10 Etosha NP  
**N:** 1-2 Mahango GR, **B:** 5 Shakawe  
**N:** 5 flygande norr om Trekkoppie  
**N:** Totalt 8 Etosha NP  
**N:** 10 Mahango GR, **B:** 30-50 Shakawe  
**N:** 1 Sarasungu, 1 Popa Falls, **B:** 1 Shakawe  
**K:** Tämligen allmän utanför kusten  
**K:** 2-5 Pelagic trip  
**K:** 2-3 Pelagic trip  
**N, K:** Allmän vid kusterna  
**SA:** 35 Jo-burg fpl, **K:** 3 Lamberts Bay  
**N; K:** Allmän vid kusterna  
**K:** 50+ Pelagic trip  
**N:** 50 Walvis bay, **K:** 4-5 Berg River  
**N:** 20 Walvis Bay, **K:** Allmän vid kusterna  
**N:** 20 Walvis Bay, **K:** Tämligen allmän vid kusterna  
**N:** Allmän Walvis Bay, **K:** 2 Cape Peninsula, Allmän Pelagic trip  
**K:** 1 Pelagic trip  
**K:** 5 Berg River  
**N:** 30 Walvis Bay  
**B:** 1 Shakawe  
**N:** 1 Avis Dam, 50+ Sarasungu, 20 Rundu Sewage Works, **B:** 15 Shakawe, **K:** 8 Strandfontein  
**N:** 50 Mahango GR, **B:** 50 Shakawe  
**N:** Allmän i mellersta, västra delarna, upp t om västra Etosha, bl a 10 000+ (!) vid liten damm norr om Uis  
**N:** Allmän i Hobatere och Etosha NP, 2 Mahango GR  
**N, K:** Tämligen allmän i anslutning till bebyggelse  
**N:** 10 Daan Viljoen GP, 20+ Hobatere,  
**K:** tämligen allmän  
**K:** 2 Kirstenbosch, 10 Grootvaderbosch  
**N:** Allmän från Rundu och österut i Caprivi Strip,  
**B:** Allmän Shakawe, **K:** Tämligen allmän  
**B:** Tämligen allmän Shakawe  
**N, B:** Allmän, **K:** Tämligen allmän.  
**N, B:** Allmän, **K:** Tämligen allmän

201. Namaqua Dove *Oena capensis*  
 202. Emeraldspotted Wood Dove *Turtur chalcospilos*
203. African Green Pigeon *Treron calva*  
 204. Meyer's Parrot *Poicephalus meyeri*  
 205. **Rüppell's Parrot** *Poicephalus rueppellii*  
 206. **Rosy-faced Lovebird** *Agapornis roseicollis*  
 207. Grey Go-away-bird *Corythaixoides concolor*  
 208. African Cuckoo *Cuculus gularis*  
 209. Red-chested Cuckoo *Cuculus solitarius*  
 210. Black Cuckoo *Cuculus clamosus*  
 211. Levaillant's Cuckoo *Clamator levaillantii*  
 212. Klaas's Cuckoo *Chrysococcyx klaas*
213. Diderick Cuckoo *Chrysococcyx caprius*  
 214. Copper-tailed Coucal *Centropus cupreicaudus*  
 215. Senegal Coucal *Centropus senegalensis*  
 216. White-browed Coucal *Centropus superciliosus*  
 217. Barn Owl *Tyto alba*  
 218. African Wood Owl *Strix woodfordii*  
 219. African Scops Owl *Otus senegalensis*  
 220. Southern White-faced Scops Owl *Ptilopus granti*  
 221. Pearl-spotted Owllet *Glaucidium perlatum*  
 222. Spotted Eagle Owl *Bubo africanus*  
 223. Verreaux's Eagle Owl *Bubo lacteus*  
 224. Pel's Fishing Owl *Scotopelia peli*  
 225. Freckled Nightjar *Caprimulgus tristigma*  
 226. Fiery-necked Nightjar *Caprimulgus pectoralis*  
 227. Rufous-cheeked Nightjar *Caprimulgus rufigena*
228. Common Swift *Apus apus*  
 229. African Black Swift *Apus barbatus*  
 230. **Bradfield's Swift** *Apus bradfieldi*  
 231. Whiterumped Swift *Apus caffer*
232. Horus Swift *Apus horus*  
 233. Little Swift *Apus affinis*  
 234. Alpine Swift *Apus melba*
235. African Palm Swift *Cypsiurus parvus*  
 236. Speckled Mousebird *Colius striatus*  
 237. **White-backed Mousebird** *Colius colius*  
 238. Red-faced Mousebird *Colius indicus*
239. Pied Kingfisher *Ceryle rudis*
240. Giant Kingfisher *Ceryle maxima*  
 241. Malachite Kingfisher *Alcedo cristata*  
 242. Woodland Kingfisher *Halcyon senegalensis*  
 243. Striped Kingfisher *Halcyon chelicuti*  
 244. European Bee-eater *Merops apiaster*
245. Olive Bee-eater *Merops superciliosus*  
 246. Blue-cheeked Bee-eater *Merops persicus*
247. Southern Carmine Bee-eater *Merops nubicoides*  
 248. White-fronted Bee-eater *Merops bullockoides*  
 249. Little Bee-eater *Merops pusillus*
250. Swallow-tailed Bee-eater *Merops hirundineus*  
 251. Lilac-breasted Roller *Coracias caudata*  
 252. Purple Roller *Coracias naevia*  
 253. Broad-billed Roller *Eurystomus glaucurus*  
 254. African Hoopoe *Upupa africana*  
 255. Green Woodhoopoe *Phoeniculus purpureus*  
 256. **Violet Woodhoopoe** *Phoeniculus damarensis*  
 257. Common Scimitarbill *Rhinopomastus cyanomelas*
- N, B:** Tämligen allmän, **K:** 1 n. Cape Town  
**N:** Tämligen allmän Caprivi Strip,  
**B:** Tämligen allmän Shakawe  
**B:** Ca 20 Shakawe  
**N:** 8 Namutoni, Etosha NP, 2 Popa Falls, **B:** 30 Shakawe  
**N:** 2 n. Spitzkoppe, 2+2 Hobatere  
**N:** 3 Spitzkoppe, 15-20 Hobatere  
**N, B:** Tämligen allmän  
**N:** 2 Hobatere, 1 Halali, Etosha NP, **B:** 2 Shakawe  
**K:** 3 Grootvadersbosch  
**N:** 1 hörd Hobatere, 2 Popa Falls, 1 hörd Mahango GR  
**B:** 1 Shakawe  
**N:** 1 hona s. Rundu, **K:** 1 hörd Kirstenbosch,  
 1 s. Swellendam  
**N:** 1 hörd Rooibank, **K:** 1 hörd Bontebok NP  
**N:** 2 Sarasungu, 1 Mahango GR, **B:** 5 Shakawe  
**N:** 1 Rundu Sewage Works  
**B:** 1 Shakawe  
**N:** 1 hörd Namutoni, Etosha NP  
**N:** 2 Popa Falls, **B:** 2 Shakawe  
**N:** 3 Hobatere, 1 Halali, Etosha NP  
**N:** 2 + 1 hörd Halali, Etosha NP  
**N:** 2-3 Hobatere, 2 Etosha NP  
**K:** 1 ad + 2 pull nära Kirstenbosch  
**N:** 1+1 Hobatere  
**B:** 1 Shakawe  
**N:** 1 sp. Daan Viljoen GP  
**B:** 1 sp. Shakawe, **N:** 1 n. Mahango  
**N:** Allmän kring Hobare samt vattenhålen i Okakuejo,  
 Halali och Namutoni, Etosha NP  
**N:** Allmän, ställvis stora flockar i n Namibia  
**K:** Tämligen allmän  
**N:** Tämligen allmän kring Windhoek  
**N:** Tämligen allmän i mellersta Namibia,  
**K:** Flera s. Swellendam  
**K:** Ca 10 s. Swellendam  
**N:** Tämligen allmän, **K:** Tämligen allmän  
**N:** Enstaka i mellersta Namibia,  
**K:** Tämligen allmän kring Cape Town  
**N:** Tämligen allmän  
**K:** Tämligen allmän  
**N:** Tämligen allmän i mellersta Namibia  
**N:** Tämligen allmän, men mindre allmän än föregående  
 art, i mellersta Namibia  
**N:** Tämligen allmän i Caprivi Strip,  
**B:** Tämligen allmän Shakawe  
**N:** 2 Popa Falls, **B:** minst 4 Shakawe  
**B:** 10 Shakawe  
**B:** 4 Shakawe  
**N:** 1 Mahango GR  
**N:** 10 Etosha NP, 10 Mahango GR, **B:** 10 Shakawe,  
**K:** 5 Karooport  
**N:** 1 hörd Hobatere  
**N:** 15 Rundu Sewage Works, 10 Mahango GR,  
**B:** 10 Shakawe  
**N:** 10 Mahango GR, **B:** 100+ Shakawe  
**B:** 50-100 Shakawe  
**N:** 2 Sarasungu, 3 Rundu Sewage Works,  
 10 Mahango GR, **B:** 30-40 Shakawe  
**N:** Tämligen allmän i de torra delarna av Namibia  
**N:** Lokalt tämligen allmän, **B:** 2-3 Shakawe  
**N:** Lokalt tämligen allmän  
**B:** 1 Shakawe  
**N:** Tämligen allmän, **K:** 2-3 de Hoop NR  
**N:** 10 Sarasungu, 2 Mahango GR, **B:** 2-3 Shakawe  
**N:** 3 n Uis, 2 Hobatere, 5-6 Halali, Etosha NP  
**N:** 3 Dan Viljoen GP, 1 Rooibank, 2 Spitzkoppe,

258. African Grey Hornbill *Tockus nasatus*  
 259. Damara Hornbill *Tockus damarensis*  
 260. **Southern Yellowbilled Hornbill** *Tockus leucomelas*  
 261. **Bradfield's Hornbill** *Tockus bradfieldi*  
 262. **Monteiro's Hornbill** *Tockus monteiri*  
 263. Blackcollared Barbet *Lybius torquatus*  
 264. **Acacia Pied Barbet** *Tricholaema leucomelas*
265. Yellowfronted Tinkerbird *Pogoniulus chrysoconus*  
 266. Crested Barbet *Trachyphonus vaillantii*  
 267. Lesser Honeyguide *Indicator minor*  
 268. Goldtailed Woodpecker *Campethera abingoni*  
 269. Cardinal Woodpecker *Dendropicos fuscescens*
270. Olive Woodpecker *Dendropicos griseocephalus*  
 271. Bearded Woodpecker *Dendropicos namaquus*  
 272. Rufousnaped Lark *Mirafra africana*  
 273. **Agulhas Clapper Lark** *Mirafra marjoriae*  
 274. Fawncoloured Lark *Mirafra africanoides*  
 275. **Sabota Lark** *Mirafra sabota*  
 276. **Agulhas Longbilled Lark** *Mirafra curvirostris*  
 277. **Karoo Longbilled Lark** *Mirafra curvirostris*  
 278. **Benguela Longbilled Lark** *Mirafra curvirostris*  
 279. **Karoo Lark** *Certhilauda albescens*  
 280. **Dune Lark** *Certhilauda erythrochlamys*  
 281. **Spikeheeled Lark** *Chersomanes albofasciata*  
 282. Redcapped Lark *Calandrella cinerea*
283. **Pinkbilled Lark** *Spizocorys conirostris*  
 284. **Stark's Lark** *Alauda starki*  
 285. **Largebilled Lark** *Galerida magirostris*
286. **Gray's Lark** *Ammomanes grayi*  
 287. Chestnutbacked sparrowlark *Eremopterix leucotis*  
 288. **Greybacked sparrowlark** *Eremopterix verticalis*  
 289. Barn Swallow *Hirundo rustica*  
 290. Whitethroated Swallow *Hirundo albigularis*  
 291. Wiretailed Swallow *Hirundo smithii*  
 292. Pearlbreasted Swallow *Hirundo dimidiata*  
 293. Redbreasted Swallow *Hirundo semirufa*  
 294. Mosque Swallow *Hirundo senegalensis*  
 295. **Greater Striped Swallow** *Hirundo cucullata*  
 296. Lesser Striped Swallow *Hirundo abyssinica*  
 297. **South African Cliff swallow** *Hirundo spilodera*  
 298. Rock Martin *Hirundo fuligula*
299. Greyrumped Swallow *Pseudhirundo griseopyga*  
 300. Sand Martin *Riparia riparia*  
 301. Brownthroated Martin *Riparia paludicola*
302. Banded Martin *Riparia cincta*  
 303. Black Sawwing Swallow *Psalidoprocne holomelas*  
 304. Common House Martin *Delichon urbica*  
 305. Grey Cuckooshrike *Coracina caesia*  
 306. Forktailed Drongo *Dicrurus adsimilis*  
 307. Blackheaded Oriole *Oriolus larvatus*  
 308. Cape Crow *Corvus capensis*
309. Pied Crow *Corvus albus*  
 310. House Crow *Corvus splendens*  
 311. Whitenecked Raven *Corvus albicollis*  
 312. **Ashy Tit** *Parus cinerascens*  
 313. **Carp's Tit** *Parus carpi*  
 314. Rufousbellied Tit *Parus rufiventris*  
 315. Arrowmarked Babbler *Turdoides jardineii*  
 316. **Blackfaced Babbler** *Turdoides melanops*
- 1 Hobatere  
 N: Tämligen allmän, **B:** 3-4 Shakawe  
 N: 15 Hobatere  
 N: Tämligen allmän i Hobatere och Etosha NP  
**B:** 1 Shakawe  
 N: Tämligen allmän från Windhoek norrut till Hobatere  
**B:** 3-4 Shakawe  
 N: Tämligen allmän från Windhoek norrut till Etosha NP,  
**K:** 1 Bontebok NP, 1 Karoo-området  
 N: 1 Mahango GR, **B:** 1 Shakawe  
**B:** 3-4 Shakawe  
**B:** 1 Shakawe, **K:** 1 De Hoop NR  
 N: 1 Daan Viljoen GP, **B:** 3 Shakawe  
 N: 1 Daan Viljoen GP, 1 Hobatere, 1 Okakujo, Etosha NP,  
**B:** 1 Shakawe, **K:** 1 Kransvlei Poort  
**K:** 4-5 Grootvadersbosch  
 N: 2 Daan Viljoen GP  
 N: 1 Daan Viljoen GP  
**K:** 1 s. Swellendam, 3 Bontebok NP  
 N: 2 n. Mahango  
 N: 3 Daan Viljoen GP, tämligen allmän Etosha NP  
**K:** 4-5 s. Swellendam  
 N: 2 ö. Spitzkoppe  
 N: 1 Hueb River, N Uis  
**K:** 1 ö. Katbakkies  
 N: minst 1 Rooibank  
 N: Tämligen allmän i mellersta Namibia  
 N: Allmän i Etosha NP, **K:** Allmän i och kring  
 de Hoop NR och Bontebok NP  
 N: 3 norra delen av Andoni Plains, Etosha NP  
 N: Tämligen allmän i mellersta Namibia  
**K:** Tämligen allmän i och kring de Hoop NR och  
 Bontebok NP  
 N: 3 Trekkoppie  
 N: 20 Etosha NP  
 N: Tämligen allmän från Spitzkoppe till Etosha NP  
**N, B, K:** Allmän  
**SA:** 1 Jo-burg fpl, **B:** 1 Shakawe, **K:** 10 Strandfontein  
 N: 1 Avis Dam, 2 Sarasungu, **B:** 5-10 Shakawe  
**K:** Ca 30 s. Swellendam  
 N: Ca 10 Namutoni, Etosha NP  
 N: 2 Popa Falls, **B:** 4 Shakawe  
 N: Tämligen allmän kring Windhoek, **K:** Tämligen allmän  
**B:** 2 Shakawe  
 N: Ca 10 flygplatsen Windhoek  
 N: Tämligen allmän norrut till Etosha NP,  
**K:** Tämligen allmän  
**B:** 3 Shakawe  
**B:** 7 Shakawe  
 N: 2 Daan Viljoen GP, **B:** Allmän Shakawe,  
**K:** Tämligen allmän  
 N: 1 Daan Viljoen GP, ca 20 Etosha NP, **B:** Ca 20 Shakawe  
**K:** 4-5 n. De Hoop NR, 10 Grootvadersbosch  
 N: 2 Namutoni, Etosha NP  
**K:** 2 Grootvadersbosch  
 N: Allmän, **K:** Enstaka  
 N: 1 n. Mahango  
 N: Tämligen allmän Etosha NP,  
**K:** Lokalt tämligen allmän  
 N: Enstaka, **K:** Tämligen allmän  
**K:** 10 Jan Smuts Airport, Cape Town  
**K:** Lokalt tämligen allmän  
 N: 2 Daan Viljoen GP, 2 Etosha NP  
 N: 2+2 Hobatere  
 N: 2 s. Rundu  
 N: 1 Popa Falls, **B:** Allmän Shakawe  
 N: 5 Namutoni, Etosha NP

317. Hartlaub's Babbler *Turdoides leucopygius*  
318. **Southern Pied Babbler** *Turdoides bicolor*  
319. **Barecheeked Babbler** *Turdoides gymnogenys*  
320. **African Redeyed Bulbul** *Pycnonotus nigricans*  
321. Darkcapped Bulbul *Pycnonotus tricolor*  
322. Cape Bulbul *Pycnonotus capensis*  
323. Terrestrial Brownbulb *Phyllastrephus terrestris*  
324. Sombre Greenbul *Andropadus importunus*
325. Yellowbellied Greenbul *Chlorocichla flaviventris*
326. Kurrichane Thrush *Turdus libonyanus*  
327. Olive Thrush *Turdus olivaceus*  
328. Groundscraper Thrush *Psophocichla litsitsirupa*  
329. **Short-toed Rock Thrush** *Monticola breviceps*  
330. **Cape Rock Thrush** *Monticola rupestris*  
331. **Cape Rockjumper** *Chaetops frenatus*  
332. **Mountain Wheatear** *Oenanthe monticola*  
333. Capped Wheatear *Oenanthe pileata*  
334. Familiar Chat *Cercomela familiaris*
335. **Tractrac Chat** *Cercomela tractrac*  
336. **Karoo Chat** *Cercomela schlegelii*  
337. **Anteating Chat** *Myrmecocichla formicivora*  
338. African Stonechat *Saxicola torquata*  
339. Whitebrowed Robinchat *Cossypha heuglini*  
340. Cape Robinchat *Cossypha caffra*  
341. Whitebrowed Scrubrobin *Erythropgyia leucophrys*
342. **Karoo Scrubrobin** *Erythropgyia coryphaeus*  
343. **Kalahari Scrubrobin** *Erythropgyia paena*  
344. **Herero Chat** *Namibornis herero*  
345. Garden Warbler *Sylvia borin*  
346. **Chestnutvented Titbabbler** *Parisoma subcaeruleum*  
347. **Layard's Titbabbler** *Parisoma layardi*  
348. Icterine Warbler *Hippolais icterina*  
349. African Reed Warbler *Acrocephalus baeticatus*  
350. Lesser Swamp Warbler *Acrocephalus gracilirostris*
351. Greater Swamp Warbler *Acrocephalus rufescens*  
352. Little Rush Warbler *Bradypterus baboecala*  
353. Knysna Warbler *Bradypterus sylvaticus*  
354. Victorin's Warbler *Bradypterus victorini*  
355. Willow Warbler *Phylloscopus trochillus*  
356. Yellowthr. Woodland Warbler *Phylloscopus ruficapilla*  
357. Yellowbreasted Apalis *Apalis flavida*  
358. Barthroated Apalis *Apalis thoracica*  
359. Longbilled Crombec *Sylvietta rufescens*  
360. Yellowbellied Eremomela *Eremomela icteropygialis*  
361. **Karoo Eremomela** *Eremomela gregalis*  
362. Burntnecked Eremomela *Eremomela usticollis*  
363. Greybacked camaroptera *Camaroptera brevicaudata*  
364. **Rockrunner** *Achaetops pycnopygius*  
365. Grassbird *Speanoecacus afer*  
366. Zitting Cisticola *Cisticola juncidis*  
367. Cloud Cisticola *Cisticola textrix*  
368. **Greybacked Cisticola** *Cisticola subruficapilla*  
369. Desert Cisticola *Cisticola auridulus*  
370. Tinkling Cisticola *Cisticola rufilatus*  
371. Rattling Cisticola *Cisticola chinianus*  
372. Luapula Cisticola *Cisticola luapula*  
373. Chirping Cisticola *Cisticola pipiens*  
374. Neddicky *Cisticola fulvicapillus*  
375. Levillant's Cisticola *Cisticola tinniens*  
376. **Karoo Prinia** *Prinia maculosa*  
377. Tawnyflanked Prinia *Prinia subflava*  
378. **Blackchested Prinia** *Prinia flavicans*
- N: 10 Sarasungu, **B**: Tämligen allmän Shakawe  
N: 2 Dik-dik drive, Etosha NP  
N: 7 Hobatere, 3 Etosha NP  
N: Tämligen allmän, **B**: Enstaka Shakawe  
**B**: Allmän Shakawe  
**K**: Tämligen allmän  
N: 1 Popa Falls, **B**: 3 Shakawe  
**K**: Tämligen allmän Kirstenbosch, 1 de Hoop NR,  
10 Grootvadersbosch  
N: 1 Sarasungu, 3 Popa Falls,  
**B**: Tämligen allmän Shakawe  
N: 1 Sarasungu, **B**: 3 Shakawe  
**K**: 6-8 Kirstenbosch, 10 Grootvadersbosch  
N: 2 Daan Viljoen GP, 4 -5 Hobatere, 3 Etosha NP  
N: Sammanlagt 10-15 i mellersta Namibia  
**K**: Sammanlagt 3-4  
**K**: 1 ad och 1 juv hane Sir Lowry's Pass  
N: Tämligen allmän i mellersta Namibia  
N: Enstaka, **K**: Lokalt tämligen allmän  
N: Tämligen allmän i mellersta Namibia,  
**K**: Tämligen allmän  
N: Tämligen allmän i mellersta Namibia ( i öknen )  
**K**: 10 i karoon  
N: 2 Hobatere  
**B**: Enstaka Shakawe, **K**: Tämligen allmän s. Swellendam  
N: 2 Sarasungu, **B**: 4 Shakawe  
**K**: Tämligen allmän  
N: 1 Namutoni, Etosha NP, 1 s. Rundu, 1 Sarasungu,  
1 Popa Falls  
**K**: Allmän s. Swellendam  
N: 1+1 Etosha NP  
N: 2 Spitzkoppe  
**B**: 1 Shakawe  
N: Tämligen allmän i mellersta Namibia, **K**: 1 i karoon  
**K**: 1 Katbakkies  
N: 1 Namutoni, Etosha NP  
N: Enstaka, **K**: 1 Blouvlei, 1 Katbakkies  
N: 5 Rundu Sewage Works, **B**: Enstaka Shakawe,  
**K**: 4 Blouvlei, flera Strandfontein  
**B**: Enstaka Shakawe  
**K**: 5-6 hörda Strandfontein  
**K**: 2 ex Klaasenberg trail, 3 hörda Grootvadersbosch  
**K**: 1 hörd Grootvadersbosch  
N: Enstaka  
**K**: 1 par Grootvadersbosch  
N: 2 Namutoni, Etosha NP  
**K**: 1 de Hoop NR, 4 Grootvadersbosch  
N: 3 Spitzkoppe, 1 Hobatere, 1 Popa Falls, **B**: 1 Shakawe  
N: Tämligen allmän i mellersta Namibia  
**K**: 5 ö. Katbakkies  
N: 3-4 Daan Viljoen GP, 1 Etosha NP  
N: Enstaka, **B**: 6 Shakawe  
N: 2 Avis Dam, 1 Daan Viljoen GP, hörd Hobatere  
**K**: Enstaka  
N: 10 Avis Dam  
**K**: Allmän Bontebok NP  
**K**: 1 Rooi Els, 3 i karoon  
N: 3 Etosha NP  
N: 1 Popa Falls, **B**: 2 Mahango GR  
N: 1 Avis Dam, 1 Popa Falls, 2 Mahango GR  
**B**: 1 + 3 hörda Shakawe  
**B**: Allmän Shakawe  
**K**: Några nära Sir Lowry's Pass  
**K**: 4 Blouvlei  
**K**: Tämligen allmän  
**B**: Tämligen allmän Shakawe  
N: Tämligen allmän

379. Namaqua Warbler *Phragmacia substriata*  
380. Rufouseared Warbler *Malcorus pectoralis*  
381. African Dusky Flycatcher *Muscicapa adusta*  
382. Fiscal Flycatcher *Sigelus silens*  
383. Spotted Flycatcher *Muscicapa striata*
384. Ashy Flycatcher *Muscicapa caerulescens*  
385. Marico Flycatcher *Bradornis mariquensis*  
386. Chat Flycatcher *Bradornis infuscatus*  
387. Pale Flycatcher *Melaenornis pallidus*  
388. Cape Batis *Batis capensis*  
389. Chinspot Batis *Batis molitor*  
390. Pririt Batis *Batis pririt*  
391. Fairy Flycatcher *Stenostira scita*  
392. Bluemantled Cr. Flycatcher *Trochocercus cyanomelas*  
393. African Paradise Flycatcher *Terpsiphone viridis*
394. African Pied Wagtail *Motacilla aguimp*  
395. Cape Wagtail *Motacilla capensis*  
396. African Pipit *Anthus cinnamomeus*  
397. Longbilled Pipit *Anthus similis*  
398. Lesser Grey Shrike *Lanius minor*
399. Common Fiscal *Lanius collaris*  
400. Redbacked Shrike *Lanius collurio*
401. Magpie Shrike *Corvinella melanoleuca*
402. Swamp Boubou *Laniarius bicolor*
403. Southern Boubou *Laniarius ferrugineus*
404. Crimsonbreasted Shrike *Laniarius atrococcineus*  
405. Blackbacked Puffback *Dryoscopus cubla*  
406. Brubru *Nilaus afer*  
407. Browncrowned Tchagra *Tchagra australis*  
408. Blackcrowned Tchagra *Tchagra senegala*  
409. Bokmakierie *Telophorus zeylonus*  
410. Whitetailed Shrike *Lanioturdus torquatus*  
411. Whitecrested Helmetshrike *Prionops plumatus*  
412. S. Whitecrowned Shrike *Eurocephalus anguittimens*  
413. Common Starling *Sturnus vulgaris*  
414. Common Mynah *Acridotheres tristis*  
415. Pied Starling *Spreo bicolor*  
416. Wattled Starling *Creatophora cinerea*  
417. Violetbacked Starling *Cinnyricinclus leucogaster*
418. Burchell's Starling *Lamprotornis australis*  
419. Meve's Starling *Lamprotornis mevesii*
420. Cape Glossy Starling *Lamprotornis nitens*  
421. Palewinged Starling *Onychognathus nabouroup*  
422. Redwinged Starling *Onychognathus morio*  
423. Cape Sugarbird *Promerops cafer*  
424. Yellowbilled Oxpecker *Buphagus africanus*  
425. Redbilled Oxpecker *Buphagus erythrorhynchus*  
426. Malachite Sunbird *Nectarinia famosa*  
427. Marico Sunbird *Cinnyris mariquensis*  
428. Greater Doublecollared Sunbird *Cinnyris afra*  
429. South. Doublecollared Sunbird *Cinnyris chalybea*  
430. Whitebellied Sunbird *Cinnyris talatala*  
431. Dusky Sunbird *Cinnyris fusca*  
432. Scarletchested Sunbird *Chalcomitra senegalensis*  
433. Amethyst Sunbird *Chalcomitra amethystina*  
434. Collared Sunbird *Hedydipna collaris*  
435. Orangebreasted Sunbird *Anthobaphes violacea*  
436. Cape White-eye *Zosterops pallidus*
- K:** 2 Karooport  
**N:** 2 Etosha NP, **K:** 1 ö. Katbakkies  
**K:** 3 Klaassenberg Trail, 5 Grootvadersbosch  
**K:** Tämligen allmän  
**N:** 1 Daan Viljoen GP, 1 Sarasungu, 1 Popa Falls, 1 Mahango GR, **B:** 2 Shakawe  
**B:** 3 Shakawe  
**N:** Enstaka i mellersta Namibia  
**N:** Allmän, särskilt i mellersta Namibia  
**N:** 1 n. Mahango GR  
**K:** Tämligen allmän  
**N:** 3 Etosha NP, 1 par s. Rundu, **B:** 1 Shakawe  
**N:** Enstaka i mellersta Namibia  
**K:** 2 Katbakkies  
**K:** 3-4 Grootvadersbosch  
**N:** 10 Sarasungu, **B:** 5-6 Shakawe, **K:** 1 par Swelledam, 1 par Grootvadersbosch  
**B:** 2 Shakawe  
**N:** Enstaka, **B:** 2 Shakawe, **K:** Tämligen allmän  
**N:** Tämligen allmän i norra Namibia  
**N:** 1 Daan Viljoen GP, **K:** 2 Sir Lowry's Pass  
**N:** 7-8 Andoni Plains, Etosha NP, 1 Rundu Sewage Works, 3 Mahango GR  
**N:** Tämligen allmän i mellersta Namibia  
**N:** 1 Daan Viljoen GP, 2 Sarasungu, 1 Mahango GR, **B:** 1 Shakawe  
**N:** 3 Andoni Plains, Etosha NP, 4 Sarasungu, 2 Mahango GR, **B:** Enstaka Shakawe  
**N:** Flera Sarasungu, flera Popa Falls, **B:** Tämligen allmän Shakawe  
**K:** 3-4 hörda Kirstenbosch, 2 de Hoop NR, 1 par Kransvlei Poort  
**N:** Tämligen allmän i norr  
**N:** 2 Hobatere, 2 Tsumeb  
**N:** Tämligen allmän  
**N:** 1 Avis Dam, 1 Daan Viljoen GP  
**N:** 1 Okakuejo, Etosha NP, 1 s. Rundu  
**N:** 2 Spitzkoppe  
**N:** Tämligen allmän mellan Spitzkoppe och Hobatere  
**N:** Några Tsumeb ( MF )  
**N:** Totalt 8 Hobatere- västra Etosha NP  
**K:** Tämligen allmän  
**SA:** 1 par Jo-burg fpl  
**K:** Allmän i jordbruksbygd, särskilt i söder  
**N:** Allmän Sarasungu, **B:** 20 Shakawe  
**N:** 1 Tsumeb, 2 Popa Falls, 2 Mahango GR, **B:** 5-6 Shakawe  
**N:** Lokalt tämligen allmän  
**N:** Allmän Hobatere, 10 Popa falls, **B:** Tämligen allmän Shakawe  
**N:** Allmän  
**N:** Allmän i mellersta Namibia  
**K:** Allmän  
**K:** 5 Rooi Els, 4 Kirstenbosch  
**B:** 1 Shakawe  
**N:** 8-10 Popa Falls, 1 Mahango GR  
**K:** Allmän, särskilt i karoon  
**N:** 1 n Uis, 4 Namutoni, Etosha NP  
**K:** 4-5 Grootvadersbosch  
**K:** Tämligen allmän, särskilt i Kirstenbosch  
**N:** Flera Sarasungu, flera Popa Falls  
**N:** Allmän i västra Namibia  
**N:** 3 Daan Viljoen, 1 Avis Dam  
**N:** 6 Sarasungu, 1 Mahango GR  
**N:** 1 Popa Falls, **B:** 7 Shakawe  
**K:** 2 Rooi Els, 3 Kirstenbosch  
**K:** Tämligen allmän

437. African Yellow White-eye *Zosterops senegalensis* N: 1 s. Rundu, 2-3 Sarasungu, **B**: 3 Shakawe
438. Redbilled Buffalo Weaver *Bubalornis niger* N: Tämligen allmän norrut till Etosha NP
439. Whitebrowed Sparrow Weaver *Plocepasser mahali* N: Allmän, särskilt i mellersta Namibia
440. **Sociable Weaver** *Philetarius socius* N: Allmän Okakuejo, Etosha NP
441. House Sparrow *Passer domesticus* N, **K**: Tämligen allmän i anslutning till bebyggelse
442. **Great Sparrow** *Passer motitensis* N: Tämligen allmän norrut till Etosha NP
443. **Cape Sparrow** *Passer melanurus* SA: 2 Jo-burg fpl, N: Lokalt tämligen allmän norrut till Etosha NP, **K**: Lokalt tämligen allmän
444. Southern Greyheaded Sparrow *Passer diffusus* N: Lokalt tämligen allmän upp till Etosha NP
445. **Scalyfeathered Finch** *Sporopipes squamifrons* N: 1 Avis Dam, 10 n. Spitzkoppe, 10 Hobatere
446. Spectacled Weaver *Ploceus ocularis* **B**: 3 Shakawe
447. Cape Weaver *Ploceus capensis* **K**: Tämligen allmän
448. Southern Masked Weaver *Ploceus velatus* N: Tämligen allmän norrut till Hobatere, **K**: Lokalt tämligen allmän.
449. Golden Weaver *Ploceus xanthops* N: 1 Sarasungu, **B**: 10 Shakawe
450. Southern Brownthroated Weaver *Ploceus xanthopterus* N: 2 Sarasungu, **B**: Tämligen allmän Shakawe
451. Redheaded Weaver *Anaplectes rubriceps* N: 1 Sarasungu, 1 Mahango
452. Redbilled Quelea *Quelea quelea* N: Stor flock Namutoni, Etosha NP, **B**: 10 000-20 000 Shakawe
453. Southern Red Bishop *Euplectes orix* **K**: Tämligen allmän i anslutning till våtmarker
454. Fantailed Widowbird *Euplectes axillaris* **B**: 2-3 Shakawe
455. Yellow Bishop *Euplectes capensis* **K**: Tämligen allmän
456. Greenwinged Pytilia *Pytilia melba* N: 1 Daan Viljoen GP, 1 n. Uis, 1 Hobatere, **B**: 1 Shakawe
457. Redbilled Firefinch *Lagonosticta senegala* **B**: 2 Shakawe
458. Brown Firefinch *Lagonosticta nitidula* **B**: 2 Shakawe
459. Blue Waxbill *Uraeginthus angolensis* N: 1 Etosha NP, 1 Sarasungu, 2 Popa Falls, **B**: Enstaka Shakawe
460. **Violeteared Waxbill** *Uraeginthus granatinus* N: 5 Daan Viljoen, 1 n. Uis, 1 Etosha
461. Common Waxbill *Estrilda astrild* N: 1-2 Daan Viljoen, 2 Roibank, 1 Rundu Sewage Works, **K**: 10 Bontebok
462. Sweet Waxbill *Estrilda melanous* **K**: 2 de Hoop NR, 2 Grootvadersbosch
463. Blackfaced Waxbill *Estrilda erythronotus* N: 2 Daan Viljoen, 1 Popa Falls
464. **Redheaded Finch** *Amadina erythrocephala* N: 50+ n Uis, 50+ Hobatere, 100 Etosha NP
465. Pintailed Whydah *Vidua macroura* N: 10 Avis Dam, 1 Daan Viljoen GP
466. **Shafttailed Whydah** *Vidua regia* N: 1 Rundu Sewage Works, 10 Avis Dam
467. Yellowfronted Canary *Serinus mozambicus* N: 3 s. Rundu, 1 Rundu Sewage Works
468. Blackthroated Canary *Serinus atrogularis* N: 10 Daan Viljoen GP
469. Blackheaded Canary *Serinus alario* **K**: 2 Karooport (BG)
470. **Yellow Canary** *Serinus flaviventris* N: Enstaka i mellersta Namibia, **K**: Några i karoon
471. Brimstone Canary *Serinus sulphuratus* **K**: 2 Bontebok NP
472. **Whitethroated Canary** *Serinus albogularis* N: 3 Rooibank, **K**: Några i karoon
473. Cape Canary *Serinus canicollis* **K**: 5 Rooi Els, 10 Kransvlei Poort
474. **Forest Canary** *Serinus scotops* **K**: 5 Kirstenbosch, några Grootvadersbosch
475. **Protea Seedeater** *Serinus leucopterus* **K**: 10 Kransvlei Poort
476. Streakyheaded Seedeater *Serinus gularis* **K**: 1 Bontebok NP, 1 Kransvlei Poort
477. **Cape Siskin** *Pseudochloroptila totta* **K**: 4 Rooi Els,
478. Common chaffinch *Fringilla coelebs* **K**: 2 Kirsensbosch
479. Goldenbreasted Bunting *Emberiza flaviventris* N: 2 Hobatere, 2 Etosha NP
480. Cape Bunting *Emberiza capensis* **K**: 4 Rooi Els, Cape Peninsula 3
481. Cinnamonbreasted Bunting *Emberiza tahapisi* N: 10+Hobatere, 1 Etosha NP
482. **Larklike Bunting** *Emberiza impetuani* N: 20 Daan Viljoen GP, allmän Hobatere

# Däggdjur

Endemer för södra Afrika står i fetstil

Sammanlagt observerades 49 arter.

## Order Primates (Apor)

### **Chacma baboon *Papio ursinus***

Vervet monkey (Grön markatta) *Cercopithecus aethiops*

**N:** Allmän

**N:** Enstaka Mahango GR, **B:** Enstaka Shakawe

## Order Lagomorpha (Harar & kaniner)

Cape hare (Kaphare) *Lepus capensis*

Scrub hare *Lepus saxatilis*

**N:** Enstaka

**N:** Enstaka, bl a Etosha NP

## Order Rodentia (Gnagare)

### **Cape ground squirrel *Xerus inauris***

Tree (Smith's bush-) squirrel *Paraxerus cepapi*

(Eastern) grey squirrel *Sciurus carolinensis*, Nordamerika

Springhare (Springhaas) *Pedetes capensis*

Striped mouse *Rhodomys pumilio*

Tree Mouse *Thallomys paedulus*

**N:** Allmän

**B:** 10 Shakawe

**K:** Enstaka Cape Town

**N:** 4 Hobatere

**N:** 1 Spitzkoppe

**N:** 1 Okakuejo, Etosha NP

## Order Carnivora (Rovdjur)

Black-backed jackal *Canis mesomelas*

Spotted-necked otter *Lutra maculicollis*

Honey badger (Ratel) *Mellivora capensis*

### **Small grey mongoose *Galerella pulverulenta***

Slender mongoose *Galerella sanguinea*

### **Yellow mongoose *Cynictis penicillata***

Small-spotted genet *Genetta genetta*

Spotted hyaena (Fläckig hyena) *Crocuta crocuta*

African wild cat (Afrikansk vildkatta) *Felis lybica*

Lion (Lejon) *Panthera leo*

**N:** 30 Etosha NP + Enstaka

**N:** 2 Popa Falls

**N:** 1 Halali, Etosha NP

**K:** 2 SW Cape

**N:** 1 Spitzkoppe

**N:** 3 Etosha NP

**N:** 4 Hobatere

**N:** 5 Halali, 4 Namutoni, Etosha NP

**N:** 1 Hobatere, 1 Etosha NP

**N:** 15+12+2 Etosha NP

## Order Pinnipedia (Säljar) anses nu ingå inom Rovdjuren

### **Cape fur seal *Arctocephalus pusillus* (+ Australien)**

**K:** Allmän vid kusten

## Order Proboscidea (Elefanter)

(African) Elephant *Loxodonta africana*

**N:** 2+2+3+2+2+27+19+10+10= 77 Etosha NP

## Order Hyracoidea (Klippgrävlingar)

### **Cape Rock dassie *Procavia capensis***

Yellow-spotted dassie *Heterohyrax brucei*

**N:** Tämligen allmän, **K:** Tämligen allmän karoon.

**N:** Tämligen allmän Spitzkoppe

## Order Perissodactyla (Uddtåiga hovdjur)

### **Mountain zebra *Equus zebra***

Burchell's zebra (Stäppsebra) *Equus burchellii*

Black rhino (Spetsnoshörning) *Diceros bicornis*

**N:** 10 Daan Viljoen GP, tämligen allmän Hobatere

**N:** 1000 Etosha NP, 10 Mahango GR

**N:** 1+1+2+9 Etosha

## Order Artiodactyla (Partåiga hovdjur)

Warthog (Vårtsvin) *Phacochoerus aethiopicus*

Hippopotamus (Flodhäst) *Hippopotamus amphibius*

Giraffe *Giraffa camelopardalis*

(African) Buffalo *Cyncerus caffer*

Eland *Taurotragus oryx*

Greater kudu *Tragelaphus strepsiceros*

Bushbuck *Tragelaphus scriptus*

Roan antelope *Hippotragus equinus*

Gemsbok (Oryx-antilop) *Oryx gazella*

Lechwe *Kobus Leche*

Southern reedbuck *Redunca arundinum*

### **Grey rhebok *Pelea capreolus***

### **Black wildebeest *Connochaetes gnou***

Blue wildebeest (Gnu) *Connochaetes taurinus*

Red hartebeest *Alcelaphus buselaphus*

### **Bontebok/Blesbok *Damaliscus dorcas***

**N:** Lokalt allmän

**N:** 2 Mahango GR, **B:** 20 Shakawe

**N:** Flera Hobatere, 100 Etosha NP, 20 Mahango GR

**N:** 30 Mahango GR

**K:** Tämligen allmän de Hoop NR

**N:** Lokalt allmän, särskilt i Etosha NP

**B:** 2+2 Shakawe

**N:** 2+9 Mahango GR

**N:** Allmän i reservaten

**N:** 20 Mahango GR

**N:** 50 Mahango GR

**K:** 2 Bontebok NP, 4 Cederberg

**K:** Enstaka Bontebok NP

**N:** 20 Daan Viljoen, 300 Etosha NP

**N:** 10 Daan Viljoen GP, 15 Etosha NP, 20 Mahango GR

**K:** Allmän De Hoop NR och Bontebok NP



Impala *Aepyceros melampus*  
**Springbok** *Antidorcas marsupialis*  
reservaten.  
Klipspringer *Oreotragus oreotragus*  
Steenbok *Raphicerus campestris*  
Common (Bush) duiker *Sylvicapra grimmia*

Order Cetacea (Valfiskar)  
Bottlenose dolphin *Tursiops truncatus*

N: 70 Etosha NP ( svartmaskad ras ), 30 Mahango GR  
N: 30 Hobatere ,3000 Etosha NP,även sedd utanför

N: 2 Hobatere, **K**: 3 Sir Lowry's Pass, 2 Kransvlei Poort  
N: Enstaka  
N: 1 Etosha NP

N: 3 Walvis Bay

# Reptiler

Family Testudinidae (Landsköldpaddor)  
Leopard Tortois *Geochelone pardalis*

N: 2 Etosha NP

Family Viperidae (Huggormar)  
Horned Adder *Bitis Caudalis*

N: 1 nv Uis

Family Elapidae (Kobror, mambor, etc)  
Black mamba *Dendroaspis polylepis*

N: 1 Sarasungu Lodge, Rundu

Family Crocodylidae (Krokodiler)  
Nile Crocodile

**B**: Allmän Okavango-floden