



EJAL40 - SkinBooster

GENERELT:

Skinbooster er en unik fugtbehandling, der udglatter fine rynker og linjer, samtidig med at den sikrer en unik hydrering indefra, så huden fremstår frisk, glat og fornyet.

Skinbooster er en innovativ behandling, som er designet til at genoprette og bevare hudens fugtbalance. Behandlingen medfører øget hudelasticitet, hudstrukturen vil fremstå mindre grov, og den reducerer fine linjer og kan forbedre og korrigere diskrete ar som f.eks. acne ar. Behandling med en skinbooster anvendes typisk som en kur med 3-behandlinger med 2-4 ugers interval eller som enkelt behandling – alt efter behov. Det vurderes hos hver enkelt person, hvor mange behandlinger med skinbooster der er behov for. For at opnå det bedste resultat afhængigt af den enkeltes hudtilstand. For at opnå det bedste resultat, bør man i nogle tilfælde gentage behandlingen med skinbooster efter 6 måneder. En skinboosterbehandling anbefales til kunden med den modne hud, der har brug for fugt, udglatning og forbedret elasticitet. En skinbooster er en injicerbar hyaluronsyre-gelé, der forbedrer hudens glathed, fugtniveau og elasticitet. Produktet injiceres i huden med en tynd kanyle og kan anvendes i ansigt, hals og décolleté. Forbedringerne sker gradvist, dvs. resultaterne er ikke øjeblikkelige. Der kan gå op til 10 dage, før resultaterne er synlige. Behandlingen giver et forbedret fugtniveau i huden i op til 9 måneder. Det anbefales at bruge 2-3 ml skinbooster, for at opnå det bedste resultat. Der findes forskellige typer af skinbooster, hvor nogle produkter også er til den yngre kunde, der ikke har så mange rynker, men har behov for en øget fugtbalance i huden.

FØR BEHANDLINGEN:

Inden skinboosterbehandling må finde sted, skal du til en lovpligtig forundersøgelse hos en af vores kosmetiske sygeplejersker, hvor vi sammen kan planlægge dit behandlingsforløb. Det er lovpligtigt, at der skal gå mindst 48 timer fra forundersøgelse til behandling må finde sted, men du er velkommen til at booke en tid til behandlingen efter konsultationen. Ved forundersøgelsen er du meget velkommen til at have en bisidder med, så I bagefter kan tale om den information, som er givet. Du vil modtage mundtlig og skriftlig information om behandlingen og de risici for bivirkninger og komplikationer, der kan være forbundet hermed. Husk at oplyse om alle helbredsmæssige forhold ved forundersøgelsen, fx om du tager medicin, har allergi, er ryger eller har kroniske sygdomme, forkølelsessår eller om du er gravid/ammende. Der gives aldrig injektionsbehandlinger i områder med forkølelsessår, betændelse eller akne.

BEHANDLINGEN:

Til selve skinbooster behandlingen skal du afsætte omkring en halv time. Når du ankommer til din behandling, tages nogle før-billeder af det pågældende område, der skal behandles. Herefter vil området blive rengjort og sprittet af. Skinbooster-produkter injiceres i mange små overfladiske doser i det område, der skal behandles. Det behandlede område masseres let for at fordele produktet i vævet.



EJAL40 - SkinBooster

KOMPLIKATIONER:

Man kan have øget risiko for blødning (blå mærker) hvis man tager gigtmicin eller hovedpinepiller, som indeholder acetylsalicylsyre f.eks. Treo eller Magnyl. Er man i behandling med blodfortyndende medicin fx pradaxa, marevan eller lign., skal denne behandling pauseres i minimum 5-7 dage inden fillerbehandling. Det skal aftales med egen læge, om det er forsvarligt at holde pause med den blodfortyndende behandling. Hvis dette ikke er tilfældet, kan man ikke blive behandlet med skinbooster. Du må ikke være gravid eller ammende, og du skal være fyldt 18 år.

EFTER BEHANDLINGEN:

Der kan komme let rødme, hævelse, ømhed, blå mærker eller kløe i det behandlede område. Dette er helt normalt og ubehaget forsvinder oftest i løbet af få dage til en uges tid. Normalt kan du genoptage dit arbejde efter behandlingen. Vi anbefaler, at du ikke berører det behandlede område i 6 timer efter behandlingen, for at minimere risikoen for infektion. Herefter kan du lægge en let makeup.

ALMINDELIGE BIVIRKNINGER:

Let rødme, lokal smerte, hævelse, blå mærker eller kløe i det behandlede område. Disse bivirkninger forsvinder typisk inden for en uge.

MEGET SJÆLDNE BIVIRKNINGER:

- Lokal reaktion med hævelse, rødme og fasthed ved injektionsstedet. Symptomerne opstår nogle dage til uger efter indsprøjtningerne og varer i flere uger
- Betændelse eller grå misfarvning ved injektionsstedet. Det kan opstå flere uger til måneder efter indsprøjtningerne og kan vare i flere måneder
- Sår skorpedannelse der heler til en overfladisk ardannelse
- Risikoen for betændelse er ca 1:10.000. Det er vigtigt at kontakte lægen ved tegn herpå, således behandling kan igangsættes hurtigt, og risikoen for blivende ar mindskes

AKUT telefonen er altid åben og kan benyttes også uden for arbejdstid: 22314510.