

Den afgørende svampebehandling i vinterbyg ved stakkens fremkomst

De tidligste vinterbygmarker nærmer sig nu begyndende skridning/stakkens fremkomst, hvor den afgørende svampebehandling i vinterbyg mod rust og bladplet bør foretages, uanset om der tidligere i strækingsfasen er foretaget en svampebehandling eller ej. Netop ved stakkens fremkomst opnås samtidig den bedste forebyggelse af eventuelle senere angreb af ramularia. Når/hvis ramularia bliver synlig på bladene, er det for sent at gøre noget, da angreb i udbrud ikke kan bekæmpes. Risikoen for angreb af ramularia øges ved bladfugt, og hvis planterne er/har været stressede. Vinterbyggen har været udsat for stress i år – såvel tilbage i februar med den kraftige nattefrost men især med de mange kolde nætter frem til ultimo april sammenholdt med en dårlig næringsstand i flere marker på samme tidspunkt. Det er vanskeligt at forudsige, hvilke år ramularia for alvor indtræder, men forholdene har været/er der i år, og ramularia koster store udbyttetab. Uanset sort vil der altid være god betaling for en svampebekæmpelse i vinterbyg ved begyndende skridning.

Især i 6-radede sorter, herunder også hybrider, men også i kraftige 2-radede sorter **kan en svampebekæmpelse ved begyndende skridning/stakkens fremkomst kombineres med en forebyggelse af aksnedknækning med ca. 0,2-0,3 ltr./ha Cerone.**

Tabel 1. Anbefalede løsninger mod svampe (bygrust, bygbladplet og skoldplet) og forebyggelse af ramularia i vinterbyg.

Strategi	Middel	Dosis pr. ha	Bemærkninger
Vinterbyg:			
Ved stakkens fremkomst	Propulse + Comet Pro	0,5 ltr. + 0,2 ltr.	Anvendelse af SDHI-midler som Propulse i høj dosis er meget afgørende for forebyggelse af ramularia. <i>Ønskes ingen forebyggende effekt mod ramularia er 0,35 ltr./ha Propulse/Prosaro + 0,2 ltr./ha Comet Pro tilstrækkelig, og behandlingen kan - afhængig af smittetryk og evt. tidligere svampebehandling i strækingsfasen - trækkes til cirka halv gennemskridning. Behandlingen skal dog uanset hvad placeres ved stakkens fremkomst, hvis den ønskes kombineret med Cerone forebyggende mod aksnedknækning.</i>
Supplerende bekæmpelse hvis bygrust efter fuld gennemskridning	Orius Max 200 EW	0,25 ltr.	Ved et evt. højt smittetryk af bygrust er der behov for en senere supplerende bekæmpelse på akset.



Billede 1. Bygrust på de nederste blade.



Billede 2. Udbredte angreb af ramularia.



Billede 3. Bygbladplet (nettypen).