

Retningsgiverne uger for opstart og afrunding – afgørende er dog altid vejro- og vækst	Skimmel				Bladplet***								
	Basis/middel risiko (højeste dosis ved meget modtagelige sorter (bl.a. Kuras)		Høj risiko		Basis/middel risiko (>5 år mellem kartofler i sædskiftet)				Høj risiko (<5 år mellem kartofler i sædskiftet)				
	Middel	Dosering pr. ha	Middel**	Dosering pr. ha	Afmodning				Afmodning				
					før 1.10.		efter 1.10		før 1.10.		efter 1.10		
					Middel***	Dosering pr. ha	Middel***	Dosering pr. ha	Middel***	Dosering pr. ha	Middel***	Dosering pr. ha	
Uge 24 (fra ca. rækkelukning)	Revus	0,3-0,6 ltr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uge 25	Revus	0,3-0,6 ltr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uge 26	Revus	0,3-0,6 ltr.	Som stopsprøjtning tilsættes:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uge 27	Ranman Top	0,3-0,5 ltr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uge 28 (fra ca. blomstring)	Revus	0,3-0,6 ltr.	+ Proxanil	-	-	Narita	0,4 ltr.	Narita	0,4 ltr.	Narita	0,4 ltr.	Narita	0,4 ltr.
Uge 29	Ranman Top	0,3-0,5 ltr.		Med opfølgning 3 dage senere: + Cymbal 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uge 30	Banjo Forte/Shirlan U.	0,75-1,0/0,4 ltr.	0,25 kg		Propulse	0,45 ltr.	Propulse	0,45 ltr.	Propulse	0,45 ltr.	Propulse	0,45 ltr.	Propulse
Uge 31	Banjo Forte/Shirlan U.	0,75-1,0/0,4 ltr.		1 uge efter første Proxanil-behandling evt.: + Proxanil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uge 32	Banjo Forte/Shirlan U.	0,75-1,0/0,4 ltr.	2,5 ltr.		Narita	0,4 ltr.	Narita	0,4 ltr.	Narita	0,4 ltr.	Narita	0,4 ltr.	Narita
Uge 33	Revus	0,3-0,6 ltr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uge 34	Ranman Top	0,3-0,5 ltr.	2,5 ltr.	Propulse	0,45 ltr.	Propulse	0,45 ltr.	Propulse	0,45 ltr.	Propulse	0,45 ltr.	Propulse	0,45 ltr.
Uge 35	Revus	0,3-0,6 ltr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uge 36	Ranman Top	0,3-0,5 ltr.	-	-	Narita	0,4 ltr.	-	-	Narita	0,4 ltr.	-	-	-
Uge 37	Ranman Top	0,3-0,5 ltr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uge 38	Ranman Top	0,3-0,5 ltr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Anvend altid højst angivne dosis i lægge- og spisekartofler, i meget modtagelige sorter samt i "skimmelvejro". Maks. 6 beh. pr. sæson for hhv. Revus (herunder Revus Top) og Ranman Top, og min. 7 dages sprøjteinterval for det enkelte middel. Er der behov for kortere interval, skal der skiftes mellem de to midler. Maks. 4 beh. for Banjo Forte og 5 beh. for Shirlan U. For Banjo Forte og Shirlan U. gælder min. 5 dages sprøjteinterval for det enkelte middel.

**Maks. 6 beh. pr. sæson for Cymbal 45 og Proxanil og min. 7 dages sprøjteinterval for det enkelte middel. Ved behov for Proxanil, bør midlet anvendes mindst 2-3 gange i træk med 7 dages mellemrum. Effekten kan forstærkes ved behandling med Cymbal 45 indimellem Proxanil-behandlinger.

*** Maks. 3 beh. pr. sæson for Narita med 10-14 dages sprøjteinterval. Maks. 2 beh. pr. sæson for Propulse SE 250 med min. 10 dages sprøjteinterval. Maks. 0,9 ltr./ha i alt for Propulse SE 250.