

VÆKST

2021 – uge 24


Tæger og cikader i kartofler

Tæger

Det er nu markerne skal tjekkes for tæger. Tæger bekæmpes ved randsprøjtning med 0,3 kg/ha Lamdex, når de første symptomer på angreb ses. Derved undgår man kraftige angreb senere i sæsonen.

Cikader

Begyndende indflyvning af cikader blev registreret i uge 20, men optimalt bekæmpelsestidspunkt afhænger af, hvornår kartoflerne er lagt/kommet op. I løbet af uge 22 og ind i uge 23 har der været en massiv indflyvning af cikader. Skadevirkningen af de indflyvende cikader er i sig selv begrænset, men det er meget vigtigt at de bekæmpes, så opformering begrænses. Fra begyndelsen af juli ses næste generation cikader på undersiden af bladene. Cikadenymferne lever af plantesaft, som de får ved at suge på bladene. Symptomerne af sugningen ses først som en gul/brun farvning af de nedre blade. I august/september fremskyndes derved nedvisningen, så tilvæksten stopper for tidligt. **Første bekæmpelse anbefales foretaget ca. 3-4 uger efter begyndende indflyvning.**



Indflyvning af cikader



cikadenymfer



Symptomer på sugning af cikadenymfer



For tidlig nedvisning pga. cikader

Bekæmpelse af cikader

I år skal de først fremspirede kartofler (inden 1. maj) behandles mod cikader i løbet af denne uge 24 med **0,15-0,20 kg/ha Mospilan SG**. Senere fremspirede kartofler behandles i uge 25 med samme middel og dosering. Højeste dosis anvendes ved kraftige angreb og/eller i modtagelige sorter som f.eks. Saturna, Kardal og Oleva. For at sikre optimal virkning under alle forhold kan der med fordel tilsættes et additiv. Hvis der er behov, udføres yderligere en behandling ca. 4 uger senere med 0,2-0,25 kg/ha Mospilan SG for at få så lang en virkningstid som muligt. Når insekt- og skimmelsprøjtning kombineres, anbefales det at blande med Ranman Top.