

VÆKST

2022 – uge 17

Ukrudtsbekæmpelse i vedvarende græs og kløvergræs

I ældre, varige marker, hvor der afgræsses, kan der være behov for en indsats mod ukrudt. Den mest effektive pleje består i, at der tages slæt eller foretages afpudsning flere gange, så græsserne via hurtig genvækst bedre kan konkurrere mod lysesiv, mosebunke, brandbæger, tidsler, stor nælde og andre ukrudtsarter. De fleste varige græsmarker kan "rettes op" gennem intensiv pleje. Hvis afgræsning/slæt/afpudsning ikke er tilstrækkeligt, kan det være aktuelt at foretage kemisk eller mekanisk bekæmpelse.

Kemisk ukrudtsbekæmpelse i græs uden kløver – obs. kun på arealer uden miljøtilsagn

Tablet 1. Kemisk ukrudtsbekæmpelse i græs uden kløver – obs. kun på arealer uden miljøtilsagn.

Ukrudtsarter	Tidspunkt	Middel	Dosis pr. ha.	Bemærkninger
Agertidse, burrenerre, engbrandbæger, fuglegræs, hyrde taske, ranunkel, skræppe, vårbrandbæger	April-maj	Ariane FG S	2,5 – 3,0 ltr.	Ved gode temperaturforhold. Max dosis i 2. og flerårsmarker er 3,0 l/ha. Når skud af skræppe er 15-20 cm. Behandlingsfrist: 30 dage. Må kun anvendes én gang om året.
Engbrandbæger, fuglegræs, hyrde taske, kamille, mælkebøtte, ranunkel, skræppe, vårbrandbæger	April-maj	Primus XL	0,75-1,0 ltr.	Når ukrudt er i god vækst. Mod skræpper og brandbæger anvendes 1,0 l/ha Primus XL. Behandlingsfrist: 7 dage.
Fuglegræs, mælkebøtte, skræppe, stor nælde	April-maj	Tomahawk 200 EC	1,4 - 1,8 ltr.	Når skud af skræppe er 15-20 cm og ved gode temperaturforhold. Må kun anvendes én gang om året og senest 31. august. Behandlingsfrist: 7 dage.
Engbrandbæger, vårbrandbæger, fuglegræs, hyrde taske, ranunkel, røllike, skræppe, vårbrandbæger	Juli-august	Harmony 50 SX* + Spredetklæbemiddel	22,5 – 30 g + 0,2 ltr.	2-3 uger efter afpudsning eller afgræsning. Behandlingsfrist: 14 dage. Kan ikke anvendes i foråret (hæmmer græsvæksten meget i foråret), og må ikke anvendes senere end 31. august. Må kun anvendes én gang om året.
Vårbrandbæger	August	Harmony 50 SX* + Spredetklæbemiddel	15 - 22,5 g + 0,2 ltr.	Sidst i august når vårbrandbæger er fremspiret. Behandlingsfrist: 14 dage. Kan ikke anvendes i foråret (hæmmer græsvæksten meget i foråret), og må ikke anvendes senere end 31. august. Må kun anvendes én gang om året.

*Harmony 50 SX kan også bruges i græs med kløver. Øvrige angivne løsninger i tabellen vil bekæmpe kløver.

Kemisk bekæmpelse i græs med kløver – obs. kun på arealer uden miljøtilsagn

I foråret er der kun mulighed for at anvende bentazonmidler (Fighter 480), hvilket sjældent er aktuelt, da midlet kun har effekt mod få aktuelle arter i græs. Harmony 50 SX kan anvendes i juli/august, hvor der bør sprøjtes på genvækst 2-3 uger efter afpudsning eller afgræsning.

Alle midler i tabel 1, der kan anvendes i rent græs, kan også anvendes i græs med kløver, hvis man prioriterer oprydning i ukrudtet på bekostning af bortsprøjtning af kløveren (sidstnævnte gælder dog ikke for Harmony 50 SX).

OBS på vår- og engbrandbæger

Vår- og engbrandbæger bekæmpes bedst sidst i august, hvor planterne er små (engbrandbæger) og nyfremspiret (vårbrandbæger). Den sikreste bekæmpelse mod vårbrandbæger og engbrandbæger er at anvende Harmony 50 SX sidst i august.



Vårbrandbæger er enårig. Den fremspirer i sensommeren/om efteråret og blomstrer i april-maj året efter.



Engbrandbæger er to- til flerårig. Den fremspirer i foråret – her ses i midten engbrandbæger på rosetstadiet i foråret, mens den blomstrer i juli-august (til højre).



Omlægning i sommerperioden

Hvor det er planlagt/tilladt at omlægge et areal til nyt græs i sensommeren, bør skræpper og andet tokimbladet rodukudt bekæmpes effektivt i foråret/forsommeren uden hensyntagen til eventuel kløverbestand. Græsset kan derefter nedvisnes med høj dosis glyfosat sidst i juli, hvorefter nyt græs kan etableres i august måned.

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Følgende punkter indgår i plejen af en varig græsmark:

1. Afpuds eller tag første slæt før ukrudtet blomstrer. For bl.a. vårbrandbæger i april-maj og for engbrandbæger i begyndelsen af juli.
2. Afpudsning gentages efter behov. F.eks. forsvinder/hæmmes lysesiv og flere andre ukrudtsarter ved gentagne afhugninger tæt på jordoverfladen. Ved gentagne afpudsninger bør man anvende modsat kørselsretning ved den næste afpudsning for at komme så tæt på bunden af siv som muligt. **Skræpper kan dog ikke bekæmpes mekanisk.**
3. En kombination af slæt og afgræsning er den bedste græsmarksdrift. Det giver et større udbytte og har bedre effekt mod ukrudt end afgræsning alene.
4. En meget intensiv afgræsning (mange dyr i en kort eller længere periode) eller en afpudsning med kort stubhøjde har en god effekt mod ukrudt.