

Den afgørende svampebehandling i vinterbyg skal foretages nu

Vinterbygmarkerne er nu ved/i begyndende skridning/stakkens fremkomst, hvor den afgørende svampebehandling mod rust og bladplet bør foretages, uanset om der tidligere i strækningsfasen er foretaget en svampebehandling eller ej. Netop ved stakkens fremkomst opnås samtidig den bedste forebyggelse af eventuelle senere angreb af ramularia. Når/hvis ramularia bliver synlig på bladene, er det for sent at gøre noget, da angreb i udbrud ikke kan bekæmpes. Risikoen for angreb af ramularia øges ved bladfugt, og hvis planterne er/har været stressede. Større angreb af skoldplet i mange vinterbymarker/-sorter i strækningsfasen i år viser, at der har været/er bladfugt, mens det kolde forår og de fortsat tørre vækstbetingelser stresser mange marker. Det er vanskeligt at forudsige, hvilke år ramularia for alvor indtræder, men forholdene har været/er der i år, og ramularia koster store udbyttetab.

Uanset sort – og uanset ramularia eller ej - vil der altid være god betaling for en svampebekæmpelse i vinterbyg her ved begyndende skridning. Ofte kombineres denne svampebekæmpelse med en forebyggelse mod aksnedknækning (især i 6-radede sorter, herunder hybrider), men i år skal man være varsom med Cerone i vinterbyggen på nuværende tidspunkt pga. risikoen for tørkestress.

Tabel 1. Anbefalede løsninger mod svampe (bygrust, bygbladplet og skoldplet) og forebyggelse af ramularia i vinterbyg.

Strategi	Middel	Dosis pr. ha	Bemærkninger
Vinterbyg:			
Ved stakkens fremkomst/begyndende skridning	Propulse + Comet Pro	0,5 ltr. + 0,2 ltr.	Anvendelse af Propulse i høj dosis er meget afgørende for forebyggelse af ramularia. Ønskes ingen forebyggende effekt mod ramularia er 0,35 ltr./ha Propulse/Prosaro + 0,2 ltr./ha Comet Pro tilstrækkelig, og behandlingen kan - afhængig af smittetryk og evt. tidligere svampebehandling i strækningsfasen - trækkes til cirka halv gennemskridning.
Supplerende bekæmpelse efter fuld gennemskridning hvis bygrust	Orius Max 200 EW*	0,25 ltr.	Ved et evt. højt smittetryk af bygrust er der behov for en senere supplerende bekæmpelse på akset.

**Anvendes tebuconazolmidler indkøbt inden 30. april 2022 i hele sæsonen, gælder de gamle triazolregler, og anbefalingen i tabel 1 kan anvendes. Er det mod forventning nye tebuconazolmidler, der anvendes i vækstsæsonen, og har der været anvendt f.eks. "ny" Prosaro, reg. nr. 18-667 i begyndende strækning, skal man være obs. på, om der er "plads" til opfølgende behandling med "ny" Orius Gold, reg. nr. 347-57 på akset. Propulse + Comet Pro tæller ikke med i triazolregnskabet.*



Billede 1. Bygrust på de nederste blade.



Billede 2. Udbredte angreb af ramularia.



Billede 3. Bygbladplet (nettypen).