

## Bekæmpelse af bladlus i vintersæd efter behov



Billede 1. Bladlus i hvedeaks.

I sidste uge begyndte de første bladlus at indfinde sig i hveden, og der skal holdes øje med udviklingen af dem i den kommende periode. I hvede vil eventuelle angreb af bladlus være lette at opdage oppe i akset.

### Vejledende bekæmpelsestærskler for bladlus i vintersæd

Tabel 1. De vejledende bekæmpelsestærskler for bladlus i vinterhvede.

<b>Frem til og med st. 73 (tidlig mælkemodent stadium):</b>	40% angrebne strå, såfremt der ikke er behov for svampebekæmpelse. 25% angrebne strå, såfremt der samtidig er behov for svampebekæmpelse.
<b>Frem til og med st. 75 (kerneindhold mælket og let grynet):</b>	100% angrebne strå. Vær opmærksom på midlernes sprøjtefrister.

Et strå tælles med som angrebet, blot der konstateres en enkelt bladlus.

Betydende angreb af bladlus i vinterbyg, rug og triticale forekommer sjældent, men de vejledende bekæmpelsestærskler ovenfor kan også anvendes i disse afgrøder.

### Anbefalede løsninger mod lus under blomstring

Tabel 2. Anbefalede løsninger mod bladlus under blomstring.

Skadedyr	Middel	Dosering pr. ha	Bemærkning
Kornbladlus*	Pirimor 500 WG	0,1 kg	Pirimor anbefales ved kraftige angreb.
	eller Mavrik	0,1 ltr.	Pirimor, Mavrik og Lamdex må anvendes hhv. én, to og tre gange i sæsonen.
	eller Lamdex	0,1-0,15 kg	

\*I marker med kraftige angreb af bladlus kan der forekomme bier, der søger honningdug. I sådanne marker bruges kun Pirimor eller Mavrik, da det er de eneste midler uden bimærke.