

VÆKST

2023 – uge 23

Tæger og cikader i kartofler

Tæger

Det er nu markerne skal tjekkes for tæger. Tæger bekæmpes ved randsprøjtning med 0,3 kg/ha Lamdex, når de første angreb ses. Derved undgår man kraftige angreb senere i sæsonen.


Cikader

I registreringsnettet blev der i uge 20 fundet en relativ høj indflyvning, som dog faldt lidt i uge 21. Der er konstateret cikader på alle 23 registreringslokaliteter. Evt. bekæmpelse er aktuel cirka 3 uger efter begyndende indflyvning, forudsat at der er tilstrækkelig med bladmasse.



Billede 1. Angreb af tæger ses ved huller og krusninger i bladene. Kilde AKK.

Skadevirkningen af de indflyvende cikader er i sig selv begrænset, men det er meget vigtigt at de bekæmpes, så opformering begrænses. Fra begyndelsen af juli ses næste generation cikader på undersiden af bladene. Cikadenymferne lever af plantesaft, som de får ved at suge på bladene. Symptomerne af sugningen ses først som en gul/brun farvning af de nedre blade. I august/september fremskyndes derved nedvisningen, så tilvæksten stopper for tidligt.



Indflyvning af cikader



cikadenymfer



Symptomer på sugning af cikadenymfer



For tidlig nedvisning pga. cikader

Bekæmpelse af cikader

Første bekæmpelse anbefales foretaget ca. 3 uger efter begyndende indflyvning, hvilket betyder, at der skal behandles mod cikader hen i uge 23/ind i uge 24. Anvend 0,15-0,20 kg/ha Mospilan SG. Højeste dosis anvendes ved kraftige angreb og/eller i modtagelige sorter. I stivelseskartofler kan der yderligere være behov for en behandling ca. 4 uger senere med 0,2-0,25 kg/ha Mospilan SG for at få så lang en virkningstid som muligt.