

VINTERSÆD 2023-2024

— Stærkt sortiment af vintersæd



10 GODE GRUNDE

– til at vælge certificeret såsæd

- 1 CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN**
Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning, stråstyrke, kvalitet o.s.v. Samtidig er der fuld sporbarhed ved salg til malt, brød m.v.
- 2 CERTIFICERET SÅSÆD ER ARTSREN**
Når der ikke er blandet fremmede kornarter i, kan avlen lettere afsættes til industri og eksport med øget sporbarhed, og foderværdien vil være mere ensartet.
- 3 CERTIFICERET SÅSÆD ER FRI FOR SYGDOMME**
Udsædsbårne sygdomme, der skader afgrøden, forebygges ved bejdsning med et anerkendt bejdsemiddel, bejdset i højteknologiske maskiner og med elektronisk overvågning af bejdsningen. Certificeret økologisk udsæd er dog ikke bejdset.
- 4 CERTIFICERET SÅSÆD HAR EN GARANTERET SPIREEVNE**
Høj spireevne giver sikkerhed for normale og kraftige planter samt ensartet fremspiring.
- 5 CERTIFICERET SÅSÆD ER RENSET FOR UKRUDTSFRØ**
Ukrudt påfører afgrøden konkurrence om vand og næringsstoffer, og forurener marken og evt. efterfølgende afgrøder (frøgræsudlæg).
- 6 CERTIFICERET SÅSÆD ER FRI FOR FLYVEHAVRE**
Certificeret såsæd er dyrket på marker, der ved markkontrol er fundet fri for flyvehavre.
- 7 CERTIFICERET SÅSÆD ER RENSET FOR SMÅ KERNER**
Store, ensartede kerner sikrer god og ensartet etablering af afgrøden, hvilket giver et sikkert og højere udbytte.
- 8 CERTIFICERET SÅSÆD GIVER STØRRE SIKKERHED**
Hvis uheldet er ude, og såsæden ikke lever op til kvalitetskravene, ydes der erstatningsudbetaling efter Landbrugsstyrelsens regler. Danmark er det eneste land i Europa med denne ordning.
- 9 MED CERTIFICERET SÅSÆD FØLGER RÅDGIVNING**
En stab af erfarne såsædsfolk står klar med gode råd om de enkelte sorters dyrknings- og kvalitetsegenskaber, så avleren kan få det bedst mulige økonomiske resultat ud af sit sortsvalg.
- 10 CERTIFICERET SÅSÆD OG FREMTIDEN**
Ved at vælge certificeret såsæd bidrager man til en fortsat udvikling af nye og endnu bedre sorter fra forædlerne via licensindtægterne, forædlerens eneste indtægtskilde.

Vigtigt at beregne den rigtige udsædsmængde – for hver dag, hvert parti og hvert såbed

SÅBEDSKVALITET	% FORVENTET MARKSPIRING		SÅDYBDE, CM		
	SEPTEMBER	BEGYNDELSEN AF OKTOBER	KORN		RAPS
			KONVENTIONELLE	HYBRIDER	LINIE OG HYBRIDER
GOD	90	85	4	2-3	1-2
MIDDEL	85	80			
DÅRLIG	80	75			

Forventet markspiring

Foruden såsædens angivne spiringsprocent er det vigtigt at vurdere såbedets karakter, når den forventede markspiringsprocent fastsættes. Selv med såsæd med høj spireevne og vitalitet har "Farmtest med etablering af vårsæd" vist helt ned til 60-70% af den ønskede plantebestand som følge af varierende sådybde, for høj såhastighed og dårligt såbed.

Ved optimal sådybde og såbed kan der regnes med ca. 90% markspiring, mens der ved mindre optimale forhold bør regnes med en lavere markspiring.

Markspiringsprocenten bør således fastsættes i intervallet 75-90% afhængig af såbedsforholdene.

Det er helt afgørende at indregne partiets TKV og de anbefalede plantetal på næste side i forhold til arter og såtidspunkter. De angivne retningsgivende plantetal er fastsat efter mange års landsforsøg og erfaringer. Den varierende faktor for beregning af den rette udsædsmængde, er fastsættelsen af vurderet fremspiringsprocent under de givne forhold. En forskel i forventet fremspiring på f.eks. 15% betyder en ændret udsædsmængde på 30 kg/ha.

Tusindkornsvægt (TKV) x ønsket plantetal (pl./m²)
Forventet markspiringsprocent

= Kg udsæd pr. ha



ANBEFALEDE PLANTETAL PR. M² AFHÆNGIG AF SÅTIDSPUNKT

	AUGUST		SEPTEMBER						OKTOBER		
ART	10-24	25-31	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	1-3	4-7	8-11
HVEDE	-	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425
HVEDE, HYBRID	-	-	120	125	130	145	160	175	-	-	-
VINTERBYG, 2R	-	-	-	225	275	325	350	375	-	-	-
VINTERBYG, 6R	-	-	-	225	275	325	350	375	-	-	-
VINTERBYG, 6R HYBRID	-	-	125	145	165	185	225	-	-	-	-
RUG, HYBRID	-	-	140	150	160	170	190	200	200	200	-
TRITICALE	-	-	225	250	275	300	325	350	375	400	425
VINTERRAPS, LINIE**	40-50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VINTERRAPS, HYBRID**	30-35	35-40	40	-	-	-	-	-	-	-	-

*Plantetallet i vinterkorn øges med 25-50 pl./m² (mindst for hybrider) på kolde lokaliteter og/eller ved pløjefri dyrkning, dårligt såbed, høj risiko for snegleangreb og frøgræs som forfrugt.

**Plantetallet i vinterraps reduceres med 5 pl./m² ved etablering på rækker.

VINTERRAPS: ANBEFALEDE SÅVINDUER AFHÆNGIG AF SORTSVALG

AUGUST	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-31
DK EXBURY	x	x	x	x	x	
LGA ARMADA	(x)	x	x	x	x	(x)
LG AUCKLAND		x	x	x	x	x
TURING		x	x	x	x	x
PT 303		x	x	x	x	x
PT 315		x	x	x	x	x
CREED		x	x	x	x	x

VINTERBYG ANBEFALEDE SÅVINDUER AFHÆNGIG AF SORTSVALG

SEPTEMBER	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
BORDEAUX		(x)	x	x	x	
NOS CONTADOR		(x)	x	x	x	
ORCADE	(x)	x	x	x	x	
LG GLOBETROTTER		(x)	x	x	x	
SORTSBLANDING (BORDEAUX, NOS CONTADOR, LG GLOBETROTTER)		(x)	x	x	x	
SY DAKOOTA	x	x	x	x	(x)	
SY CAROO	x	x	x	x	x	

VINTERRUG: ANBEFALEDE SÅVINDUER AFHÆNGIG AF SORTSVALG

SEPTEMBER	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
ASTRANOS	x	x	x	x	x	(x)
KWS BERADO	x	x	x	x	x	(x)
KWS ROTOR	x	x	x	x	x	(x)
SU THOR	x	x	x	x	x	(x)

VINTERHVEDE: ANBEFALEDE SÅVINDUER AFHÆNGIG AF SORTSVALG

SEPTEMBER. OKTOBER.	1-5	6-10	11-20	21-25	26-30	1-10
PONDUS	x	x	x	x	x	x
NOS HVEDE MIX 2220 (PONDUS, INFORMER, RGT BAIRSTOW)	(x)	x	x	x	x	x
SORTSBLANDING (PONDUS, INFORMER, WPB ENNIS)			x	x	x	x
KUBIK		(x)	x	x	x	x
INFORMER		x	x	x	x	x
RGT BAIRSTOW		(x)	x	x	x	x
RGT SAKI	x	x	x	x	x	
KWS LILI			x	x	x	

DK EXBURY

VINTERRAPS, HYBRID

FORÆDLER: DEKALB



DK Exbury hybrid

Sælges i units med 1.500.000 frø.
Se specifikation på sækken.

Egenskaber:

- Udbyttestabil sort
- Egnet til tidlig såning pga. kompakt vækst
- Lav modtagelighed for phoma
- Besidder resistens mod rapsrødsot (TuYV)
- Besidder skulpeopspringsresistens

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

OLIEINDHOLD

Lavt					Højt
------	--	--	--	--	------

PHOMA

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

PLANTEHØJDE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

STÆNGELSTYRKE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----


MODNINGSDATO

Tidlig					Sen
--------	--	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/8					31/8
-----	--	--	--	--	------

UDVIKLINGSSTADIER (St.)



VINTERRAPS: ANBEFALEDE SÅVINDUER AFHÆNGIG AF SORTSVALG

AUGUST	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-31
DK Exbury	x	x	x	x	x	
LG Armada	(x)	x	x	x	x	(x)
LG Auckland		x	x	x	x	x
Turing		x	x	x	x	x
PT 303		x	x	x	x	x
PT 315		x	x	x	x	x
Creed		x	x	x	x	x

FAKTA

ÅR	FRØUDBYTTE* (fht)	FRØUDBYTTE** (fht)	OLIE INDHOLD* (%)	OLIE INDHOLD** (%)	AFGRØDEHØJDE VED HØST (cm)	LEJESÆD (kar. 0-10)
2022	99	-	51,7	-	142	1,7
2021	105	-	50,1	-	162	0,7
2020	-	-	-	-	-	-

*Landsforsøg. ** Supplerende forsøg.

Kilde: Sortinfo.dk.

LG ARMADA

VINTERRAPS, HYBRID

FORÆDLER: LIMAGRAIN



LG Armada hybrid

Sælges i units med 1.500.000 frø.
Se specifikation på sækken.

Egenskaber:

- Ny højt ydende sort
- Besidder resistens mod TuYV
- Besidder skulpeopspringsresistens
- Lav modtagelighed for kransskimmel
- Bredt såvindue
- Besidder N-flex
- Tildelt stemplet "Stem Health"

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

OLIEINDHOLD

Lavt					Højt
------	--	--	--	--	------

PHOMA

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

PLANTEHØJDE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

STÆNGELSTYRKE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----


MODNINGSDATO

Tidlig					Sen
--------	--	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/8						31/8
-----	--	--	--	--	--	------

UDVIKLINGSSTADIER (St.)



N-FLEX

- Sorten har en god kvælstof-effektivitet.

STEM HEALTH

- Limagrains-stempel som indikerer meget lav modtagelighed for lysbladplet, kransskimmel og rodhalsråd.

VINTERRAPS: ANBEFALEDE SÅVINDUER AFHÆNGIG AF SORTSVALG

AUGUST	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-31
DK Exbury	x	x	x	x	x	
LG Armada	(x)	x	x	x	x	(x)
LG Auckland		x	x	x	x	x
Turing		x	x	x	x	x
PT 303		x	x	x	x	x
PT 315		x	x	x	x	x
Creed		x	x	x	x	x

FAKTA

ÅR	FRØUDBYTTE* (fht)	FRØUDBYTTE** (fht)	OLIE INDHOLD* (%)	OLIE INDHOLD** (%)	AFGRØDEHØJDE VED HØST (cm)	LEJESÆD (kar. 0-10)
2022	103	-	51,7	-	151	0,8

*Landsforsøg. ** Supplerende forsøg.

Kilde: Sortinfo.dk.

LG AUCKLAND

VINTERRAPS, HYBRID

FORÆDLER: LIMAGRAIN



LG Auckland hybrid

Sælges i units med 1.500.000 frø.
Se specifikation på sækken.

Egenskaber:

- Højt udbytte over 3 år
- Højest ydende i værdiafprøvning 2019 og 2020
- Lav modtagelighed for lys bladplet
- Lav modtagelighed for kransskimmel
- Besidder resistens mod TuYV
- Besidder skulpeopspringsresistens
- Tildelt stempet "Stem Health"

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

OLIEINDHOLD

Lavt				Højt
------	--	--	--	------

PHOMA

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

PLANTEHØJDE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

STÆNGELSTYRKE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----


MODNINGSDATO

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/8				31/8
-----	--	--	--	------

UDVIKLINGSSTADIER (St.)



STEM HEALTH

- Limagrain-stempel som indikerer meget lav modtagelighed for lysbladplet, kransskimmel og rodhalsråd.

VINTERRAPS: ANBEFALEDE SÅVINDUER AFHÆNGIG AF SORTSVALG

AUGUST	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-31
DK Exbury	x	x	x	x	x	
LG Armada	(x)	x	x	x	x	(x)
LG Auckland		x	x	x	x	x
Turing		x	x	x	x	x
PT 303		x	x	x	x	x
PT 315		x	x	x	x	x
Creed		x	x	x	x	x

FAKTA

ÅR	FRØUDBYTTE* (fht)	FRØUDBYTTE** (fht)	OLIE INDHOLD* (%)	OLIE INDHOLD** (%)	AFGRØDEHØJDE VED HØST (cm)	LEJES/ED (kar. 0-10)
2022	99	104	51,2	50,9	141	1,9
2021	110	-	50,4	-	152	1,7
2020	112	-	49,6	-	129	2,1

*Landsforsøg. ** Supplerende forsøg.

Kilde: Sortinfo.dk.

TURING

VINTERRAPS, HYBRID

FORÆDLER: NPZ (NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT)



Turing hybrid

Sælges i units med 1.500.000 spiredygtige frø.
Se specifikation på sækken.

Egenskaber:

- Højest ydende sort i landsforsøg 2022
- Middel plantehøjde
- Højt olieindhold
- Lav modtagelighed for phoma
- Lav modtagelighed for lys bladplet
- Middel til kraftig efterårsvækst
- Lav modtagelighed for kransskimmel ifølge forædleren

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

OLIEINDHOLD

Lavt					Højt
------	--	--	--	--	------

PHOMA

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

PLANTEHØJDE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

STÆNGELSTYRKE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----


MODNINGSTID

Tidlig					Sen
--------	--	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/8					31/8
-----	--	--	--	--	------

UDVIKLINGSSTADIER (St.)



VINTERRAPS: ANBEFALEDE SÅVINDUER AFHÆNGIG AF SORTSVALG

AUGUST	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-31
DK Exbury	x	x	x	x	x	
LG Armada	(x)	x	x	x	x	(x)
LG Auckland		x	x	x	x	x
TURING		x	x	x	x	x
PT 303		x	x	x	x	x
PT 315		x	x	x	x	x
CREED		x	x	x	x	x

FAKTA

ÅR	FRØUDBYTTE* (fht)	FRØUDBYTTE** (fht)	OLIE INDHOLD* (%)	OLIE INDHOLD** (%)	AFGRØDEHØJDE VED HØST (cm)	LEJESÆD (kar. 0-10)
2022	105	-	50,5	-	135	1,5
2021	104	-	49,7	-	144	0,8

*Landsforsøg. ** Supplerende forsøg.

Kilde: Sortinfo.dk.

PT 315

VINTERRAPS, HYBRID FORÆDLER: PIONEER/CORTEVA



PT 315 hybrid

Sælges i units med 1.500.000 spiredygtige frø.
Se specifikation på sækken.

Egenskaber:

- Højt udbyttepotentiale
- Meget højt olieindhold
- God stråstyrke
- Besidder resistens mod TuYV
- Besidder skulpeopspringsresistens
- Tidlig vækststart i foråret

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

OLIEINDHOLD

Lavt				Højt
------	--	--	--	------

PHOMA

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

PLANTEHØJDE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

STÆNGELSTYRKE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----


MODNINGSTID

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/8				31/8
-----	--	--	--	------

UDVIKLINGSSTADIER (St.)



VINTERRAPS: ANBEFALEDE SÅVINDUER AFHÆNGIG AF SORTSVALG

AUGUST	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-31
DK Exbury	x	x	x	x	x	
LG Armada	(x)	x	x	x	x	(x)
LG Auckland		x	x	x	x	x
TURING		x	x	x	x	x
PT 303		x	x	x	x	x
PT 315		x	x	x	x	x
CREED		x	x	x	x	x

FAKTA

ÅR	FRØUDBYTTE* (fht)	FRØUDBYTTE** (fht)	OLIE INDHOLD* (%)	OLIE INDHOLD** (%)	AFGRØDEHØJDE VED HØST (cm)	LEJESÆD (kar. 0-10)
2022	102	-	52,9	-	151	1,0
2021	-	101	-	52,5	-	-
2020	-	113	-	51,0	-	-

*Landsforsøg. **Lovbestemt værdisafprøvning.

Kilde: Sortinfo.dk.

PONDUS

VINTERHVEDE

FORÆDLER: NORDIC SEED



RESISTENT MOD
HVEDEGALMYG



FODER



Egenskaber:

- Meget højt ydende sort over flere år på alle jordtyper
- God, lav IPM-score over flere år
- Meget vinterfast
- Resistent mod hvedegalmug
- Meget lav modtagelighed for sygdomme
- Resistent mod alle kendte gulrustracer
- God stråstyrke
- Bredt såvindue - egner sig også til tidlig såning

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

GULRUST

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

SEPTORIA

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

MELDUG

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

BRUNRUST

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

STRÅSTYRKE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

MODNINGSTID

Tidlig					Sen
--------	--	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9					10/10
-----	--	--	--	--	-------

BONUSINFO PONDUS

- Laveste modtagelighed for aksfusarium i gennemsnit af de sidste to år blandt alle markedsførte sorter - meget vigtig egenskab ved opfodring (kilde: Applied Crop Protection 2021 og 2022, DCA Report no 204, Aarhus Universitet)
- Laveste modtagelighed for DTR (hvedebladplet) i de sidste to år blandt alle markedsførte sorter - meget vigtig egenskab ved pløjefri dyrkning (kilde: Applied Crop Protection 2021 og 2022, DCA Report no 204, Aarhus Universitet)
- Godkendt af Absolut Vodka i Sverige som stivelseshvede til destillering

PLANTEVÆRN

VÆKSTSTADIE	St. 12-15	St. 29-31	St. 32	St. 39	St. 53-65
SVAMPESYGDOMME*		Hold øje med meldugangreb.	Hold øje med evt. svampeangreb.	Anvend 0,4-0,6 l Balaya.	Anvend 0,4 l Propulse + 0,2 l Orius Gold.
VÆKSTREGULERING**			0,3-0,4 l Moddus M.		
SKADEDYR	Anvend 0,15 l Mavrik hvis behov for forebyggelse af havrerødsot.				Ved 25-50% angrebne strå af bladlus: anvend 0,15 kg Lamdex / 0,1 l Mavrik.

*Obs. på triazolregnskabet ved anden svampestrategi. **Vækstreguler aldrig stressede afgrøder.

FAKTA

						OBSERVATIONSPARCELLER				
ÅR	KERNE-UDBYTTE* (fht)	KERNE-UDBYTTE** (fht)	PROTEIN-UDBYTTE* (kg./ha)	PROTEIN-UDBYTTE** (kg./ha)	HEKTO-LITERVÆGT* (kg./hl)	MELDUG (%)	SEPTORIA (%)	GULRUST (%)	LEJESÆD (kar. 0-10)	IPM SCORE*** (kar 0-19)
2022	102	101	973	913	78,0	2,2	3,0	0,0	-	8,0
2021	104	-	972	-	76,5	1,6	3,0	0,0	0,0	8,0
2020	107	-	1.023	-	77,2	4,3	4,6	0,0	0,0	8,0

*Landsforsøg. **Supplerende landsforsøg. ***Forventet behandlingsbehov: kar. 0=lavt behov, kar. 19= højt behov.

Kilde: Sortinfo.dk.

NOS HVEDE MIX 2220

PONDUS - INFORMER - RGT BAIRSTOW

FORÆDLER: NORDIC SEED,
SAATZUCHT JOSEF BREUN, RACT




Egenskaber:

- Højt ydende og robust sortsblending
- En stærkt cocktail til opfodring
- God, lav IPM-score
- Høj genetisk diversitet
- Høj tolerance mod hvedegalmug
- Meget lav modtagelighed for sygdomme
- Lav modtagelighed for aksfusarium
- Meget bredt såvindue


UDBYTTEPOTENTIALE




GULRUST



SEPTORIA



MELDUG



BRUNRUST



STRÅSTYRKE




TIDLIGHED



ETABLERINGSTIDSPUNKT



KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



PLANTEVÆRN

VÆKSTSTADIE	St. 12-15	St. 29-31	St. 32-33	St. 39	St. 53-65
SVAMPESYGDOMME*		Hold øje med evt. meldugangreb.	Hold øje med evt. svampeangreb.	Anvend 0,4-0,6 l Balaya.	Anvend 0,3-0,4 l Propulse + 0,2 l Orius Gold.
VÆKSTREGULERING**			0,3-0,4 l Moddus M.		
SKADEDYR	Anvend 0,15 l Mavrik hvis behov for forebyggelse af havrerødsot.				Ved 25-50% angrebne strå af bladlus: anvend 0,15 kg Lamdex / 0,1 l Mavrik.

*Obs. på triazolregnskabet ved anden svampestrategi. **Vækstreguler aldrig stressede afgrøder.

FAKTA NOS HVEDE MIX 2220

						OBSERVATIONSPARCELLER				
ÅR	KERNE- UDBYTTE* (fht)	KERNE- UDBYTTE** (fht)	PROTEIN- UDBYTTE* (kg./ha)	PROTEIN- UDBYTTE** (kg./ha)	HEKTO- LITERVÆGT* (kg./hl)	MELDUG (%)	SEPTORIA (%)	GULRUST (%)	LEJESÆD (kar. 0-10)	IPM SCORE*** (kar 0-19)
2022	101	-	964	-	78,3	0,6	4,9	0,0	0,0	8,0

*Landsforsøg. **Supplerende landsforsøg. ***Forventet behandlingsbehov: kar. 0=lavt behov, kar. 19= højt behov.

Kilde: Sortinfo.dk.

FAKTA

SORTER**	KERNEUDBYTTE* (fht)		MERUDBYTTE FOR SVAMPEBEKÆMPELSE		IPM SCORE (kar 0-19)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
PONDUS	102	104	5,6	10,7	8,0	8,0
INFORMER	97	99	4,2	7,6	7,0	8,0
RGT BAIRSTOW	99	103	5,1	13,7	10,0	9,0
GENNEMSIT	99	102	5,0	10,7	8,0	8,0

*Landsforsøg. **Sorterne i blandingen indgår med samme andel.

Kilde: Sortinfo.dk.

SORTSBLANDING

PONDUS - KUBIK - WPB ENNIS

FORÆDLER: NORDIC SEED, WIERSUM PLANTBREEDING B.V.



Egenskaber:

- Sortsblanding med højt udbyttepotentiale
- En god cocktail til opfordring
- Høj stråstyrke
- Velegnet til medio - sen såning

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

GULRUST

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

SEPTORIA

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

MELDUG

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

BRUNRUST

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

STRÅSTYRKE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----


TIDLIGHED

Tidlig					Sen
--------	--	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9					10/10
-----	--	--	--	--	-------

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



PLANTEVÆRN

VÆKSTSTADIE	St. 12-15	St. 29-31	St. 33	St. 39	St. 53-65
SVAMPESYGDOMME*		Hold øje med evt. meldugangreb.	Hold øje med evt. svampeangreb.	Anvend 0,4-0,6 l Balaya.	Anvend 0,3-0,4 l Propulse + 0,2 l Orius Gold.
VÆKSTREGULERING**			0,3-0,4 l Moddus M.		
SKADEDYR	Anvend 0,15 l Mavrik hvis behov for forebyggelse af havrerødsot.				Ved 25-50% angrebne strå af bladlus: anvend 0,15 kg Lamdex / 0,1 l Mavrik.

*Obs. på triazolregnskabet ved anden svampestrategi. **Vækstreguler aldrig stressede afgrøder.

FAKTA

SORTER**	KERNEUDBYTTE* (fht)		MERUDBYTTE FOR SVAMPEBEKÆMPELSE		IPM SCORE (kar 0-19)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
PONDUS	102	104	5,6	10,7	8,0	8,0
KUBIK	100	104	3,6	10,6	10,0	9,0
WPB ENNIS	100	104	4,4	11,1	10,0	10,0
GENNEMSNIT	101	104	4,8	10,8	9,0	9,0

*Landsforsøg. **Pondus indgår med 50% og Kubik og WPB Ennis med hver 25% i blandingen

Kilde: Sortinfo.dk.

KUBIK

VINTERHVEDE

FORÆDLER: NORDIC SEED



Egenskaber:

- Ny højt ydende sort
- Høj hektolitervægt
- Høj stråstyrke
- Middel modtagelighed for sygdomme

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

GULRUST

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

SEPTORIA

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

MELDUG

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

BRUNRUST

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

STRÅSTYRKE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----


MODNINGSTID

Tidlig					Sen
--------	--	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9					10/10
-----	--	--	--	--	-------

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



PLANTEVÆRN

VÆKSTSTADIE	St. 12-15	St. 29-31	St. 33	St. 39	St. 53-65
SVAMPESYGDOMME*		Hold øje med meldugangreb.	Ved angreb af meldug, gulrust og septoria: anvend 0,3 l Prosaro	Anvend 0,5-0,7 l Balaya.	Anvend 0,4 l Propulse + 0,2 l Orius Gold.
VÆKSTREGULERING**			0,3-0,4 l Moddus M.		
SKADEDYR					Ved 25-50% angrebne strå af bladlus: anvend 0,15 kg Lamdex / 0,1 l Mavrik.

*Obs. på triazolregnskabet ved anden svampestrategi. **Vækstreguler aldrig stressede afgrøder.

FAKTA

ÅR						OBSERVATIONSPARCELLER				IPM SCORE*** (kar 0-19)
	KERNE- UDBYTTE* (fht)	KERNE- UDBYTTE** (fht)	PROTEIN- UDBYTTE* (kg./ha)	PROTEIN- UDBYTTE** (kg./ha)	HEKTO- LITERVÆGT* (kg./hl)	MELDUG (%)	SEPTORIA (%)	GULRUST (%)	LEJESÆD (kar. 0-10)	
2022	100	-	944	-	78,6	7,0	10,0	1,2	-	10,0
2021	104	104	951	911	77,2	2,0	13,0	0,4	0,0	9,0
2020**	-	105	-	974	79,4	1,0	17,0	0,7	0,0	-

*Landsforsøg. ** Lovbestemt værdiafprøvning. ***Forventet behandlingsbehov: kar. 0=lavt behov, kar. 19= højt behov.

Kilde: Sortinfo.dk.

INFORMER

VINTERHVEDE FORÆDLER: SAATZUCHT JOSEF BREUN



Egenskaber:

- Stabilt ydende sort over flere år
- God, lav IPM-score over flere år
- Høj hektolitervægt
- Lav modtagelighed for sygdomme
- Lav modtagelighed for DTR og aksfusarium
- Langt, men stærkt strå
- Optaget på brødhvedelisten til forhøjet N-kvot

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

GULRUST

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

SEPTORIA

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

MELDUG

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

BRUNRUST

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

STRÅSTYRKE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----


MODNINGSTID

Tidlig					Sen
--------	--	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9					10/10
-----	--	--	--	--	-------

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



PLANTEVÆRN

VÆKSTSTADIE	St. 12-15	St. 29-31	St. 33	St. 39	St. 53-65
SVAMPESYGDOMME*		Hold øje med meldugangreb.	Hold øje med evt. svampeangreb.	Anvend 0,5-0,7 l Balaya.	Anvend 0,3-0,4 l Propulse + 0,2 l Orius Gold.
VÆKSTREGULERING**			0,3-0,4 l Moddus M.		
SKADEDYR	Avend 0,15 l Mavrik hvis behov for forebyggelse af havrerødsot.				Ved 25-50% angrebne strå af bladlus: anvend 0,15 kg Lamdex / 0,1 l Mavrik.

*Obs. på triazolregnskabet ved anden svampestrategi. **Vækstreguler aldrig brødhvede og stressede afgrøder.

FAKTA

ÅR						OBSERVATIONSPARCELLER				IPM SCORE*** (kar 0-19)
	KERNE- UDBYTTE* (fht)	KERNE- UDBYTTE** (fht)	PROTEIN- UDBYTTE* (kg./ha)	PROTEIN- UDBYTTE** (kg./ha)	HEKTO- LITERVÆGT* (kg./hl)	MELDUG (%)	SEPTORIA (%)	GULRUST (%)	LEJESÆD (kar. 0-10)	
2022	97	-	955	-	79,4	1,7	6,0	0,0	-	7,0
2021	99	98	932	834	77,2	0,2	4,9	0,0	0,0	8,0
2020	100	98	1.007	896	80,8	0,8	3,4	0,0	0,0	7,0

*Landsforsøg. **Supplerende landsforsøg. ***Forventet behandlingsbehov: kar. 0=lavt behov, kar. 19= højt behov.

Kilde: Sortinfo.dk.

RGT BAIRSTOW

VINTERHVEDE

FORÆDLER: RAGT



RESISTENT MOD
HVEDEGALMYG



FODER



Egenskaber:

- Meget højt ydende sort
- Resistent mod hvedegalmyg
- Lav modtagelighed for sygdomme
- God stråstyrke

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

GULRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

SEPTORIA

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

MELDUG

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

BRUNRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

STRÅSTYRKE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----


MODNINGSTID

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9				10/10
-----	--	--	--	-------

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



PLANTEVÆRN

VÆKSTSTADIE	St. 12-15	St. 29-31	St. 33	St. 39	St. 53-65
SVAMPESYGDOMME*		Hold øje med meldugangreb.	Ved angreb af meldug, gulrust og septoria: anvend 0,3 l Prosaro.	Anvend 0,5-0,7 l Balaya.	Anvend 0,3-0,4 l Propulse + 0,2 l Orius Gold.
VÆKSTREGULERING**			0,3-0,4 l Moddus M.		
SKADEDYR	Anvend 0,15 l Mavrik hvis behov for forebyggelse af havrerødsot.				Ved 25-50% angrebne strå af bladlus: anvend 0,15 kg Lamdex / 0,1 l Mavrik.

*Obs. på triazolregnskabet ved anden svampestrategi. **Vækstreguler aldrig stressede afgrøder.

FAKTA

ÅR						OBSERVATIONSPARCELLER				IPM SCORE*** (kar 0-19)
	KERNE- UDBYTTE* (fht)	KERNE- UDBYTTE** (fht)	PROTEIN- UDBYTTE* (kg./ha)	PROTEIN- UDBYTTE** (kg./ha)	HEKTO- LITERVÆGT* (kg./hl)	MELDUG (%)	SEPTORIA (%)	GULRUST (%)	LEJESÆD (kar. 0-10)	
2022	99	99	927	877	77,7	2,8	8,0	0,0	-	10,0
2021	103	-	941	-	76,1	0,2	10,0	0,3	0,0	9,0
2020	107	-	1.006	-	78,4	1,5	8,0	0,2	0,0	8,0

*Landsforsøg. **Supplerende landsforsøg. ***Forventet behandlingsbehov: kar. 0=lavt behov, kar. 19= højt behov.

Kilde: Sortinfo.dk.

BORDEAUX

VINTERBYG, 2-RADET

FORÆDLER: NORDIC SEED



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

MELDUG

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

BYGRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

SKOLDPLET

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

STRÅSTYRKE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----


ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9				25/9
-----	--	--	--	------

Egenskaber:

- Højest ydende sort i 2022
- Stabil højt ydende sort over flere år
- God vinterfasthed
- Dyrkningsejnet på alle jordtyper
- Middel stråstyrke
- Meget høj hektolitervægt

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



PLANTEVÆRN

VÆKSTSTADIE	St. 12-15	St. 32	St. 37-39	St. 39-45	St. 55 - 59
SVAMPESYGDOMME		Anvend 0,3 l Prosaro hvis meldug, skoldplet og bygrust.		Anvend 0,4-0,5 l Propulse + 0,15 l Comet Pro.	
VÆKSTREGULERING*		Anvend 0,2 l Moddus M ved højt N-niveau / kraftige marker.		Anvend 0,2 l Cerone.	
SKADEDYR	Anvend 0,15 l Mavrik hvis tidlig såning og behov for forebyggelse af havrerødsot.				

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder.

FAKTA

ÅR				OBSERVATIONSPARCELLER					
	KERNE-UDBYTTE* (fht)	PROTEIN-UDBYTTE* (kg./ha)	HEKTO-LITERVÆGT* (kg./hl)	MELDUG (%)	BYGRUST (%)	SKOLDPLET (%)	RAMULARIA (%)	STRÅLÆNGDE (cm)	LEJESÆD (kar. 0-10)
2022	107	900	72,1	19,0	6,0	-	10,0	82,0	1,0
2021	98	785	70,2	4,5	2,3	19,0	4,6	86,0	2,0
2020	100	830	69,6	10,0	7,0	18,0	-	73,0	0,0

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk.

ORCADE

VINTERBYG, 2-RADET

FORÆDLER: NORDIC SEED



RESISTENT MOD
HAVRERØDSOT



FODER



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

MELDUG

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

BYGRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

SKOLDPLET

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

STRÅSTYRKE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----


ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9				25/9
-----	--	--	--	------

Egenskaber:

- Resistent mod havrerødsot
- Ny meget højt ydende sort
- Højest ydende af alle havrerødsot resistente sorter
- Høj hektolitervægt
- Meget lav modtagelighed for sygdomme
- Høj stråstyrke

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



PLANTEVÆRN

VÆKSTSTADIE	St. 12-15	St. 32	St. 37-39	St. 39-45	St. 55 - 59
SVAMPESYGDOMME		Anvend 0,2 l Prosaro hvis meldug, skoldplet og bygrust.		Anvend 0,3-0,5 l Propulse + 0,15 l Comet Pro.	
VÆKSTREGULERING*		Anvend 0,2 l Moddus M. ved højt N-niveau / kraftige marker.		Anvend 0,2 l Cerone.	
SKADEDYR					

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder.

FAKTA

ÅR				OBSERVATIONSPARCELLER					
	KERNE- UDBYTTE* (fht)	PROTEIN- UDBYTTE* (kg./ha)	HEKTO- LITERVÆGT* (kg./hl)	MELDUG (%)	BYGRUST (%)	SKOLDPLET (%)	RAMULARIA (%)	STRÅLÆNGDE (cm)	LEJESÆD (kar. 0-10)
2022	105	938	69,9	0,5	0,0	-	4,3	89,0	1,0
2021**	106	905	69,8	0,5	0,0	-	4,3	89,0	1,0
2020**	103	901	69,2	0,6	0,1	16,0	11,0	91,0	2,0

*Landsforsøg. ** Lovbestemt værdisafprøvning.

Kilde: Sortinfo.dk.

SORTSBLANDING

BORDEAUX - NOS CONTADOR - LG GLOBETROTTER

NORDIC SEED,
FORÆDLER: LIMAGRAIN



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Modtagelig Høj

MELDUG

Lav modtag. Modtagelig

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅSTYRKE

Lav Høj


ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9 25/9

Egenskaber:

- Meget højt ydende sortsblanding
- Meget robust blanding
- Lav modtagelighed for svampe
- God stråstyrke

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



PLANTEVÆRN

VÆKSTSTADIE	St. 12-15	St. 32	St. 37-39	St. 39-45	St. 55 - 59
SVAMPESYGDOMME		Anvend 0,2 l Prosaro hvis meldug, skoldplet og bygrust.		Anvend 0,3-0,5 l Propulse + 0,15 l Comet Pro.	
VÆKSTREGULERING*		Anvend 0,2 l Moddus M ved højt N-niveau / kraftige marker.		Anvend 0,2 l Cerone.	
SKADEDYR	Anvend 0,15 l Mavrik hvis tidlig såning og behov for forebyggelse af havrerødsot.				

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder.

FAKTA

SORTER***	KERNEUDBYTTE* (fht)		MERUDBYTTE FOR SVAMPEBEKÆMPELSE	
	2022	2021	2022	2021
BORDEAUX	107	98	10,7	8,9
NOS CONTADOR	106	107**	4,2	-
LG GLOBETROTTER	103	102	5,7	7,9
GENNEMSIT	105	102	6,9	-

*Landsforsøg. **Lovbestemt værdiafprøvning. *** Sorterne i blandingen indgår med samme andel.

Kilde: Sortinfo.dk.

KWS BERADO

VINTERRUG, HYBRID

FORÆDLER: KWS



Vinterrug hybrider

Sælges i bigbags med 12 millioner spiredygtige kerner (12 units pr. bigbag)


Egenskaber:

- Stabilt højt ydende hybrid
- Meget høj hektolitervægt
- Høj stråstyrke
- Lav modtagelighed for meldrøjere

UDBYTTEPOTENTIALE



MELDUG



BRUNRUST




SKOLDPLET



STRÅSTYRKE



KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



PLANTEVÆRN

VÆKSTSTADIE	St. 29-31	St. 32	St. 37-45	St. 69
SVAMPESYGDOMME*		Anvend 0,25 l Prosaro hvis angreb af skoldplet og / eller brunrust.	Anvend 0,3 l Prosaro + 0,15 l Comet Pro.	Anvend 0,2 l Orius Gold hvis angreb af brunrust.
VÆKSTREGULERING**		0,2-0,3 l Moddus M.	Suppler med 0,2 l Moddus M. + 0,2 l Cerone ved højt N-niveau og kraftige marker.	
SKADEDYR			Anvend 0,15 kg Lamdex / 0,1 l Mavrik ved > 0,5-1 trips pr. bladskede.	

*Obs på triazolregler ved anden svampestrategi. **Vækstreguler aldrig brødrug og stressede afgrøder.

FAKTA

ÅR						OBSERVATIONSPARCELLER			
	KERNEUDBYTTE* (fht)	KERNEUDBYTTE** (fht)	PROTEIN-UDBYTTE* (kg./ha)	PROTEIN-UDBYTTE** (kg./ha)	FODERVÆRDI, SVIN (kar. 1-9)	MELDUG (%)	BRUNRUST (%)	SKOLDPLET (%)	LEJESÆD (kar. 0-10)
2022	102	101	809	803	-	-	19,0	11,0	0,8
2021	100	99	728	806	5,0	0,0	-	11,0	1,4
2020	104	106	792	777	5,0	-	0,1	10,0	1,5

*Landsforsøg. **Supplerende landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk.

KWS ROTOR

VINTERRUG, HYBRID

FORÆDLER: KWS



Vinterrug hybrider

Sælges i bigbags med 12 millioner spiredygtige kerner (12 units pr. bigbag).


Egenskaber:

- Højt ydende hybrid
- Lav modtagelighed for meldrøjere

UDBYTTEPOTENTIALE



MELDUG



BRUNRUST




SKOLDPLET



STRÅSTYRKE



KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



PLANTEVÆRN

VÆKSTSTADIE	St. 29-31	St. 32	St. 37-45	St. 69
SVAMPESYGDOMME*		Anvend 0,25 l Prosaro hvis angreb af skoldplet og / eller brunrust.	Anvend 0,3 l Prosaro + 0,15 l Comet Pro.	Anvend 0,2 l Orius Gold hvis angreb af brunrust.
VÆKSTREGULERING**		0,3-0,4 l Moddus M.	Suppler med 0,2 l Moddus M. + 0,2 l Cerone ved højt N-niveau og kraftige marker.	
SKADEDYR			Anvend 0,15 kg Lamdex / 0,1 l Mavrik ved > 0,5-1 trips pr. bladskede.	

*Obs på triazolregler ved anden svampestrategi. **Vækstreguler aldrig brødrug og stressede afgrøder.

FAKTA

						OBSERVATIONSPARCELLER			
ÅR	KERNEUDBYTTE* (fht)	KERNEUDBYTTE** (fht)	PROTEIN-UDBYTTE* (kg./ha)	PROTEIN-UDBYTTE** (kg./ha)	FODERVÆRDI, SVIN (kar. 1-9)	MELDUG (%)	BRUNRUST (%)	SKOLDPLET (%)	LEJESÆD (kar. 0-10)
2022	103	104	780	810	-	-	14,0	10,0	1,8
2021	103	-	704	-	5,0	0,0	-	10,0	2,9
2020	107	-	768	-	-	-	2,7	8,0	2,0

* Landsforsøg. ** Lovbestemt værdiafprøvning.

Kilde: Sortinfo.dk.



KONTAKT DIN NÆRMESTE GROVVAREFORRETNING FOR YDERLIGERE INFORMATION

