

ECO AGROGENESIS

Fermento Activo de Organismos Fitobenéficos y Nutrientes Vegetales.

Eco-Agrogénesis® es un polvo de color oscuro, estructurado en grumos con alta humedad, en cuyo interior ocurre la fermentación de los microorganismos activos y en grandes cuentas poblacionales, permitiendo que sus productos y metabolitos secundarios estén frescos en el producto. Los microorganismos contenidos en el producto incrementan la diversidad biológica y metabólica del suelo, evitando que se establezcan relaciones nocivas entre los organismos del suelo y las plantas. Asimismo, gracias a que contiene grandes concentraciones de los organismos antagonistas de las principales plagas agrícolas, como hongos y bacterias entomopatógenos, resulta en una herramienta para el manejo sanitario del cultivo.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Humus de lombriz	25.0 %
Carbonato de calcio	25.0 %
Humato de potasio	25.0 %
Extracto de alga	15.0 %
Aminoácidos	5.0 %

Ingredientes: Revi-B Concentrado de Microorganismos (10⁹ UFC/g) de *Bacillus thuringiensis*, *B. subtilis*, *B. megaterium*, *B. licheniformis*, *Trichoderma harzianum*, *T. viridae*, *Pseudomonas fluorescens*, *Penicillium* sp., *Aspergillus oryzae*, *Beauveria bassiana*, *Saccharomyces cerevisiae* y *Paecilomyces lilacinus*.....5.0%

Contenido Neto: 1Kg

Producto hecho en México por:
Eco-Technology Solutions S.A. de C.V.
Del Rosal #723, Fraccionamiento Las Flores
C.P. 85150 Cd. Obregón, Sonora
Tel. Oficina: +52 (644) 1207093
www.ecotechnology.com.mx

RSCO:

Lote No.:

Fecha de elaboración:

Fecha de caducidad:

DUDAS Y COMENTARIOS: info@ecotechnology.com.mx

ENVASADO EN MÉXICO

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

DOSIFICACIÓN Y FORMA DE APLICACIÓN

CULTIVO	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Café	1 g por Kg de semilla 1 Kg por 200L de agua p/ 5 Ton de sust. 7 g por planta	Preparar solución y sumergir la semilla. Vivero, antes de llenar las bolsas. Aplicación foliar
Cítricos	1 Kg por Ha mensual 10 g por árbol (foliar)	Antes del periodo de floración Coincidiendo con la floración y durante el cuajado de frutos. En caso de incidencia de HLB, las aplicaciones deben de hacerse cada 15 días en las áreas afectadas y alrededor de ellas.
Brócoli, coliflor, col, lechuga, jitomate, papa, pepino, calabazas, jicamias, melón, chiles	0.5-1 Kg por ha en inyección al suelo y aplicación quincenal. 0.250-0.500 Kg por ha foliar 0.250-0.500 Kg por ha foliar	Al momento del trasplante, en caso de presión de enfermedades aplicar por semana hasta que disminuya la presión. Antes de la formación del fruto o floración. Desarrollo o cuajado del fruto.
Zanahoria, Jicama, Cebolla, Camote, Ajo	600g -1 Kg*ha-1 inyección al suelo 600g -1 Kg*ha-1 inyección al suelo	Emergencia del cultivo Durante el desarrollo
Fresa, Zarcamora, Frambuesa	1 Kg por ha en el sistema de riego 300-500 gramos por ha vía drench quincenal.	Al establecimiento de la plantación Al momento de la aparición de los primeros botones florales. Se recomienda aplicar cada 15 días para mantener sana la plantación.
Semilleros	100 gramos por paca de sustrato 1 g por charola de aplicación foliar	En el sustrato antes de la siembra 3 aplicaciones antes de el trasplante

ALMACENAMIENTO

El producto es un fermento activo, por lo que se recomienda su almacenamiento en condiciones normales de temperatura y presión. En estas condiciones, el producto se puede almacenar por 6 meses en su empaque original. Manténgase en un lugar fresco y seco.

PRECAUCIONES

No coma ni fume cuando esté manipulando el producto. Utilice las precauciones de sentido común. Manténgase fuera del alcance de niños. En caso de reacciones de tipo alérgico, suspenda el contacto con el producto y busque asistencia médica.

COMPATIBILIDAD

Para obtener el óptimo efecto del producto, se recomienda no mezclar con fungicidas o bactericidas sintéticos en su aplicación. En caso de haberse aplicado éstos respetar el intervalo de seguridad recomendado por el fabricante. Es compatible con la mayoría de los fungicidas biológicos.

INTERVALO DE SEGURIDAD O TIEMPO DE RETIRO

No es necesario días de intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha. No deja residuos por lo que no requiere dejar tiempo de retiro. Debido a sus características de producto orgánico no tóxico, no presenta repercusión negativa alguna al medio ambiente. No es nocivo para el operario, ni fauna benéfica.

ADVERTENCIAS DE TOXICIDAD

Aunque Eco-Agrogenesis® no es tóxico para el operario y los cultivos donde se aplica, se recomiendan las siguientes medidas de prevención.

- No coma, beba o fume cuando está usando el producto
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua.
- No almacene este producto junto con alimentos o bebidas.
- No tire los desechos ni los envases en arroyos, corrientes de agua o lagunas.
- En caso de contacto con la piel lávese con abundante agua y jabón.
- Este producto sólo reacciona al contacto con el agua.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión, beber inmediatamente 500 ml de leche, y lleve a la persona inmediatamente con el médico y muéstrele la etiqueta. En caso de contacto con la piel, proceder al lavado con abundante agua y jabón. Si hubo contacto con los ojos, inmediatamente lave éstos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Este producto no produce ningún daño ecológico y se puede verter en suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, mas sin embargo se recomienda tirar los empaques en depósitos de basura conforme lo establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Guardé este producto en su envase original, debidamente cerrado y etiquetado, en un almacén aislado y bajo llave. Este local debe ser seco, fresco y bien ventilado. Producto no tóxico de grado alimenticio.

GARANTÍA

Eco-Technology Solutions, S.A. DE C.V. garantiza la composición de Eco-Agrogenesis® sin embargo no se responsabiliza de los resultados del producto, ya que el manejo, transporte, almacenamiento, dosificación y aplicación de este producto están fuera de su control.