

# ABINE 1.8 C.E.

## FICHA TÉCNICA

### INSECTICIDA

#### DESCRIPCIÓN GENERAL:

**ABINE 1.8 C.E** es un insecticida translaminar que actúa por ingestión y por contacto directo para el control de minador de la hoja. **ABINE 1.8 C.E** es efectivo en todos los estados larvales de los minadores de hoja, inmoviliza las plagas poco después de la exposición. La mortalidad máxima se alcanza entre los 3 y 7 días.

#### REGISTRO SANITARIO:

RSCO-INAC-0174-312-009-002

#### CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III MODERADAMENTE TÓXICO

#### FAMILIAS QUÍMICAS:

Glucósido-lactonas macrocíclicas (producto de fermentación natural del hongo *Streptomyces avermitilis*).

#### COMPOSICIÓN:

Abamectina (avermectina) \_\_\_\_\_ (18 g de i.a./L a 20°C)

#### TIPO DE FORMULACIÓN:

Concentrado emulsionable

#### PRESENTACIONES DISPONIBLES:

1 litro

#### BENEFICIOS:

- Residualidad efectiva.
- ABINE 1.8 C.E. puede ser utilizado en el manejo integrado de plagas.
- Alta efectividad en larvas de minador.

#### MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

**ABINE 1.8 C.E.** pertenece al grupo 6 de IRAC y actúa estimulando la liberación presináptica del inhibidor neurotransmisor, ácido  $\gamma$ -aminobutírico (GABA), desde las terminales nerviosas y potenciando su fijación a los receptores postsinápticos, entre ellos el receptor glutamato. Debido a esto impide la transmisión de señales en las conexiones neuromusculares por el mismo mecanismo de amplificación de la acción del GABA, a través de un aumento de la permeabilidad de la membrana al cloro. Ocasiona la parálisis de la plaga, evitando que se alimenten, por lo que mueren a los 3-7 días de efectuado el tratamiento.

# ABINE 1.8 C.E.

## INSECTICIDA

### TABLA DE CULTIVOS, DOSIS Y RECOMENDACIONES:

CULTIVO	PLAGA	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS (L/ha)
Papa (3)	Minador de la hoja	<i>Liriomyza</i> spp.	0.3 – 1.0
Chile Bell (3)			
Jitomate (tomate) (3)			
<b>Observaciones</b>	<p>Aplique tan pronto aparezcan los adultos, sus daños o sus huevecillos. Repita al menos con intervalo de 7 días o como sea necesario, para mantener el control. Use las dosis mayores en infestaciones altas. Asegure una buena cobertura de las plantas.</p>		

**IS:** Intervalo de seguridad. Intervalo entre la última aplicación y la recolección o cosecha del cultivo.

**SL:** Sin Límite

**Tiempo de reentrada a los lugares tratados:** 24 horas

Para mayores informes en caso de intoxicación llama a **SINTOX:**

☎ Teléfono: 800 009 2800

Servicio gratuito las 24 horas del día.

**Nota:** Para aplicar el producto, siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta. Durante el manejo, preparación de la mezcla, aplicación, llenado y lavado de equipos, siempre utilice el equipo de protección de seguridad indicado en la etiqueta del producto. Para más información sobre el producto acérquese a un asesor técnico de **SIPCAM México®**.

SIPCAM México® Oficinas: Calle José Guadalupe Montenegro #1886 Int. 301 Col. Americana.  
C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco | Teléfonos: 52 (33) 3826 5706, 3826 5707 y 3826 5709

R180722

