



SIPCAM
MÉXICO

OxiCure®

Peróxido de hidrógeno + ácido peroxiacético

Fungicida / Bactericida / Concentrado soluble

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Ácido Peroxiacético (Equivalente a 67.2 g de i.a./L)	6.0
Peróxido de hidrógeno (Equivalente a 313.6 g de i.a./L)	28.0
INGREDIENTES INERTES: Reactivo, disolvente y estabilizador.	
TOTAL:	<u>66.0</u> 100.0

Registro Sanitario No.: RSCO-FUNG-0302X-0247-375-34



MORTAL SI SE INHALA

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

Advan México, S.A. de C.V.

José Guadalupe Montenegro 1886

Int. 301 Col. Americana C.P. 44160

Guadalajara, Jalisco. Tels. (33) 3826 5706, 3826 5707, 3826 5709

HECHO EN E.U.A.



PELIGRO

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

CUIDADO. CORROSIVO. No entre en lugares cerrados sin la protección respiratoria adecuada. No inhale los vapores o niebla. Evite el contacto con los ojos y la piel, puede provocar quemaduras irreversibles. Durante su uso y manejo, utilice el equipo de protección completo (gorra, guantes, googles, mascarilla, camisa de manga larga y botas). No reutilice la ropa que esté contaminada sin haberla lavado antes perfectamente. Lávese bien las manos después de usar este producto.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO ALMACENE EN CASA HABITACIÓN”.
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”.
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.
- “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica, mientras tanto, se deben aplicar los siguientes primeros auxilios: En caso de contacto con la piel, lávese perfectamente con agua y jabón; en caso de contacto con los ojos, enjuague con agua limpia por lo menos durante 15 minutos. En caso de inhalación, retire al paciente del área de contaminación, colocarlo en un lugar fresco y ventilado bajo sombra. En caso de ingestión, no provoque el vómito.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Grupo químico: Pertenece a los peróxidos.

Síntomas de Intoxicación: Puede provocar reacciones alérgicas temporales, irritación y enrojecimiento de las partes expuestas de la piel, irritación de los ojos.

Tratamiento sintomático y de sostén. Si existen reacciones alérgicas, estas pueden ser tratadas con un tratamiento de antihistamínicos o cremas (esteroides). En caso de ingestión no induzca al vómito practíquese lavado gástrico.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
- “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO”.
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE SE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.
- “ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)”.

GARANTÍA

ADVAN MÉXICO S.A. DE C.V. garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta, siempre y cuando se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. Por ningún motivo **ADVAN MÉXICO S.A DE C.V.** asume responsabilidad por el uso y manejo del producto ni por los daños que por ello se pudiesen ocasionar, toda vez que estas son operaciones que se encuentran fuera de su control.

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

INFORMACIÓN GENERAL: OxiCure® es un fungicida/bactericida recomendado como tratamiento curativo para el control de enfermedades en los cultivos que a continuación se mencionan:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	RECOMENDACIONES
Jitomate Tomate de cáscara Pimiento Chile	Mancha bacteriana (<i>Xanthomas campestris</i> <i>pv. vesicatoria</i>)	1.50 – 1.75 L/ha	Inicie las aplicaciones al follaje cuando se detecten las primeras lesiones de la enfermedad cuando el cultivo se encuentre en la etapa de frutos rayados. Realizar cuatro aplicaciones a intervalos de siete días.
Berenjena Papa (SL)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>) Pudrición agria (<i>Geotrichum sp.</i>) Antracnosis (<i>Colletotrichum sp.</i>) Pudrición blanda del tomate (<i>Erwinia carotovora</i>) (<i>Pectobacterium carotovorum</i>)	5 – 10 mL/L de agua	Realizar una aplicación a las plantas con frutos próximos a cosechar.

() Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
Tiempo de reentrada a los lugares tratados: 3 horas.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Abra con cuidado la tapa girando en sentido contrario a las manecillas del reloj cuidando de no salpicarse o inhalar el producto. Calibre el equipo de aplicación. Añada agua hasta la mitad de la capacidad del tanque del aspersor, agregue la cantidad a utilizar de OxiCure® de acuerdo con lo indicado en la etiqueta y complete con agua la totalidad del tanque. Las aplicaciones deberán efectuarse cuidando que haya un buen cubrimiento del follaje para el mejor control de la enfermedad. Utilizar un volumen de agua de 500 a 700 L/ha. Para aplicaciones terrestres utilizar aspersora de mochila con aguilón de 5 boquillas.

CONTRAINDICACIONES: No prepare más caldo de aplicación del que será aplicado en un día de trabajo; evite aplicar si existe amenaza de lluvia o vientos con velocidad superior a 8 km/hr.

INCOMPATIBILIDAD: No se debe mezclar con otros productos.

MANEJO DE RESISTENCIA: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DETOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.