Veterinärvårdsskolan

Del 3

Christine Törnqvist jobbar som leg. djursjukskötare sedan 2007. Hon har arbetat på flera av Nordens största djursjukhus med bland annat akut- och intensivvård och anestesi samt hållit i vidareutbildningar.

Nu har vi fått förmånen att ta del av Christines kunskaper i KP och vi ser fram emot en artikelserie. Har ni önskemål om ämnen inom djursjukvård så maila din önskan till: *kinesposten@ccclub.se*

Hej mitt vinterland… Nu är vintern här i vårt avlånga land och i detta nummer ska vi ta upp saker som kan vara bra att veta som hundägare. Jag börjar med ett ämne som vi kinesägare är extra utsatta för, framförallt våra nakna vänner.

Köldskador

Ofta drabbas extremiteter som tassar, öron, svans och pungen hos hanhundar snabbare än resterande delar av kroppen. Att använda kläder till våra nakna är nog de flesta insatta i. Men att tänka på är att använda kläder som skyddar just dessa extremiteter. Det finns fabrikat som anpassar könsskillnader på kläder - hela magar för tikar och pungskydd för hanar. Små, unga, gamla eller nedsatta individer är extra känsliga för kyla.

Det som händer vid köldskador är liknande brännskador. I hudcellerna så finns det vatten som vid kyla bildar iskristaller och som förstör vävnadsstrukturen. Detta leder till vävnadsdöd. Första tecknet på köldskador är kall och vitaktig hud som ibland får blåsor. Efter en tid ändrar huden istället färg till blå/svart vilket tyder på att vävnaden inte längre är kärlförsörjd och dör.

Förfrysningsskada på öra hos naken CCD, vävnadsdöd och under läkningsprocess

Skor är det bästa skyddet för att förebygga kalla små tassar. Förutom kylan så bör man även tänka på vägsalt, halka, snö och väta samt kloskador.

Klibbsnö kan förutom att ge frostskador och obehag, skapa fukt mellan trampdynorna. Lägg på lite vägsalt som torkar ut och irriterar trampdynor och huden som därmed blir mindre motståndskraftig. Detta brukar leda till att hunden slickar på sina tassar, vilket i sin tur leder till att en varm och fuktig miljö bildas. En perfekt miljö för bakterier och svamp.

Detta undviks bäst genom skor utomhus, eller att ordentligt torka hundens tassar efter promenaden. Mot vägsalt kan även tassalva användas.

Under vintern så sliter i regel inte hunden sina klor lika effektivt som under sommarhalvåret, så håll koll på kloväxten så inte klobrott sker, glöm inte sporren! Passa även på att se om hunden sliter sina klor ojämnt eller snett. Snedslitning beror ofta på en ojämn belastning som beror på smärta.

Förgiftningar

Under vinter och jul är det många faror som lurar för våra sällskapsdjur. Nedan följer exempel på olika förgiftningar.

Generella förgiftningssymptom är kräkningar, kramper, vinglighet. Skulle ditt djur visa dessa symptom så är det av högsta vikt att kontakta en veterinär.

Glykol

Vi har glykol i våra bilars kylsystem, något som smakar väldigt sött och gott. Se till att ditt djur aldrig riskerar att få i sig glykol från en läckande bil. Detta är mycket giftigt och skapar akut njurinsufficiens och leder ofta till döden.

Choklad

I kakao finns det ett ämne som heter teobromin som är giftigt för hundar. Mängden teobromin varierar i hur ljus eller mörk chokladen är, dvs kakaohalten. Teobrominet påverkar nervsystemet, cirkulationen (hjärtat) och så småningom andningsvägarna.

Förgiftningssymptom uppkommer redan i dosen 20 mg teobromin/kg kroppsvikt och dödlig dos är 100-200 mg/kg kroppsvikt. Symptomen uppkommer oftast mellan 4-24 timmar efter intaget.

Vit choklad innehåller ingen kakao och är ofarligt. Men kan ändå ge mag- och tarmproblematik. Har din hund fått i sig choklad kan man inom 1-3 timmar ge kräkmedel hos veterinären. Det rekommenderas INTE att försöka framkalla kräkning hemma då det ofta leder till annan förgiftning.

Hur många gram choklad kan hunden klara utan att bli allvarligt sjuk?

Exempel för en hund som väger 10 kg:

Mörk choklad innehåller ca 5-15 mg teobromin per gram choklad. En hund i denna viktklass kan äta 12-40 g mörk choklad utan att få så allvarliga symtom att veterinär behöver uppsökas. OBS! Ju mörkare choklad desto mer kakao (och teobromin) och därmed större förgiftningsrisk.

Ljus choklad innehåller ca 2 mg teobromin per gram choklad. Har hunden i stället ätit ljus choklad kan den klara upp till ca 100 g.

Vit choklad innehåller ingen eller mycket lite teobromin.

Praliner, chokladbitar med fyllning, innehåller mindre choklad. Hunden kan då kanske klara att äta ungefär dubbelt så stor mängd utan att allvarliga symtom uppkommer.

Källa: SLU Universitetsdjursjukhuset

Bulldeg

Deg som innehåller jäst kommer vid förtäring att jäsa i magen och skapa en alkoholpåverkan. Det förekommer att alkoholhalten i blodet uppnår flera promille! Hunden blir berusad och blir vinglig, illamående och kan bli aggressiv. Uppsök din veterinär som kan behandla hundens symptom.

Liljor och växter

Omkring jul utsmyckas ofta våra hem med julstjärnor, hyacinter och amaryllis. Samtliga av dessa växter är olämpliga för våra hundar och kan ge njurpåverkan. Mest känsliga är dock katter för dessa växter, men även våra hundar kan påverkas.

Russin

Vindruvor, både torkade och färska, är luriga. Toleransnivån är individuell och det kan räcka med ett endaste russin för att uppnå toxisk påverkan. Symptomen är kräkningar, diarré, buksmärtor och slöhet uppkommer ofta inom 6 timmar. Njurpåverkan är inte ovanligt och märks framförallt genom att hunden kissar mindre. Detta är ett livshotande tillstånd och det har rapporterats dödsfall efter intag av endast 4 russin.

Lök

Alla olika sorter utav lök, både rå och tillagad, är giftigt för hundar. Skador på inre organ och blodbrist är de vanligaste effekterna efter en lökförgiftning och kan uppmärksammas i form av diarré, kräkningar, bleka slemhinnor, buksmärta, ökad andning, hjärtklappning och rödfärgad urin. Hos veterinären behöver man oftast skriva in hunden för dropp, övervakning och även blodtransfusion kan bli aktuellt.

Nötter

De flesta nötter är inte giftiga för hundar, men kan fasta i halsen och skapa andnöd. Dock är macadamianötter giftiga och skall absolut hållas ifrån hundar! Bittermandel är visserligen inte en nöt, men är giftig om den tuggas sönder. Det frisätts då cyanväte som kan skapa förlamning i andningsvägarna och därmed andnöd.

Talgbollar

Dessa innehåller till största del fett som ofta kan skapa bukspottkörtelinflammation, detta gäller vid samtligt intag av fettrik mat. Även nätet som omger talgbollen kan fastna i tarmen och skapa stopp och skärskador.

Revbensspjäll

Idag är det vanligt att mata hundar med ben och rått kött. När benen är tillagade blir de dock väldigt vassa och kan skada tarmen. Förutom detta kan det skapa svåra förstoppningar, ibland till och med så det behövs en operation för att få loss stoppet.

Främmande föremål

Generella symptom på att hunden ätit något som fastnat i mag-tarmkanalen är främst kräkningar och nedsatt allmäntillstånd men även diarré och förstoppning.

Om man som hundägare vet att hunden ätit något kan man inom loppet av ett par timmar ofta besöka veterinären som då ger ett kräkmedel så hunden kräks upp det igen. Har det dock gått längre tid så att det troligen redan passerat ut i tarmen eller om föremålet anses olämpligt att kräkas upp (med risk att skada den känsliga matstrupen) så får man hoppas på det bästa och att det passerar igenom.

Julpynt...

...finns i många former och kan se väldigt roliga ut för hundar att leka med. Slinker de ner i magen kan det dock ställa till det ordentligt. Se till att hålla små föremål som kan sväljas (inklusive de i julgranen) högt upp och utom räckhåll.

Presentsnören...

...är också en vanlig anledning till att hundar hamnar på operationsbordet. När ett djur äter någon form av snöre så är det inte bara ett stopp i tarmen som kan ske, utan att tarmen trär upp sig på snöret och får nedsatt blodförsörjning.

Vassa föremål...

...bör absolut inte försöka kräkas upp, utan skulle hunden ha fått i sig något vasst så rekommenderar man att ge sparris. Sparrisen trådar upp sig i magsäcken och lindar förhoppningsvis in det vassa som då kan passera tarmen. Ett starkt tips är att alltid ha en konservburk med sparris i skafferiet!

Nyårsafton

Ett mycket debatterat ämne bland djurvänner är alla smällare och fyrverkerier som skrämmer tusentals djur varje år. Många skotträdda djur tvingas spendera timmar, rent av dagar, i skräck.

Jag vill här delge mig av mina tips för att förhindra att olyckor händer i samband med nyårsafton.

Spendera nyår på avskild plats. I närheten av flygplatser är det förbud mot fyrverkerier och det finns ofta hotell som man kan bo i för att undvika smällar. Undvik att infinna dig centralt i städer där det både låter mycket och ger stora ljussken.

Rasta hunden ordentligt tidigt på dagen så du behöver gå ut så lite som möjligt under kvällen.

Rasta även ***alltid, alltid, alltid*** hundar i rymningssäkra koppel! Även den mest skottsäkra hunden kan bli överraskad och rädd och därmed fly. En hund i flykt är mycket svårfångad, i kombination med kallt väder och som hos vår ras ofta köldkänsliga hundar kan det sluta mycket olyckligt! Tänk även på att det ofta smäller flera dagar innan självaste nyårsafton.

I svåra fall av skotträdsla kan du i god tid innan nyårsafton besöka din veterinär som kan skriva ut lugnande medel till hunden. Var inte ute i sista sekunden med detta!

Receptfria alternativ finns också i form av feromonpreparat, mjölkenzymer, tighta tröjor (”thunder shirts”) med mera som verkar lugnande. Testa gärna dessa alternativ i första hand innan ditt besök till veterinären.

God Jul och Gott Nytt År önskar jag er alla