

Cette paroi a été créée dans le but de favoriser l'installation et la nidification des hirondelles de rivage et du martin-pêcheur. Ces deux espèces (ainsi que le guêpier, rarissime !) sont les seuls oiseaux européens à nicher dans des berges de sable. Ces oiseaux creusent chaque printemps, avec bec et pattes, une nouvelle galerie de 40 à 120 cm au fond de laquelle ils pondent leurs œufs et élèvent leurs jeunes.

Les berges naturelles et sableuses sont devenues des biotopes très rares dans notre région (urbanisation, reprofilage des berges et cours d'eau, bétonnage...). Ce modèle de paroi – une combinaison de bois certifié FSC et de sable - a fait ses preuves aux Pays-Bas.




Deze broedwand werd gebouwd om de Oeverzwaluw en de IJsvogel een nieuwe broedmogelijkheid te bieden in het Brussels Gewest. Samen met de in onze streken zeldzame Bijeneter, zijn het de enige Europese soorten die broeden in zandige oevers. Elk voorjaar wordt een nieuwe nestgang gegraven van 40 tot 120 cm diepte waarin de eieren worden afgelegd en uitgebroed.

Natuurlijke, zandige oevers en zandgroeves zijn als broedhabitat verdwenen in het Brussels Gewest (door toenemende verstedelijking, heraanleg van oevers of overwelving van waterlopen,...). Dit type van broedwand – een combinatie van duurzaam (FSC-gelabeld) hout en zand – werd overgenomen uit Nederland waar reeds positieve resultaten werden bekomen.

L'hirondelle de rivage, oiseau insectivore migrateur africain, ne niche plus à Bruxelles depuis 1979 même si chaque année, cette espèce est observée au printemps dans la vallée de la Woluwe.

Espèce en régression, elle niche en colonies non loin de Bruxelles (Zemst, Mont-Saint-Guibert...). Faute de biotope naturel, cet oiseau s'installe souvent dans les carrières de sable en activité.



De **Oeverzwaluw** is insectivoor en overwintert in Afrika. Is als broedvogel uitgestorven in het Brussels Gewest sinds 1979. Jaarlijks wordt de soort als trekvogel waargenomen in de Woluwevallei. De dichtst bijzijnde broedkolonies zijn niet zo ver gesitueerd van het Brussels Gewest, namelijk in Zemst en Mont-Saint-Guibert. Bij gebrek aan natuurlijk broedbiotoop worden soms kolonies aangetroffen in zandgroeves.



Le **martin-pêcheur**, oiseau piscivore sédentaire, est présent toute l'année aux étangs de Boitsfort et niche au Rouge-Cloître (Auderghem).

De **IJsvogel** is een visetende standvogel die jaarrond kan worden waargenomen op de Bosvoordevijver. Broedt langsheen de vijvers van het Rood Klooster (Oudergem).

Le **Guêpier d'Europe**, Nicheur méridional, s'installe dans nos régions (à cause du réchauffement climatique ?).

De **Bijeneter** is een hoofdzakelijk mediterrane broedvogel die overwintert in Afrika. Sinds enkele jaren occasionele broedvogel in België.

