

Lommekort

På næste side finder du forside og bagside til lommekort til de af afdelingens læger der skal kunne screene og inkludere patienter i EMPRESS. Der er 2 forside bokse (hvide) og 2 bagside bokse (røde).

Sådan gør du:

1. Print siderne 2 - 3 som: *'Udskriv på begge sider- vend siderne om den lange side'*
2. Klip papir ud
3. Laminer lommekortene
4. Klip evt. lamineringsarkene ud

Screening

- ✓ Mindst 18 år **OG**
- ✓ Sepsis eller septisk shock **OG**
- ✓ Kritisk syg: opfylder mindst ét af nedenstående:
 - Invasiv mekanisk ventileret **ELLER**
 - Non-invasiv ventileret **ELLER**
 - Kontinuerlig anvendelse af CPAP **ELLER**
 - Ilt-supplement med flow ≥ 10 L/min **ELLER**
 - Kontinuerlig infusion af vasopressor eller inotropikum **OG**
- ✓ Klinisk indikation for empirisk behandling med meropenem eller piperacillin/tazobactam

For at screene



app.easyrf.dk

EMPRESS hotline:
+45 3545 0606

Praktisk info ved inklusion

1. Informér det kliniske personale om randomiseringen
2. Opret inklusionsnotat i journalen
3. Opdatér intensivresuméet
4. Opret ordination på forsøgsmedicin
5. Informér snarest forsøgsværge og pårørende mhp. samtykke til fortsat deltagelse

Mere information findes på:
www.cric.nu/empres



EMPRESS hotline:
+45 3545 0606

VEND

Screening

- ✓ Mindst 18 år **OG**
- ✓ Sepsis eller septisk shock **OG**
- ✓ Kritisk syg: opfylder mindst ét af nedenstående:
 - Invasiv mekanisk ventileret **ELLER**
 - Non-invasiv ventileret **ELLER**
 - Kontinuerlig anvendelse af CPAP **ELLER**
 - Ilt-supplement med flow ≥ 10 L/min **ELLER**
 - Kontinuerlig infusion af vasopressor eller inotropikum **OG**
- ✓ Klinisk indikation for empirisk behandling med meropenem eller piperacillin/tazobactam

For at screene



app.easyrf.dk

EMPRESS hotline:
+45 3545 0606

Praktisk info ved inklusion

6. Informér det kliniske personale om randomiseringen
7. Opret inklusionsnotat i journalen
8. Opdatér intensivresuméet
9. Opret ordination på forsøgsmedicin
10. Informér snarest forsøgsværge og pårørende mhp. samtykke til fortsat deltagelse

Mere information findes på:
www.cric.nu/empres



EMPRESS hotline:
+45 3545 0606

VEND

Meropenem

Intermitterende dosis

1 g IV x 3 dgl. i op til 30 dage eller indtil:

- Skift til andet smalspektret antibiotikum **ELLER**
- Udskrivelse **ELLER**
- Død

Infusion

- Forlænget eller kontinuerlig infusion er tilladt per lokal instruks

Dosisjustering

Nyrefunktion	Dosis og interval
eGFR 10–30 mL/min	1 g x 2 dgl.
eGFR < 10 mL/min	1 g x 1 dgl.
CRRT	1 g x 2 dgl.
Hæmodialyse	1 g x 1 dgl. Ekstra dosis efter hæmodialyse

EMPRESS hotline:
+45 3545 0606

Piperacillin/tazobactam

Intermitterende dosis

4/0,5 g IV x 4 dgl. i op til 30 dage eller indtil:

- Skift til andet smalspektret antibiotikum **ELLER**
- Udskrivelse **ELLER**
- Død

Infusion

- Forlænget eller kontinuerlig infusion er tilladt per lokal instruks

Dosisjustering

Nyrefunktion	Dosis og interval
eGFR 10–30 mL/min	4/0,5 g x 3 dgl.
eGFR < 10 mL/min	4/0,5 g x 2 dgl.
CRRT	4/0,5 g x 3 dgl.
Hæmodialyse	4/0,5 g x 2 dgl. Ekstra dosis efter hæmodialyse

EMPRESS hotline:
+45 3545 0606

VEND

Meropenem

Intermitterende dosis

1 g IV x 3 dgl. i op til 30 dage eller indtil:

- Skift til andet smalspektret antibiotikum **ELLER**
- Udskrivelse **ELLER**
- Død

Infusion

- Forlænget eller kontinuerlig infusion er tilladt per lokal instruks

Dosisjustering

Nyrefunktion	Dosis og interval
eGFR 10–30 mL/min	1 g x 2 dgl.
eGFR < 10 mL/min	1 g x 1 dgl.
CRRT	1 g x 2 dgl.
Hæmodialyse	1 g x 1 dgl. Ekstra dosis efter hæmodialyse

EMPRESS hotline:
+45 3545 0606

Piperacillin/tazobactam

Intermitterende dosis

4/0,5 g IV x 4 dgl. i op til 30 dage eller indtil:

- Skift til andet smalspektret antibiotikum **ELLER**
- Udskrivelse **ELLER**
- Død

Infusion

- Forlænget eller kontinuerlig infusion er tilladt per lokal instruks

Dosisjustering

Nyrefunktion	Dosis og interval
eGFR 10–30 mL/min	4/0,5 g x 3 dgl.
eGFR < 10 mL/min	4/0,5 g x 2 dgl.
CRRT	4/0,5 g x 3 dgl.
Hæmodialyse	4/0,5 g x 2 dgl. Ekstra dosis efter hæmodialyse

EMPRESS hotline:
+45 3545 0606

VEND