



Första hjälpen för din hund

Om olyckan är framme gäller det att agera snabbt och rätt. Möjligheten att ge första hjälpen till ditt djur i nödläge kan både rädda liv och förebygga lidande.

Vid transport till veterinär vid livshotande tillstånd:

Se till att djuret får behålla värmen då djur i chock snabbt tappar kroppstemperatur. För bästa förberedelser, ring och meddela att ni är på väg.

Telefonnummer: Dille Veterinärklinik 063-38100

Jourhavande veterinär: Östersunds Djursjukhus 063-134000

Normalparametrar för hund

- **Kroppstemperatur:** 38,0-39,0°C . Tempen tas med en termometer i ändtarmen.
- **Andning:** Ca 10-30 andetag/min i vila.
- **Puls:** Ca 60-120 slag/min.
- **Slemhinnor:** Rosa i färgen.

Hjärtlungräddning för hund över 5kg

1. Lagg hunden på höger sida.
2. Kontrollera att hunden har fria luftvägar och rak nacke.
3. Knäböj nära hundens rygg och placera händerna på bröstkorgens nedre del (där hundens vänstra armbåge vidrör bröstet).
4. Tryck ca 30 gånger i takt med låten "Staying Alive". Tryck ner en tredjedel till hälften av bröstkorgens omfång.
5. Gör två inblåsningar i hundens nos, blås in luft så att bröstkorgen reser sig. Tänk på att inte blåsa för hårt på små djur.
6. Upprepa kompressioner och inblåsningar tills andning och cirkulation fungerar.



Blödning

1. Lagg bandage med en hårt rullad kompress eller liknande mot såret och tryck tills blödningen upphör. Se till att förbandet sitter åt så att blödningen stoppas. Lätta tillfälligt på förbandet var 30:e minut för att inte strypa blodtillförseln i området helt.
2. Om blödningen fortsätter, förstärk bandaget.
3. Håll den skadade kroppsdelen i högläge, om det är möjligt.

Trafikolycka

1. Gör hjärt-lungräddning om hunden inte andas och saknar puls.
2. Lagg tryckförband på blödande sår.
3. Håll hunden varm med filter.
4. Flytta hunden försiktigt, gärna med bår, för omedelbar transport till veterinär.

Värmeslag

Det bästa sättet att undvika värmeslag är att alltid låta hunden ha tillgång till frisk luft, vatten och skugga. Obs! Lämna aldrig hunden inlåst i en bil eller annat trångt utrymme på sommaren utan uppsikt.


Symtom på värmeslag: Hunden flämtar och har mörkrött tandkött. Ökad puls och andningssvårigheter. Oro, förvirring, kramper, kräkningar, diarré, förhöjd kroppstemperatur och medvetlöshet.

Åtgärd:

1. Flytta hunden till ett svalt, skuggigt område.
2. Kyl ner hunden med svala blöta handdukar på främst öron, tassar och ljumske.
3. Stoppa nedkylningen och torka hunden när kroppstemperaturen når 39°C.
4. Försök få hunden att dricka.
5. Transportera hunden till veterinär

Tassbandage

1. Tvätta tassan och lagg en steril kompress närmast såret.
2. Lagg bomullssträngar mellan tårna för undvika irritation i huden.
3. Lagg ett lager bomull runt hela tassan upp till och över handloven.
4. Avsluta med ett skyddande lager självhäftande bandage (ex vet wrap), linda aldrig för hårt för att undvika stasning.
5. Sätt på en tassocka för att skydda mot smuts och väta.



Magomvridning

Livshotande tillstånd. Åk genast till veterinären.

Symtom på magomvridning: Oro, försöker kräkas men inget kommer upp, svag och snabb puls, svullen buk, andningssvårigheter, chock.

Symtom: Bitmärken, kraftig svullnad, smärta, slöhet.

Åtgärd: Håll hunden stilla, försök lugna hunden. Bär eller transportera hunden på bår till bil för omedelbar transport till veterinär.

Jaktödem

Jaktödem innebär vätskeutträde i lungorna under eller strax efter jakt.

Det kan ge allvarlig andningspåverkan och i värsta fall leda till att hunden dör.

Jaktödem förekommer framför allt hos drivande hundar som skäller mycket.

Symtom på jaktödem:

1. Hunden verkar onormalt andfådd och medtagen under eller efter jakt och vill helst stå eller sitta.
2. Hunden andas med bukpress och ibland sträckt hals.

Åtgärd: Försök hålla hunden så lugn som möjligt. Kontakta genast veterinär för vidare råd.