

Abyssinier og Somali og Avlsrådets racespecifikke avlsanbefalinger for Abyssinier og Somali

	Lidelse	Avlsanbefaling
Generelt		
Krop	<p>PK-Def (Pyroovate Kinase Deficiency)</p> <p>Arvelig form for anæmi, dvs. en sygdom i blodet. Symptomerne kan variere en del, men oftest ses træthed og vægttab som følge af manglende appetit. Nedstemthed, blege slimhinder og evt. forstørrelse af bughulen (idet milten i enkelte tilfælde forstørres).</p> <p>Ofte opdages sygdommen først, når katten når en vis alder (+8 år), medmindre der er tale om et mere aggressivt forløb. Lidelsen nedarves autosomt recessivt, hvilket betyder: - Hvis begge forældre har sygdommen, vil alle afkom få den.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis begge forældre har sygdommen, vil alle afkom få den. • Hvis begge forældre bære sygdommen, men ikke er syge, vil 25% af afkommet få PK-Def, 50% vil være bærere, og 25% vil være fri. 	<p>Avlsrådet anbefaler:</p> <p>Der ses idag kun få katte i racen med PK-Def, men bærer findes stadig.</p> <ul style="list-style-type: none"> • At der aldrig avles bærer til bærer. • At alle avlskatte DNA-testes for PK-Def hos Langford eller UC Davis.

	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis den ene forældre bærer genet, og den anden er fri, vil 50% af afkommet være bærere, og 50% vil være fri. <p>Klinisk ser man derfor følgende kombinationer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Katte som har PK-Def og er klinisk syge. • Katte som er klinisk raske, men er bærere. • Katte som er klinisk raske, og som ikke bærer genet. 	
Hud		
Ben		
Øjne		
Mund		