

PATIENTINFORMATION OM KEGLESNIT (KONISATIO) MED ELSLYNGE

Baggrund: Livmoderhalsen og livmodermunden sidder nederst på livmoderen og kan ses gennem skeden. Du kan risikere at få betændelse eller celleforandringer der. Det kan man undersøge ved hjælp af en celleprøve (smear) og vævsprøver.

Hvis det drejer sig om moderate eller svære celleforandringer eller kræftforstadier kan man fjerne en ”kegle” fra den nederste del af livmoderhalsen.

Operation: Det foretages ambulantly i lokalbedøvelse. Keglen skæres ud med en elektrisk slynge og sendes til mikroskopisk undersøgelse.

Hvis der har været en blødning under operationen, skal du spise Tabl. Cyklonova 1 gram 3 gange dagligt i ca. 1-3 dage.

Komplikationer: Af og til (i knapt 10 % af indgrebene) sker der en efterblødning, som plejer at finde sted enten kort efter operationen eller på ca. 10. dagen. Mindre blødninger kan man behandle med en ”meche” (en slags gazestrimmel, som du selv skal fjerne derhjemme). Nogle gange må man elektro-koagulere (brænde) det blødende område.

Der er en lille risiko for, at du kan føde for tidligt i kommende graviditet.

Efterforløbet: I de første 14 dage efter indgrebet vil der ofte være brunligt udflåd. Kar- og havbad, samleje, brug af tamponer samt tunge løft skal undgås i denne periode.

Vævet bliver sendt til undersøgelse hos patologerne og du skal HUSKE selv at ringe for svar 14 dage efter indgrebet.

Du skal komme til kontrol med celleprøve ca. 6 måneder efter indgrebet. Også her skal du HUSKE at ringe 14 dage senere og få svaret.

Vi anbefaler, at du bliver vaccineret med HPV vaccine mod livmoderhalskræft.

Læs mere om celleforandringer og livmoderhalskræft

Du kan læse meget mere om sygdommen, symptomer og behandlingsmetoder hos Kræftens Bekæmpelse <https://www.cancer.dk/livmoderhalskraeft-collumcancer/>

Rev.PC, 7/2023 revideres 7/2026

www.gynaekolog.dk

E mail: kontakt@gynaekolog.dk

Brug gerne lægevejen mhp. kontakt til os.

[Tel:48176250](tel:48176250)