

Intelligenzstörungen

Leichte Intelligenzminderung

Mittelgradige Intelligenzminderung

Schwere Intelligenzminderung

Schwerste Intelligenzminderung

Dissoziierte Intelligenz

Entwicklungsstörungen

Artikulationsstörung

Lallen

Expressive Sprachstörung

Dysphasie

Aphasie

Rezeptive Sprachstörung

AVWS

Landau-Kleffner-Syndrom

Lispeln

LRS

Frühkindlicher Autismus

Atypischer Autismus

Rettsyndrom

Asperger-Syndrom

ADHS

Elektiver Mutismus

Tic

Tourette Syndrom

Primäre Enuresis

Sekundäre Enuresis

Enuresis nocturna

Enkopresis

Pica im Kindesalter

Stottern

Poltern

Nägelkauen

ADS

Downsyndrom

Prävention, präventiv

Legasthenie

Pavor nocturnus

Toilettentraining

Neurasthenie

Ritalin (Wirkstoff Methylphenidat)

Flooding

Oligophrenie

X-chromosomal

Intelligenzstörungen

ICD 10 F7

Leichte Intelligenzminderung

IQ 50-69 (Intelligenz eines 9-12 jährigen Kindes), Deбилität

Mittelgradige Intelligenzminderung

IQ 35-49 (Intelligenz eines 6-9 jährigen Kindes)

Schwere Intelligenzminderung

IQ 20-34 (Intelligenz eines 3-6 jährigen Kindes)

Schwerste Intelligenzminderung

IQ < 20 (Intelligenz eines < 3 jährigen Kindes)

Dissoziierte Intelligenz

Deutlicher Unterschied zwischen Sprache und Handlung, > 15 IQ-Punkte

Entwicklungsstörungen

ICD 10 F8

Artikulationsstörung

Sprachentwicklung unter der geistigen Entwicklung, = Entwicklungsstörungen = ICD 10 F8

Lallen

Artikulationsstörung =  
Entwicklungsstörungen = ICD 10 F8

Expressive Sprachstörung

= Entwicklungsstörungen des Sprechens  
und der Sprache = ICD 10 F8

Dysphasie

= Entwicklungsstörungen des Sprechens  
und der Sprache = ICD 10 F8 = Sprache nicht  
flüssig

Aphasie

= Entwicklungsstörungen des Sprechens  
und der Sprache = ICD 10 F8 = sprachlos

Rezeptive Sprachstörung

= Entwicklungsstörungen des Sprechens  
und der Sprache = ICD 10 F8 = Störung der  
Wort-Laut-Produktion

AVWS

Auditive Verarbeitungs- und  
Wahrnehmungsstörung, = Rezeptive  
Sprachstörung = Entwicklungsstörungen des  
Sprechens und der Sprache = ICD 10 F8

Landau-Kleffner-Syndrom

Erworbene Aphasie mit Epilepsie =  
Entwicklungsstörungen des Sprechens und  
der Sprache = ICD 10 F8

Lispeln

Entwicklungsstörungen des Sprechens und  
der Sprache = ICD 10 F8

LRS	Lese-Rechtschreib-Störung = Entwicklungsstörungen der schulischen Fertigkeiten = ICD 10 F8
Frühkindlicher Autismus	vor 3 LJ. = tiefgreifende Entwicklungsstörungen = ICD 10 F8
Atypischer Autismus	Nach 3. LJ. = tiefgreifende Entwicklungsstörungen = ICD 10 F8
Rettsyndrom	= tiefgreifende Entwicklungsstörungen = ICD 10 F8, nur Mädchen, Verlust der Sprache
Asperger-Syndrom	= tiefgreifende Entwicklungsstörungen = ICD 10 F8, wie beim frühkindlichen Autismus, Kognition, Sprache etc. o.B.
ADHS	Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit Hyperaktivität = Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend = ICD 10 F9
Elektiver Mutismus	Selektives Sprechen, = Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend = ICD 10 F9
Tic	= ICD 10 F9, unwillkürliche, rasche, wiederholende, nicht rhythmische Bewegung oder Lautproduktion, nicht beeinflussbar, aber manchmal unterdrückbar über bestimmte Zeitabschnitte

Tourette Syndrom	= ICD 10 F9, multiple motorischen und vokale Tics in Kombination
Primäre Enuresis	ICD 10 F9, Einnässen auch nach dem 5. LJ.
Sekundäre Enuresis	ICD 10 F9, plötzliches Wiedereinnässen
Enuresis nocturna	ICD 10 F9, nächtliches Einnässen auch nach dem 7. LJ.
Enkopresis	ICD 10 F9, unwillkürliches Koten
Pica im Kindesalter	ICD 10 F9, Verzehr von nicht essbaren Stoffen
Stottern	ICD 10 F9, zögern und innehalten beim Sprechen
Poltern	ICD 10 F9, zu hohe Sprechgeschwindigkeit, sich beim Sprechen überschlagen

Nägelkauen	ICD 10 F9
ADS	Aufmerksamkeitsdefizitstörung ohne Hyperaktivität, ICD 10 F9
Downsyndrom	Chromosom 21 liegt 3 mal vor, genetische Erkrankung
Prävention, präventiv	Vorbeugend
Legasthenie	Lese-Rechtschreibschwäche
Pavor nocturnus	ICD 10 F5, Nachtschreck
Toilettentraining	Verhaltenstherapie zum Erlernen der Blasenkontrolle
Neurasthenie	ICD 10 F48, erschöpft sein, sich krank fühlen, über Krankheiten nachdenken ...

Ritalin (Wirkstoff Methylphenidat)

Medikament bei ADHS

Flooding

Verhaltenstherapie bei Phobien,  
Reizüberflutung

Oligophrenie

Schwachsinn

X-chromosomal

Ein genetischer Defekt liegt auf dem X-  
Chromosom, Frauen UND Männer besitzen  
in jeder Körperzelle ein X-Chromosom