



1



2



3



4

5



# De reeën in het Drongengoed: goed bestudeerd

**Sinds enkele jaren bestuderen Rudi Baetslé, Hugo De Bruyker en Paul Simoens de reeënpopulatie in het Drongengoed. Ze documenteren hun waarnemingen met talrijke foto- en filmopnamen en laten je op deze bladzijden mee genieten van hun bevindingen.**

In het Meetjesland heb je steeds vaker de kans om reeën te zien of om hun blaffende alarmroep te horen, want zoals overal in Vlaanderen is ook hier het reeënbestand sinds enkele jaren sterk toegenomen. Vooral tijdens vroege ochtendwandelingen, maar ook bij valavond of zelfs overdag kan je dit elegante wild waarnemen langs bosranden of in het open veld.

## Over hartvormige spiegels

Meestal zie je slechts één of een paar reeën, want in tegenstelling tot dam- en edelherten zijn reeën territoriaal en vormen zij geen grote roedels. Alleen in de winter leven enkele aanverwante reegeiten en hun kalveren, soms met één of meer bokken, in kleine groepjes bijeen, de zogenaamde wintersprongen.

Hun warme wintervacht is dan grijs gekleurd, met op het achterwerk een opvallende, helderwitte haarvlek, de spiegel, die bij alarm of stress wijd opengespreid kan worden. Bij de bokken is de spiegel boonvormig, maar bij de geiten loopt die uit in een bosje lange witte haren en lijkt daardoor hartvormig. Bokken hebben dan weer onderaan de buik een penseel, gevormd door de lange haren op de voorhuid.

## Het ene gewei is het andere niet

Het meest opvallende kenmerk van de reebokken is echter hun gewei, dat bestaat uit twee benige voorhoofdsstangen die elk najaar (vanaf oktober) afgeworpen worden en tijdens de winter opnieuw worden gevormd. Daarbij zijn de groeiende geweien omgeven door een dichtbehaarde, fluweelachtige basthuid.

1. Blaffende reegeit in voorjaarsrui (foto: Paul Simoens)
2. Bokken met bastgeweien (foto: Rudi Baetslé)
3. Wintersprong (foto: Paul Simoens)
4. Volwassen reegeit in voorjaarsrui die pas geworpen heeft (foto: Rudi Baetslé)
5. Knopbokje (foto: Hugo De Bruyker)
6. Gaffelbokje (foto: Paul Simoens)
7. Zwarte reegeit (foto: Rudi Baetslé)



Jonge bokken hebben vaak een kort knopgewei, een iets langer onvertakt spiesgewei of een aan de uiteinden opgesplitst gaffelgewei. Gezonde volwassen bokken worden zeesenders genoemd, omdat hun maximaal ontwikkeld gewei bestaat uit twee beparelde geweistangen die eindigen op een spitse stangpunt en elk een voortak en een achtertak dragen.

### De lente, nieuw leven

Vanaf maart vallen de wintersprongen uiteen. Terwijl de drachtige geiten nog even met hun kalveren samenblijven, verlaten de bokken de groep om hun territoria af te bakenen. Door hun bastgewei tegen takken te schuren wordt de bast geveegd en worden ook geurstoffen van de voorhoofdsklieren achtergelaten.

Soms gaan naburige bokken met elkaar strijden voor hun territoria. Dit gebeurt door dreigen, heftig met de voorpoten ('voorlopers') op de grond te krabben en met de geweien tegen elkaar te slaan.

In april begint de voorjaarsrui, eerst bij de jonge en dan bij de oudere reeën. Daarbij worden de lange winterharen vervangen door een kortharige, rode zomerdos. Sporadisch kan men echter ook een zwarte ree aantreffen.

Vanaf mei en tot in juni worden de jonge reeën geboren, meestal twee per worp. De pasgeboren jongen worden kitsen genoemd en hebben een roodbruine vacht met een wit vlekkenpatroon. Zij worden enkele malen per dag door de moeder gezoogd, maar liggen het grootste gedeelte van de tijd achtergelaten in de dekking.

### Pubers

Na enkele maanden verdwijnen de witte vachtvlekken en spreekt men van reekalfjes tot ze een jaar oud zijn. Daarna worden zij tot aan hun tweede levensjaar, wanneer zij volwassen zijn, aangeduid als jaarlingbokken (mannelijk) en smalreeën (vrouwelijk).

Deze laatste blijven soms nog een tijdje bij de moederdieren, maar de jaarlingbokken worden meestal verjaagd en zoeken eigen territoria op.

### Een bijzondere dracht

In volle zomer, van half juli tot halverwege augustus, vindt de paartijd plaats: de zogenaamde bronstperiode. De bevruchte eicellen ontwikkelen zich echter niet onmiddellijk maar pas eind december: na een kiemrust van ruim vier maanden komt het embryo tot ontwikkeling. Het duurt dan nog een vijftal maanden vooraleer de kalfjes op het einde van de lente geboren worden.

### Wintervacht

In september treedt de najaarsrui op en wordt het korte, rode zomerhaar weer gewisseld voor een warme, grijze winterdos. Ondertussen groeperen de reeën zich opnieuw tot sprongen om op die manier samen beschutting en voedsel te zoeken in de barre wintermaanden.

Bekijk ook de filmpjes die bij dit artikel horen!  
De links vind je op [www.npmeetjesland.be/ree](http://www.npmeetjesland.be/ree) en onze facebook-pagina.

Rudi Baetslé, Hugo De Bruyker en Paul Simoens