

Patientinformation om induktion med läkemedel Angusta®

- på grund av att fostervattnet har gått

Dit namn och personnummer: _____

Din graviditetslängd: _____ (veckor + dagar)

Indikation för igångsättning: _____

Antal tidigare förlossningar: _____

Tidigare kejsarsnitt ☐ Ja = du ska inte få Angusta®

☐ Nej

Igångsättning

Med igångsättning strävar man efter att sätta igång en förlossning genom att skynda på mognaden av livmoderhalsen och stimulera sammandragningarna. När livmodermunnen är omogen kan det behövas flera dagar innan den egentliga förlossningen kommer igång eller kan startas med hjälp av oxytocin-dropp.

Läkemedelsintag

Läkemedlet Angusta® har valts som startmetod för dig. Angusta® skall tas med ett glas vatten, varannan timme och det är viktigt att tiden hålls korrekt.

Uppmjukningen påskyndas om du håller dig i rörelse.

Innan uppmjukningen inleds kontrolleras fostrets tillstånd med hjälp av att fostrets hjärtfrekvens registreras med CTG under 20–30 minuter.

Biverkningar

I samband med tablettbehandlingen känner de flesta ingenting. En del upplever en tryckande känsla i nedre delen av buken och en del kan få som menssmärtor. Dessa lindras lättast med värme och du kan även ta tablett paracetamol med eller utan morfinanalog.

Andra biverkningarna kan vara illamående och kräkningar, diarré eller feber.

Du ska inte fortsätta med läkemedelsintag i fall:

- någonting börjar kännas annorlunda
- du inte längre känner fosterrörelser/det vanliga mönstret av fosterrörelser ändras
- du får värkar
- vattnet ändrar färg
- du blöder från slidan
- du får ont över livmodern; ihållande buksmärtor; tryckkänsla nedåt
- magen känns hård precis hela tiden
- du får feber eller sjukdomskänsla
- du blir orolig eller någonting känns oklar

Till dig som får återgå till hemmet i väntan på start av aktiv förlossningsarbete

Du ska kontrollera din temperatur två gånger om dagen med stjärtermometer. Vid temperatur över 37,9 grader ska du komma till sjukhuset. Du bör också vara uppmärksam på fostervattnets färg, som normalt är vitt, ofärgat eller mycket svagt rosafärgat.

Du ska inte fortsätta med läkemedelsintag och alltid ringa på telefonnummer xxx om:

- någonting börjar kännas annorlunda
- du inte längre känner fosterrörelser/det vanliga mönstret av fosterrörelser ändras
- du får värkar
- vattnet ändrar färg
- du blöder från slidan
- du får ont över livmodern; ihållande buksmärtor; tryckkänsla nedåt
- magen känns hård precis hela tiden
- du får feber eller sjukdomskänsla
- du blir orolig eller någonting känns oklart

Säg att din förlossning har satts igång med medicin.

	Datum		
Läkemedel/dos	Ska tas klockan	Togs klockan	Biverkan (ja/nej) beskriv kort
25µg Angusta®	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
Kommentar			

Om sammandragningarna inte har börjat inom 24 timmar kommer du att bli inlagd på sjukhuset för fortsatt induktion av din förlossning.

Din tid för nästa kontroll, dag 2, är: _____

Du ska komma till: _____
