

Patientinformation om induktion med läkemedel Angusta®.

Dit namn och personnummer: _____
Din graviditetslängd: _____ (veckor + dagar)
Indikation för igångsättning: _____
Antal tidigare förlossningar: _____
Tidigare kejsarsnitt ☐ Ja = du ska inte få Angusta®
☐ Nej

Igångsättning

Med igångsättning strävar man efter att sätta igång en förlossning genom att skynda på mognaden av livmoderhalsen och stimulera sammandragningarna. När livmodermunnen är omogen kan det behövas flera dagar innan den egentliga förlossningen sätts igång genom att man tar håll på fosterhinnorna och låter vattnet gå eller startar med hjälp av oxytocin-dropp. Livmoderhalsen kan mjukas upp antingen mekaniskt med hjälp av en ballongkateter eller med hjälp av läkemedlet Angusta®.

Läkemedelsintag

Läkemedlet Angusta® har valts som startmetod för dig. Angusta® skall tas med ett glas vatten, varannan timme och det är viktigt att tiden hålls korrekt. Uppmjukningen påskyndas om du håller dig i rörelse.

Innan uppmjukningen inleds kontrolleras fostrets tillstånd med hjälp av att fostrets hjärtfrekvens registreras med CTG under 20–30 minuter.

Biverkningar

I samband med tablettbehandlingen känner de flesta ingenting. En del upplever en tryckande känsla i nedre delen av buken och en del kan få som menssmärtor. Dessa lindras lättast med värme och du kan även ta 1–2 tabletter paracetamol 500 mg med eller utan morfinanalog. Andra biverkningarna kan vara illamående och kräkningar, diarré eller feber.

Du ska inte fortsätta med läkemedelsintag i fall:

- någonting börjar kännas annorlunda
- du inte längre känner fosterrörelser/det vanliga mönstret av fosterrörelser ändras
- du får värkar
- vattnet går
- du blöder från slidan
- du får ont över livmodern; ihållande buksmärtor; tryckkänsla nedåt
- magen känns hård precis hela tiden
- du får feber eller sjukdomskänsla
- du blir orolig eller någonting känns oklart

Till dig som får återgå till hemmet i väntan på start av aktiv förlossningsarbete

Du ska inte fortsätta med läkemedelsintag och ringa alltid på telefonnummer XXX om:

- någonting börjar kännas annorlunda
- du inte längre känner fosterrörelser/det vanliga mönstret av fosterrörelser ändras
- du får värkar
- vattnet går
- du blöder från slidan
- du får ont över livmodern, ihållande buksmärtor; tryckkänsla nedåt
- magen känns hård precis hela tiden
- du får feber eller sjukdomskänsla
- du blir orolig eller någonting känns oklart

Säg att din förlossning har satts igång med medicin.

Dag 1	Datum		
Läkemedel/dos	Ska tas klockan	Togs klockan	Biverkan (ja/nej) beskriv kort
25µg Angusta®	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
Kommentar			

Om sammandragningarna inte har börjat inom 24 timmar skall du komma till sjukhuset för en kontroll och planering om fortsatt handläggning.

Din tid för nästa kontroll, dag 2, är: _____

Du ska komma till: _____

Dag 2	Datum		
Läkemedel/dos	Ska tas klockan	Togs klockan	Biverkan (ja/nej) beskriv kort
25µg Angusta®	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
Kommentar			

Din tid för nästa kontroll, dag 3, är: _____

Du ska komma till: _____