

Les vaccinations supplémentaires recommandées chez les adultes

1. Vaccinations recommandées chez les personnes porteuses de comorbidités

PATHOLOGIES	VACCINATIONS RECOMMANDÉES
Diabète	<ul style="list-style-type: none">• Vaccin contre la grippe saisonnière (chaque année)• Vaccin contre le pneumocoque (PCV20+ PPV23)
Troubles métaboliques, y compris obésité morbide (IMC > 35)	<ul style="list-style-type: none">• Vaccin contre la grippe saisonnière (chaque année)
Maladies rénales chroniques (IR chronique, syndrome néphrotique, dialyse rénale)	<ul style="list-style-type: none">• Vaccin contre la grippe saisonnière (chaque année)• Vaccin contre le pneumocoque (PCV13+ PPV23)• Vaccin contre l'hépatite B¹
Pathologies hépatiques chroniques (hépatite chronique, cirrhose, atresie biliaire, hépatite auto-immune) ²	<ul style="list-style-type: none">• Vaccin contre la grippe saisonnière (chaque année)• Vaccin contre le pneumocoque (PCV13+ PPV23)• Vaccin contre les hépatites A et B (après contrôle sérologique)
Pathologies cardiopulmonaires chroniques (insuffisance cardiaque, HTA avec complications cardiaques, bronchopneumopathies chroniques, Asthme sévère, etc)	<ul style="list-style-type: none">• Vaccin contre la grippe saisonnière (chaque année)• Vaccin contre le pneumocoque (PCV13+ PPV23)
Mucoviscidose ²	<ul style="list-style-type: none">• Vaccin contre la grippe saisonnière (chaque année)• Vaccin contre le pneumocoque (PCV13+ PPV23)• Vaccin contre les hépatites A et B
Pathologies neurologiques chroniques ³	<ul style="list-style-type: none">• Vaccin contre la grippe saisonnière (chaque année)• Vaccin contre le pneumocoque (PCV13+ PPV23)
Troubles de coagulation	<ul style="list-style-type: none">• Vaccin contre les hépatites A et B chez les patients bénéficiant de la transfusion avec les concentrés dérivés du plasma

¹ Pour la dialyse rénale, un taux d'AC HBs de 100 UI/ml est recommandé.

² Il est recommandé d'administrer un vaccin vivant à temps si risque d'évolution vers la transplantation.

³ Il est recommandé d'administrer un vaccin vivant à temps si risque d'évolution vers des traitements immunosuppresseurs

Hyposplénie ou asplénie, y compris la drépanocytose	<ul style="list-style-type: none"> • Vaccin contre les méningocoques B et ACWY (vaccin conjugué) • Vaccin contre la grippe saisonnière (chaque année) • Vaccin contre le pneumocoque (PCV13+ PPV23) • Vaccin contre l'Haemophilus influenzae b (pas de doses supplémentaires si déjà vacciné)
Fuite du liquide céphalorachidien, Implant cochléaire	<ul style="list-style-type: none"> • Vaccin contre les méningocoques B et ACWY (vaccin conjugué) • Vaccin contre la grippe saisonnière (chaque année) • Vaccin contre le pneumocoque (PCV13+ PPV23)
Radiothérapie ⁴	<ul style="list-style-type: none"> • Vaccin contre la grippe saisonnière (chaque année)
Dysfonctionnement du thymus ou Thymectomie	<ul style="list-style-type: none"> • Vaccin contre la grippe saisonnière (chaque année) • Vaccin contre le pneumocoque (PCV13+ PPV23)
Traitement par immunoglobulines de remplacement	<ul style="list-style-type: none"> • Vaccin contre la grippe saisonnière (chaque année)

Pour plus d'informations :

- Consulter le site de l'AVIQ - [Guide de vaccination chez l'adulte en Région Wallonne](#)
- Contacter la Cellule de Surveillance des Maladies Infectieuses de l'AVIQ : surveillance.sante@aviq.be

⁴ Si vaccin vivant indiqué, attendre 3 mois après le traitement par radiothérapie.

2. Vaccinations recommandées chez les personnes immunodéprimées

Vaccins contre :	Cause d'immunodépression								
	Cancer	VIH		Maladie auto-Immune primitive	Sous traitement immunosuppresseur/corticoïdes	Transplantation d'organes solides		Greffe de cellules souches hématopoïétiques	
		CD4 <200	CD4 > 200			Avant	Après	Avant	Après
Vaccins inactivés									
Diphthérie, Tétanos, coqueluche					Rec			Rec	
Polio	Rec			Rec	Rec			Rec	
Haemophilus Influenzae b	x	x	x	Rec	x	Rec	Rec	Rec	
Hépatite A	Rec								
Hépatite B	Rec	Rec		Rec	Rec	Rec			
Influenza	Rec								
Pneumocoque PPV23	Rec								
Pneumocoque PCV13	Rec								
Méningocoque ACWY	Rec			Rec	Rec			Rec	
Méningocoque B	Rec			Rec	Rec			Rec	
Vaccins inactivés chez les voyageurs à risque									
Rage	Rec								
Encéphalite Japonaise	Rec								
Fièvre typhoïde	Rec								
Encéphalite à tiques	Rec								

Vaccin recombinant							
Zona	Rec						
Vaccins vivants atténués							
RRO	CI#	Rec	CI	CI#	Rec*	CI#	Rec
Varicelle	CI	CI#	Rec	CI	Rec*	CI#	Rec
Zona ⁵	CI	CI#	Rec	CI	Rec**	CI#	Rec
Vaccins vivants atténués chez les voyageurs à risque ⁶							
Fièvre jaune	CI	Rec	CI	CI#	Rec**	CI	Rec*#

Légende

Rec	Vaccins recommandés en population générale
Rec	Vaccins spécifiquement recommandés en raison du risque supplémentaire
Rec	Vaccins indiqués en cas d'épidémie ou de risque individuel
CI	Vaccins contre-indiqués
#	Vaccins contre-indiqués sauf après consultation d'un médecin spécialiste (en cas d'épidémie ou risque individuel)
*	> 24 mois après la greffe des cellules hématopoïétiques en absence de traitement immunosuppresseur
**	> 4 semaines avant la transplantation

Pour plus d'informations :

- Consulter le site de l'AVIQ - Guide de vaccination chez l'adulte en Région Wallonne
- Contacter la Cellule de Surveillance des Maladies Infectieuses de l'AVIQ : surveillance.sante@aviq.be

⁵ Le vaccin vivant contre le zona (Zostavax) n'est plus disponible sur le marché Belge depuis 12/2022.

⁶ pour plus d'informations qui concernent la vaccination dans le cadre du voyage, veuillez consulter le lien suivant : <http://www.medecinedesvoyages.be>