

**Scoringsark til scoring med hhv. ICD-11 og DSM-5-TR-kriterierne for PGD**

Diagnostiske kriterier	Symptomer	Symptom Tilstede= 1 Ikke tilstede= 0	ICD-11 kriterier	DSM-5-TR kriterier
<b>Kriterium A:</b> Efterladt som pårørende ved nærtståendes dødsfald.	A. En af de nærmeste død		Tilstede	Tilstede
<b>Kriterium B:</b> Tidskriterium.	B1. > 6 måneder		≥ 6 måneder	≥ 12 måneder
	B2. ≥ 12 måneder			
<b>Kriterium C:</b> Forekomst af en eller flere de følgende invaderende symptomer som er begyndt efter dødsfaldet.	C1. Længsel*		≥ 1 symptom	≥ 1 symptom
	C2. Optagethed (eng: preoccupation)*			
<b>Kriterium D:</b> Negative ændringer i kognition, humør og/eller adfærd, som er begyndt er eller blevet forværret efter dødsfaldet.	D1. Tristhed*		≥ 1 symptom	≥ 3 symptom
	D2. Skyldfølelse			
	D3. Selvbebrejdelse			
	D4. Vrede*			
	D5. Benægtelse (eng: disbelief/denial)*			
	D6. Manglende accept			
	D7. Identitetsforstyrrelse*			
	D8. Fravær af positiv humør/følelser			
	D9. Følelseløshed*			
	D10. Mindsket aktivitet*			
	D11. Ensomhed			
	D12. Undgåelse			
	D13. Meningsløshed			
	D14. Bitterhed			
		Samlet scorer i Kriterium D (ICD-11)		
	Samlet scorer i Kriterium D (DSM-5-TR)			
	Klinisk vurdering af om klienten samlet set er plaget af intens emotionel smerte		Tilstede	Tilstede
<b>Kriterium E:</b> Tabet forårsager klinisk betydelig forstyrrelse eller forringelse af evnen til at fungere socialt, arbejdsmæssigt eller på andre vigtige områder.	E. Funktionsnedsættelse (generel)		Tilstede	Tilstede
	E1. Arbejde/studie/daglige opgaver			
	E2. Socialt			
	E3. Familieliv/hjemmet			
	E4. Andre områder			
<b>Kriterium F:</b> Sorgreaktionen overskrider klart sociale, kulturelle eller religiøse normer.	F1. Omgangskreds		Tilstede	Tilstede
	F2. Eget perspektiv			
	F3. Interviewers vurdering			
<b>Kriterium G:</b> Symptomdebut- og varighed.	Symptom varighed		Varighed: ≥6 måneder	Varighed: ≥1 måned
Symptombilledet må ikke være bedre beskrevet af anden diagnose, fysiologisk reaktioner på stoffer (f.eks. medicin, alkohol) eller andre medicinske tilstande.				
<b>Identificeret Forlænget sorglidelse ifølge ICD-11 og/eller DSM-5-TR kriterier?</b> Hvis ja, sæt kryds i henholdsvis ICD-11 og/eller DSM-5-TR.				