

## Nøgle til scoring med ICD-11 og DSM-5-TR kriterier – case med Hanne

Diagnostiske kriterier	Symptomer	Klientens scorer <i>Tilstede= 1</i> <i>Ikke tilstede= 0</i> <i>Intensitet (i) =</i> <i>0-4</i>	ICD-11 kriterier		DSM-5-TR kriterier	
<b>Kriterium A:</b> Efterladt som pårørende ved nærtståendes dødsfald.	A. En af de nærmeste død	1	Tilstede	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilstede	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kriterium B:</b> Tidskriterium.	B1. $\geq 6$ måneder	1	$\geq 6$ måneder	<input checked="" type="checkbox"/>	$\geq 12$ måneder	<input checked="" type="checkbox"/>
	B2. $\geq 12$ måneder	1				
<b>Kriterium C:</b> Forekomst af en eller flere de følgende invaderende symptomer som er begyndt efter dødsfaldet.	C1. Længsel*	1 i: 4	$\geq 1$ symptom	<input checked="" type="checkbox"/>	$\geq 1$ symptom	<input checked="" type="checkbox"/>
	C2. Optagethed (eng: preoccupation)*	1 i: 4				
<b>Kriterium D:</b> Negative ændringer i kognition, humør og/eller adfærd, som er begyndt er eller blevet forværret efter dødsfaldet.	D1. Tristhed*	1 i: 3	$\geq 1$ symptom	<input checked="" type="checkbox"/>	$\geq 3$ symptom	<input checked="" type="checkbox"/>
	D2. Skyldfølelse <b>ICD-11</b>	0				
	D3. Selvbekendelse <b>ICD-11</b>	1 i: 3				
	D4. Vrede*	1 i: 3				
	D5. Benægtelse (eng: disbelief/denial)*	1 i: 4				
	D6. Manglende accept <b>ICD-11</b>	1 i: 3				
	D7. Identitetsforstyrrelse*	1 i: 3				
	D8. Fravær af positiv humør/følelser <b>ICD-11</b>	1 i: 3				
	D9. Følelseløshed*	0				
	D10. Mindsket aktivitet*	1 i: 2				
	D11. Ensomhed <b>DSM-5</b>	1 i: 4				
	D12. Undgåelse <b>DSM-5</b>	1 i: 3				
	D13. Meningsløshed <b>DSM-5</b>	1 i: 4				
	D14. Bitterhed <b>DSM-5</b>	1 i: 4				
	<i>Samlet scorer i Kriterium D (ICD-11)</i>	8				
<i>Samlet scorer i Kriterium D (DSM-5-TR)</i>	9					
Klinisk vurdering af om klienten samlet set er plaget af intens emotionel smerte	1	Tilstede	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilstede	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Kriterium E:</b> Tabet forårsager klinisk betydelig forstyrrelse eller forringelse af evnen til at fungere socialt, arbejdsmæssigt eller på andre vigtige områder.	E. Funktionsnedsættelse (generel)	1	Tilstede	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilstede	<input checked="" type="checkbox"/>
	E1. Arbejde/studie/daglige opgaver	1				
	E2. Socialt	1				
	E3. Familieliv/hjemmet	1				
	E4. Andre områder					
<b>Kriterium F:</b> Sorgreaktionen overskrider klart sociale, kulturelle eller religiøse normer.	F1. Omgangskreds	1	Tilstede	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilstede	<input checked="" type="checkbox"/>
	F2. Eget perspektiv	0				
	F3. Interviewers vurdering	1				
<b>Kriterium G:</b> Symptomdebut- og varighed.	Symptom varighed	1	Varighed: $\geq 6$ måneder	<input checked="" type="checkbox"/>	Varighed: $\geq 1$ måned	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Symptombilledet må ikke være bedre beskrevet i form af anden diagnose, fysiologisk reaktioner på stoffer (f.eks. medicin, alkohol) eller andre medicinske tilstande.</i>						
<b>Identificeret Forlænget sorglidelse ifølge ICD-11 og/eller DSM-5-TR kriterier?</b> <i>Hvis ja, sæt kryds i henholdsvis ICD-11 og/eller DSM-5-TR. Casen HANNE</i>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	