

Nøgle til scoring med ICD-11 og DSM-5-TR kriterier – case med Jørgen

Diagnostiske kriterier	Symptomer	Klientens scorer <i>Tilstede= 1</i> <i>Ikke tilstede= 0</i> <i>Intensitet (i) =</i> <i>0-4</i>	ICD-11 kriterier		DSM-5-TR kriterier	
Kriterium A: Efterladt som pårørende ved nærtståendes dødsfald.	A. En af de nærmeste død	1	Tilstede	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilstede	<input checked="" type="checkbox"/>
Kriterium B: Tidskriterium.	B1. ≥ 6 måneder	1	≥ 6 måneder	<input checked="" type="checkbox"/>	≥ 12 måneder	<input checked="" type="checkbox"/>
	B2. ≥ 12 måneder	0				
Kriterium C: Forekomst af en eller flere de følgende invaderende symptomer som er begyndt efter dødsfaldet.	C1. Længsel*	0	≥ 1 symptom	<input checked="" type="checkbox"/>	≥ 1 symptom	<input checked="" type="checkbox"/>
	C2. Optagethed (eng: preoccupation)*	1 i: 4				
Kriterium D: Negative ændringer i kognition, humør og/eller adfærd, som er begyndt er eller blevet forværret efter dødsfaldet.	D1. Tristhed*	0	≥ 1 symptom	<input checked="" type="checkbox"/>	≥ 3 symptom	<input checked="" type="checkbox"/>
	D2. Skyldfølelse ICD-11	1 i: 4				
	D3. Selvbefredelse ICD-11	1 i: 4				
	D4. Vrede*	1 i: 3				
	D5. Benægtelse (eng: disbelief/denial)*	0				
	D6. Manglende accept ICD-11	0				
	D7. Identitetsforstyrrelse*	0				
	D8. Fravær af positiv humør/følelser ICD-11	1 i: 3				
	D9. Følelsesløshed*	1 i: 3				
	D10. Mindsket aktivitet*	1 i: 3				
	D11. Ensomhed DSM-5	1 i: 4				
	D12. Undgåelse DSM-5	1 i: 3				
	D13. Meningsløshed DSM-5	1 i: 4				
	D14. Bitterhed DSM-5	0				
	Samlet scorer i Kriterium D (ICD-11)	6				
Samlet scorer i Kriterium D (DSM-5-TR)	6					
Klinisk vurdering af om klienten samlet set er plaget af intens emotionel smerte	1	Tilstede	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilstede	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kriterium E: Tabet forårsager klinisk betydelig forstyrrelse eller forringelse af evnen til at fungere socialt, arbejdsmæssigt eller på andre vigtige områder.	E. Funktionsnedsættelse (generel)	1	Tilstede	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilstede	<input checked="" type="checkbox"/>
	E1. Arbejde/studie/daglige opgaver	1				
	E2. Socialt	1				
	E3. Familieliv/hjemmet	1				
	E4. Andre områder					
Kriterium F: Sorgreaktionen overskrider klart sociale, kulturelle eller religiøse normer.	F1. Omgangskreds	1	Tilstede	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilstede	<input checked="" type="checkbox"/>
	F2. Eget perspektiv	1				
	F3. Interviewers vurdering	1				
Kriterium G: Symptomdebut- og varighed.	Symptom varighed	1	Varighed: ≥ 6 måneder	<input checked="" type="checkbox"/>	Varighed: ≥ 1 måned	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Symptombilledet må ikke være bedre beskrevet i form af anden diagnose, fysiologisk reaktioner på stoffer (f.eks. medicin, alkohol) eller andre medicinske tilstande.</i>						
Identificeret Forlænget sorglidelse ifølge ICD-11 og/eller DSM-5-TR kriterier? <i>Hvis ja, sæt kryds i henholdsvis ICD-11 og/eller DSM-5-TR.</i>			<input checked="" type="checkbox"/>	Ikke DSM 5 Tr da under et år fra tab		