

Nøgle til scoring med ICD-11 og DSM-5-TR kriterier – case med Preben

Diagnostiske kriterier	Symptomer	Klientens scorer <i>Tilstede= 1</i> <i>Ikke tilstede= 0</i> <i>Intensitet= 0-4</i>	ICD-11 kriterier	DSM-5-TR kriterier
Kriterium A: Efterladt som pårørende ved nærtstående dødsfald.	A. En af de nærmeste død	1	Tilstede	Tilstede
Kriterium B: Tidskriterium.	B1. > 6 måneder	1	≥ 6 måneder	≥ 12 måneder
	B2. ≥ 12 måneder	1		
Kriterium C: Forekomst af en eller flere de følgende invaderende symptomer som er begyndt efter dødsfaldet.	C1. Længsel*	1 2	≥ 1 symptom	≥ 1 symptom
	C2. Optagethed (eng: preoccupation)*	0		
Kriterium D: Negative ændringer i kognition, humør og/eller adfærd, som er begyndt er eller blevet forværret efter dødsfaldet.	D1. Tristhed*	0	≥ 1 symptom	≥ 3 symptom
	D2. Skyldfølelse ICD-11	0		
	D3. Selvbefredelse ICD-11	0		
	D4. Vrede*	0		
	D5. Benægtelse (eng: disbelief/denial)*	0		
	D6. Manglende accept ICD-11	0		
	D7. Identitetsforstyrrelse*	0		
	D8. Fravær af positiv humør/følelser ICD-11	0		
	D9. Følelsesløshed*	0		
	D10. Mindsket aktivitet*	0		
	D11. Ensomhed DSM-5	0		
	D12. Undgåelse DSM-5	0		
	D13. Meningsløshed DSM-5	0		
	D14. Bitterhed DSM-5	0		
	Samlet scorer i Kriterium D (ICD-11)	0		
	Samlet scorer i Kriterium D (DSM-5-TR)	0		
	Klinisk vurdering af om klienten samlet set er plaget af intens emotionel smerte	0	Tilstede	Tilstede
Kriterium E: Tabet forårsager klinisk betydelig forstyrrelse eller forringelse af evnen til at fungere socialt, arbejdsmæssigt eller på andre vigtige områder.	E. Funktionsnedsættelse (generel)	0	Tilstede	Tilstede
	E1. Arbejde/studie/daglige opgaver	0		
	E2. Socialt	0		
	E3. Familieliv/hjemmet	0		
	E4. Andre områder	0		
Kriterium F: Sorgreaktionen overskrider klart sociale, kulturelle eller religiøse normer.	F1. Omgangskreds	0	Tilstede	Tilstede
	F2. Eget perspektiv	0		
	F3. Interviewers vurdering	0		
Kriterium G: Symptomdebut- og varighed.	Symptom varighed	0	Varighed: ≥6 måneder	Varighed: ≥1 måned
<i>Symptombilledet må ikke være bedre beskrevet i form af anden diagnose, fysiologisk reaktioner på stoffer (f.eks. medicin, alkohol) eller andre medicinske tilstande.</i>				
Identificeret Forlænget sorglidelse ifølge ICD-11 og/eller DSM-5-TR kriterier? <i>Hvis ja, sæt kryds i henholdsvis ICD-11 og/eller DSM-5-TR. Casen PREBEN</i>				