

## Checklista för vilka som rekommenderas att vaccinera sig mot pneumokocker

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som har ökad risk för svår pneumokocksjukdom vaccinerar sig.

Pneumokocker är bakterier som kan orsaka allvarliga infektioner som till exempel lunginflammation, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.

Personer som är 65 år och äldre, personer med nedsatt immunförsvar eller med vissa kroniska sjukdomar har en ökad risk för att få allvarlig pneumokocksjukdom och rekommenderas därför att vaccinera sig.



Kontakta din vårdcentral för mer information.

Hur pneumokockvaccinationen av personer i riskgrupper är ordnad, och om vaccinationen kostar något, kan skilja mellan landets olika regioner.

För att få veta vad som gäller just där du bor kan du kontakta din vårdcentral.

**Det är viktigt att riskgrupper vaccinerar sig mot pneumokocker.**



### Grupper med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom:

- Personer som är 65 år eller äldre

Personer med:

- Kronisk hjärtsjukdom
- Lungsjukdom
- Leversjukdom

Personer med:

- Vissa kroniska neurologiska sjukdomar eller extrem fetma

Personer med:

- Kronisk njursvikt
- Diabetes

Personer som är:

- Alkoholberoende
- Narkotikaberoende
- Rökare

### Grupper med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom:

- Aspleni / hypospleni
- Likvorläckage
- Nedsatt immunförsvar
- Cochleaimplantat
- Cystisk fibros
- Organtransplantation