

Steroidresponsiv meningit-arterit (SRMA)

SRMA är en identifierad **genetisk autoimmun sjukdom** som kan drabba stabijhoun.

Vad är SRMA?

SRMA är en autoimmun sjukdom där kroppens **immunförsvar angriper sin egen vävnad** som omger nervsystemet (hjärnhinnorna).

Vad orsakar SRMA?

Orsaken är inte helt känd, men verkar vara en komplex interaktion mellan **genetik och hundens miljömässiga stimulans**. Dessa sjukdomar antas starkt ha ett genetiskt ursprung. För närvarande finns det ingen gentest för SRMA.

Vem drabbas av SRMA?

SRMA ses oftast hos hundar mellan 7 månader och 2 år, men har förekommit hos hundar upp till 7 års ålder. Både hanar och tikar drabbas.

Hur vet jag om min hund har SRMA?

Tecken kan börja akut eller komma och gå under månader. Symptomen kan inkludera: **feber, minskad aptit, ovilja att röra sig, krökt rygg, stel och smärtsam nacke**. Ibland kan det påverka inre organ som hjärtats hinna (potentiellt orsaka onormal hjärtrytm), lungor och bukorganen.

Hur diagnostiseras SRMA?

Diagnosen ställs genom en kombination av **kliniska tecken, laborietester och uteslutning av andra potentiella sjukdomar**. Tester kan inkludera analys av cerebrospinalvätska (CSF), magnetresonanstomografi (MR), blodprover för olika immunsvär och röntgenbilder.

Hur behandlas SRMA?

Behandlingen består av en kur med **höga doser steroider**, vilket undertrycker immunförsvaret och ofta leder till en betydande och snabb förbättring eller upplösning av de kliniska tecknen. Detta är i sig en bekräftelse på tillståndet. Steroiderna kommer gradvis att minskas under en 5–7 månaders period. Tyvärr ses ofta biverkningar vid steroidanvändning, inklusive ökad törst och hunger (följaktligen ökad urinering och viktökning), slöhet, flämtning och ökad risk för infektioner (luftvägs-, urinvägs- etc.).

Vad är prognosen för SRMA?

Prognosen för SRMA är generellt sett mycket god, där de flesta hundar förbättras efter 2-3 dagars behandling och klinisk remission inom 2 veckor. Behandling med steroider krävs normalt i 5–7 månader, varefter behandlingen kan trappas ner och avslutas med förväntad normal livslängd och livskvalitet. Om steroiderna minskas för snabbt är återfall möjligt. Cirka 20 % får återfall men svarar på upprepade behandling.

Informationsblad framtaget av ISC – Health committée maj-2024

Hur minskar man riskerna för SRMA?

Det enda sättet att minska riskerna är att vara säker på **förekomsten av tillståndet inom raslinjerna**. Diskutera vaccinationer med din veterinär.

Vad ska du göra om din hund har SRMA?

Vänligen meddela din **uppfödare och din rasklubbs avelskommitté**. För att bevara vår ras är det absolut nödvändigt att sjukdomar anmäls. Det har rekommenderats att drabbade hundar inte ska avlas på och att de kombinationerna inte ska upprepas.