


Hva er Tourettes syndrom?

Tourettes syndrom er en neurobiologisk utviklingstilstand som kjennetegnes ved ufrivillige muskelbevegelser og lyder, som kalles tics.
Tics kan være enkle eller sammensatte og kan variere over tid.
Hovedområdene under viser eksempler på tics.

Motoriske tics - ufrivillige bevegelser



Vokale tics - ufrivillige lyder



Tics


Forvarsel før tics

Mange kjenner en spesiell/ ubehagelig følelse før tics kommer

- Kiling/kløe
- Prikking/stikking
- Følelse av at man bare «må»

Tics

- Kan være enkle, sammensatte, motoriske, vokale, usynlige for andre
- Varierer over tid



Etter tics


- Ubehaget letter

Tics som ikke andre ser

- Krølle tærne
- Stramme muskler i mage, rumpe, lår, o.l.
- Rulle med magen
- Pustetics
- Bite seg i tunga/kinn

Vanlige ledsagende utfordringer

Hovedområdene under viser eksempler på ledsagende utfordringer man kan ha:




Smerter

- Vondt i muskler og ledd
- Hodepine og nakkesmerter
- Sår/skader

Søvnvansker

- Vansker med å sogne på kvelden
- Tics under sovn
- Våkner ofte i løpet av natten




Sliten/trøtt

- Av å ha tics
- Av å holde tilbake tics
- Etter skolen



Tvang


- «Må bare» gjøre ting
- Plagsomme tanker kommer tilbake gang på gang
- Telling
- System/mønster
- Ting må kjennes rett



1-2-3-4 ... 1-2-3-4 ...
1-2-3-4 ...


Sensorisk overfølsomhet

- Kan reagere på lys, lyd, lukt, smak og konsistens
- Taktile/berøring
- Kan reagere på farger og mønster



Reaksjoner fra andre

- Bli lagt merke til
- Kommentarer/spørsmål
- Tilsnakk når det kommer tics



Læring og koncentrasjon kan påvirkes

- Fokus på tics krever oppmerksomhet
- Å ha tics
- Undertrykke/holde tilbake tics
- Kamuflere tics
- Vansklig å koncentrere seg
- Kan oppleve uro i kroppen
- Kan også ha ADHD



Svingninger i følelser

- Kan fort bli trist og lei seg
- Kan fort bli glad
- Kan fort bli sint

