


Hva er Tourettes syndrom?


Tourettes syndrom er en nevrobiologisk utviklingstilstand som kjennetegnes ved ufrivillige muskelbevegelser og lyder, som kalles tics. Tics kan være enkle eller sammensatte og kan variere over tid. Hovedområdene under viser eksempler på tics.

Motoriske tics - ufrivillige bevegelser



Mange har tics i ansiktet




- Blanke
- Rulle med øynene
- Rekke tunga
- Gape
- Slikke seg rundt munnen
- Rynke nese



Motoriske tics kan komme

overalt på kroppen

- Vise finger
- Vri hånden/knipse
- Bevegelse og stramming av rumpe/lår/ben
- Krølle tær
- Ta på øyet



Vokale tics - ufrivillige lyder




Tics

Forvarsel før tics

Mange kjenner en spesiell/
ubehagelig følelse før tics kommer

- Kiling/kløe
- Prikking/stikking
- Følelse av at man bare «må»



Tics

- Kan være enkle,
sammensatte,
motoriske, vokale,
usynlige for andre
- Varierer
over tid



Etter tics

- Ubehaget letter




Tics som ikke andre ser

- Krølle tærne
- Stramme muskler i mage, rumpe, lår, o.l.
- Rulle med magen
- Pustetics
- Bite seg i tungen/kinn



Vanlige ledsagende utfordringer

Hovedområdene under viser eksempler på ledsagende utfordringer man kan ha:




Smerter

- Vondt i muskler og ledd
- Hodepine og nakkesmerter
- Sår/skader


Søvnvansker

- Vansker med å sogne på kvelden
- Tics under søvn
- Våkner ofte i løpet av natten



Sliten/trøtt

- Av å ha tics
- Av å holde tilbake tics
- Etter skolen



Reaksjoner fra andre

- Bli lagt merke til
- Kommentarer/spørsmål
- Tilsnakk når det kommer tics



Sensorisk overfølsomhet



- Kan reagere på lys, lyd, lukt, smak og konsistens
- Taktil/berøring
- Kan reagere på farger og mønster





Tvang

- «Må bare» gjøre ting
- Plagsomme tanker kommer tilbake gang på gang
- Telling
- System/mønster
- Ting må kjennes rett



Læring og konsentrasjon kan påvirkes

- Fokus på tics krever oppmerksomhet
- Å ha tics
- Undertrykke/holde tilbake tics
- Kamuflere tics
- Vanskelig å koncentrere seg
- Kan oppleve uro i kroppen
- Kan også ha ADHD



Svingninger i følelser

- Kan fort bli trist og lei seg
- Kan fort bli glad
- Kan fort bli sint

