

KEND DIN...

STRIBETÆGE

- Tægen med de flotteste striber



Stribetægen (*Graphosoma italicum*) er en af Danmarks flotteste tæger. Den er 8-12 mm i længden og på oversiden har den flotte orange-røde og sorte striber og derfor kendes den også som "AC Milan-tægen". Undersiden er orangerød med sorte prikker, og med de kendetegn er den svær at forveksle med andre tæger.

Til gengæld sker det tit, at tæger forveksles med flåter. Det er der dog en sproglig forklaring på. På engelsk hedder en flåt nemlig "tick" og på tysk kaldes den "zecken", som det danske ord tæge er afledt af. Forvirringen bliver total, da man stadig kan spørge efter en "tægetang" på apoteket, hvis man vil have et redskab til at fjerne flåter.

Der er dog stor forskel på tæger og flåter: Tæger er insekter, de har vinger og 6 ben. Flåter er mider, de har 8 ben og er nærmere beslægtet med edderkopper. De tæger vi har i Danmark lever typisk af saft fra planter og frø. Flåter suger blod fra pattedyr, fugle og krybdyr. Der er altså ingen grund til at frygte tæger. Tværtimod kan de være tegn på, at du har en god variation af planter og træer.

Find den på skærmplanter

Stribetægen overvintrer i Danmark, og i løbet af foråret kommer de frem og parrer sig. De lever på forskellige arter af skærmplanter, hvor de suger saft fra plantedele og frø. Det er sjældent, at de gør skade på værtsplanterne, så dine gulerødder burde klare sig fint, selvom der er tæger på besøg.

Stribetægen er udbredt over hele landet, men det var faktisk først i 1992, at de først blev opdaget i Danmark, hvor de sandsynligvis fløj hertil fra Tyskland.

Hvis du gerne vil have besøg af den flotte stribetæge, så er det skærmplanter du skal gøre plads til. Her er det vigtigt at vælge skærmplanter, som er hjemmehørende i Danmark. Det er blandt andet vild gulerod, skvalderkål, kørvel, angelik, pastinak og persille. Laver du plads til nogle af de planter, så er der god chance for, at stribetægen (og desuden en masse andre insekter) vil vise sig.

Find flere arter på: vildmedvilje.dk/vild-viden-2

Udarbejdet af Vild Med Vilje med støtte fra Novo Nordisk Fonden

VILD MED
VILJE