

# Navirel<sup>®</sup>

Vinorelbine 10 mg/ml



medac

## Navirel® (vinorelbin)

Den verksamma beståndsdelens utvinns ur de gröna bladen från växten *Cathartus roseus* som tillhör släktet Vintergröna. Gruppen av cancerläkemedel som Navirel® ingår i kallas vincaalkaloider.

Denna broschyr är en vägledning som du kan ha under behandlingstiden.

## Vad Navirel® är och vad det används för

Den aktiva substansen *vinorelbin*, tillhör gruppen cytostatiska medel. Dessa medel påverkar tillväxten av elakartade celler. Navirel® är avsett för behandling av icke småcellig lungcancer och bröstcancer. Vinorelbin som finns i Navirel® kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns här. Fråga läkare eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor.

*Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.*

## Behandling

Vanligtvis ges Navirel® dag 1 och 8 under en period av tre veckor, alternativt en gång per vecka. Du kommer att få behandlingen som en intravenös infusion eller via en central venkater under ca 6-10 minuter. Vanlig dos för vuxna är 25–30 mg/m<sup>2</sup>.

## Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Navirel® orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om några biverkningar blir värre kontakta din läkare eller vårdpersonal. Vissa biverkningar kan kräva behandling.

Cytostatika förhindrar på olika sätt celldelning, därför påverkas inte bara de sjuka cellerna utan även de friska. De friska celler som påverkas mest av Navirel® är de vita blodkropparna, som är kroppens främsta skydd mot infektioner. Det är därför mycket viktigt att du är uppmärksam på och genast kontaktar din avdelning eller mottagning, om du får symptom på infektion så som;

- frossa eller frossbrytningar
- feber på 38°C eller mer
- sveda vid urinering, halsont m.m.

### Kontroller

Före varje behandling med Navirel® får du lämna blodprover för kontroll av att du har tillräckligt antal blodkroppar för att behandlas med Navirel®. Om detta prov inte är tillfredsställande kan din behandling fördröjas och ytterligare prover krävas tills värdena återgått till normala.

### Graviditet och amning

Du får inte använda Navirel® om du är gravid om inte din läkare tydligt sagt att du ska göra det. Du får inte använda Navirel® om du ammar. Om behandling är nödvändig skall amningen avbrytas. Kvinnor skall använda effektiv preventivmetod under behandlingen samt minst 3 månader därefter. Män skall se till att deras partner inte blir gravid under och upp till sex månader efter behandlingen.





## Mina kontakter

Namn: \_\_\_\_\_

Klinik: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

Mobil: \_\_\_\_\_

E-post: \_\_\_\_\_

Namn: \_\_\_\_\_

Klinik: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

Mobil: \_\_\_\_\_

E-post: \_\_\_\_\_

### **Övriga kontakter**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Hemsidor

Cancerfonden  
[www.cancerfonden.se](http://www.cancerfonden.se)

FASS  
[www.fass.se](http://www.fass.se)

Socialstyrelsen  
[www.socialstyrelsen.se](http://www.socialstyrelsen.se)